

# PRIX-COURANT

DES

PLANTES

DE

## SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été,  
à décorer les parterres, à l'air libre,

### AMARYLLIDÉES,

AROIDÉES, BÉGONIAS HERBACÉS, SEMI-LIGNEUX ET TUBÉREUX,  
BROMÉLIACÉES, CACTÉES, CANNA, COLEUS, CYCADÉES, DAHLIA, ERYTHRINA, FUCHSIA,

FOUGÈRES, GERANIUM, GESNÉRIACÉES, HÉLIOTROPES,

LANTANA, ŒILLETS, PELARGONIUM, PENSTEMON, SALVIA,

ORCHIDÉES, PALMIERS, PANDANUS,

*Passiflorées, Scitaminées, Sarracéniées, Plantes carnivores,*

PLANTES UTILES, OFFICINALES, ETC.,

PLANTES NOUVELLES OU RARES,

CULTIVÉES DANS L'ÉTABLISSEMENT


DE

## LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,


Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,


à GAND (BELGIQUE).

 Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes PENDANT L'ANNÉE.

N. B. Prière d'adresser les lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL, et non à des INTERMÉDIAIRES.



 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

 Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.


Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.


Aucun emballage (panier, caisse, etc.), n'est repris par l'Établissement.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.


La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.


Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.


 Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieuse à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes et suffisantes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

 Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égalé somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement. L'Établissement accepte des timbres-poste de tous pays pour les commandes en dessous de 5 francs.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

 L'Établissement prie instamment les personnes qui feraient des commandes de quelques francs seulement, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles lui éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure et des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c.

 I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest'ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell'ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel Catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest'effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente Catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

## Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 188, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, tels que Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Orchidées de pleine terre, Oxalis, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glaïeuls nains, etc., graines à semer en automne.

N° 189, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère.

N° 190, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tout genre, etc.

N° 191, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Caladium, les Bégonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.



## CULTURES

DE

## LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

à GAND (BELGIQUE).

## SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

## PLANTES NOUVELLES OU RARES.

- Fr. C.  
*Adiantum Bausei* . . . . . 15 "  
 — *Williamsi* . . . . . 15 "  
 Splendide nouveauté très-ornementale, d'un port gracieux, à frondes d'une légèreté extrême.

- Alocasia Thibautiana* . . . . . 50 "

Nouveauté de premier ordre, feuillage de grande dimension et de solide texture, d'un vert olivâtre grisâtre foncé, luisant, veines principales bordées de blanc grisâtre, intervalles traversés de veinules grisâtres.

- Anthurium Andreanum* . . . . . 25 à 50 "

Splendide Aroïdée, la plus belle peut-être du genre, à grande spathe fortement veinée, du vermillon cramoisi le plus vif, à spadice jaune à bout blanc.

- *Scherzerianum Rothschildianum*  
 (FLORE, XXIII, 85). . . . . 150 "

Charante variété tout récemment obtenue par M. Beremann, dans les serres du Baron de Rothschild, à Ferrières, près de Meux; spathe blanche couverte de macules et de points d'un rose cinabre du plus brillant effet, spadice jaune orangé. La FLORE en a publié récemment une figure très-exacte, faite d'après nature dans l'Établissement L. Van Houtte.

- *Veitchi*, très-forts . . . . . 150 à 300 "

Nouveauté de tout premier ordre, de grand effet, à feuilles excessivement allongées, atteignant 2 à 3 pieds de longueur sur un pied de largeur, retombantes, très-coriaces, d'un vert foncé reflété d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément creusées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence ondulée.

- *Warocqueanum* . . . . . 25 "  
 très-forts . . . . . 150 à 300 "

Nouveauté de tout premier ordre, une des plus belles Aroïdées connues, dont les feuilles atteignent 3 pieds de longueur sur plus d'un pied de largeur, d'un très-riche vert velouté, contrastant avec les nervures médianes et secondaires qui sont d'un vert plus pâle.

- Fr. C.  
*Aralia* (?) *Chabrierii* . . . . . 15 à 50 "

Nouvel *Aralia* (?) de la Nouvelle-Calédonie constituant un charmant arbuste d'appartement, d'un port élégant, d'une culture facile, à feuilles très-étroites et très-longues, d'un beau vert foncé avec la veine médiane brunâtre.

- *monstrosa* . . . . . 15 à 25 "

Superbe espèce à feuilles d'un vert foncé bordé de blanc, avec des déchiquetures sur les bords.

## BERTOLONIA. — NOUVEAUTÉS de 1879.

On doit se rappeler l'effort prodigieux que produisirent les *Bertolonia* nouveaux de l'Établissement, à l'exposition internationale de Gand, en 1878, et à l'exposition nationale de Bruxelles, en 1880, où ils furent honorés d'une médaille d'or. Tous ces superbes hybrides ont été obtenus de fécondations artificielles intelligemment opérées par le chef de section, F. Marchand, à qui on est aussi redevable des variétés *Marchandi*, *Mirandei*, *smaragdina* et *Van Houttei*.

- Bertolonia hybrida Disraeli* (L. Van Houtte) . . . . . 10 "

Feuilles très-grandes, allongées, d'un vert brunâtre, veiné et pointillé de blanc rosâtre.

- — *Galieræ* (L. Van Houtte). . . . . 10 "

Feuilles moyennes, recourbées, d'un vert sombre, veiné et pointillé de rose pâle comme vernissé.

- — *Gladstonei* (L. Van Houtte) . . . . . 15 "

Feuilles allongées, d'un beau vert, fortement veiné de blanc argenté et légèrement pointillé de blanc sur le bord.

- — *Killischii* (L. Van Houtte) . . . . . 15 "

Feuilles grandes, d'un vert clair, veiné de blanc crème.

- — *Ohlendorffi* (L. Van Houtte). . . . . 10 "

Feuilles grandes, d'un vert très-foncé velouté, veiné et pointillé de carmin vif.



Fr. C.

**Bertolonia hybrida Rodeckiana** (FLORE, XXIII, 27) (*L. Van Houtte*) . . . 15 "

Feuilles grandes, d'un vert foncé, veiné et ponctué de blanc pur; variété de tout premier mérite.

## NOUVEAUTÉS de 1881.

**Bertolonia hybrida Gibsoniana** (*L. Van Houtte*) . . . 50 "

Feuilles dont le fond, d'un vert brunâtre, est veiné, quadrillé et pointillé du rose le plus scintillant, d'un ensemble de toute beauté.

— — **Hrubyana** (FLORE, XXIII, 25) (*L. Van Houtte*) . . . 50 "

Feuilles paronnes, dans leur longueur, par des nervures d'un beau vert sombre sur fond blanc, et dont les intervalles sont ornés d'un quadrillé vert de deux nuances, que recouvre un pointillé blanc simulat de petites perles; nouveauté de premier ordre.

— — **Legrelleana** (FLORE, XXIII, 97) (*L. Van Houtte*) . . . 50 "

Feuilles d'un vert de mer, ornées de nervures, de nervules et d'un fin pointillé d'un blanc argenté; nouveauté de très-grand effet.

— — **vittata** (*L. Van Houtte*) . . . 25 "

Feuilles d'un vert brunâtre, paronnes, dans leur longueur, par des bandes étroites d'un vert opalin.

**Bomarea Carderi** . . . 25 "

Ce nouveau *Bomarea*, le plus beau du genre, donne de charmantes fleurs pendantes, dans le genre de celles des *Lapageria*, d'un rose clair des plus vifs.

**Bowenia spectabilis serrulata** . . . 50 "

Cette espèce australienne est très-ornementale; c'est la plus distincte et la plus remarquable de toutes les *Cycadées*, et la seule à frondes bipinnées. Elle a le tronc court et gros; au sommet se développent ses larges feuilles qui sont d'une grande beauté.

**Burbidgea nitida** . . . 10 à 50 "

Nouveau genre de plante d'un brillant effet, à feuillage d'un vert luisant sur les deux faces, à fleurs d'un riche orange.

**Chevalliera Veitchi** (*Æchmea*) . . . 25 à 50 "

Superbe espèce nouvelle dont les fleurs sont réunies en un thyrsse compact de fort bel effet.

**Cochliostema Jacobianum albo-lineatum** . . . 40 "

Cette variété, gagnée récemment dans l'Établissement *L. Van Houtte*, a des feuilles lignées de blanc; elle a obtenu le 1<sup>er</sup> prix, comme plante nouvelle de semis, à l'exposition nationale de Bruxelles, en 1880.

**Croton Baron de Rothschild** . . . 15 "

Variété de tout premier ordre, feuilles larges, d'un vert très-foncé, panachées de rouge sang ou de jaune. Tiges et pétioles d'un rouge foncé.

Fr. C.

**Croton Bergmanni** . . . 25 "

Variété splendide, très-ornementale, tige verte, grosse, munie de nombreuses feuilles moyeuement pétiolées, étalées, ganfrées ou ondulées, à pétiole vert en dessous, blanc rosé en dessus; limbe ovale, elliptique, atteignant facilement 38 centimètres de longueur sur 10 à 12 centimètres de largeur, d'un vert foncé, traversé, au centre de la feuille et d'un bout à l'autre, par une bande irrégulière de 2 à 3 centimètres de largeur, d'un blanc d'ivoire ainsi que toutes les nervures correspondantes, de plus bel effet.

— **Carrieri** . . . 15 "

Superbe variété, remarquable par la noblesse de son port et l'élégance de son abondant feuillage. Sa tige verte s'élève à plusieurs mètres de hauteur; ses feuilles sont longuement lancéolées et atteignent 40 à 45 centimètres de longueur sur 6 à 7 centimètres de largeur; pétiole de 6 centimètres de longueur, d'un jaune d'or; limbe gracieusement arqué et nuagé d'un jaune d'or très-luisant.

— **Comte de Germiny** . . . 20 "

Feuilles d'un vert olivâtre, tacheté de jaune d'or, veine médiane d'un cramoi clair.

— **Crown Prince** . . . 15 "

Feuilles lancéolées, de 12 à 15 pouces de longueur sur 2 pouces de largeur, d'un vert luisant, à veines centrales et latérales d'un jaune d'or vif, s'étendant parfois jusqu'au bord.

— **Duvali** . . . 15 "

Variété très-rigoureuse, très-rustique, d'un beau port, à feuilles d'abord érigées, puis recourbées à l'état adulte, lancéolées et acuminées, d'un vert clair recouvert d'une bordure blanche au centre et diversement nuagée de blanc pur sur toute la surface de la feuille. Le pétiole vert clair a 3 à 4 centimètres de longueur, les feuilles ont 35 à 38 centimètres de longueur sur 6 à 7 centimètres de largeur.

— **Hanburyanum** . . . 30 "

Variété très-belle et très-distincte, d'un port étalé, feuilles de 15 pouces de longueur sur 2 pouces de largeur, d'un vert olivâtre élégamment marqué de jaune d'or et de cramoi rosâtre.

— **Mac Farlanei** . . . 20 "

Feuilles pendantes, arquées, linéaires-lancéolées, de 9 à 12 pouces de longueur sur un pouce de largeur, jaunes dans leur jeunesse, irrégulièrement tachetées de vert foncé; toutes les veines et la marge sont d'un cramoi clair.

— **Novillea** . . . 20 "

Jeunes, les feuilles sont d'un vert olivâtre clair barré de jaune; adultes, le vert devient plus foncé et est marqué de cramoi ombré d'orange; dans les deux cas, la plante est couverte d'une teinte métallique toute particulière.

— **Truffantianum** . . . 25 "

Belle variété dont les feuilles sont marquées de cramoi et de jaune sur fond vert.

— **Warreni** . . . 25 à 50 "

Feuilles en spirales, retombantes, vivement panachées de rose et de carmin, tournant au cramoi, de beaucoup d'effet.

**Curmeria Wallisi** . . . 25 à 50 "

Très-jolie *Aroidée* à feuillage ornemental. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées.

**Cyphonandra argentea** . . . 15 à 30 "

Charmante plante brésilienne à feuilles elliptiques, de 8 à 10 pouces de longueur sur 4 pouces de largeur, fortement costées, d'un blanc argenté barré par de petites veines transversales vertes.



- Fr. C.
- Cypripedium vexillarium** . . . . . 100 "
- Espèce à grande fleur tout à fait distincte, de brillant effet, l'une des plus jolies du genre.
- Dieffenbachia amœna** . . . . . 25 "
- Feuilles oblongues-aiguës, d'un vert foncé maculé d'abondantes taches allongées, blanches et jaune pâle, très-apparences sur les deux faces.
- **Carderi** . . . . . 25 "
- Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert foncé, admirablement et régulièrement maculé et panaché.
- **delacta** . . . . . 25 "
- Feuilles elliptiques-lancéolées, de 8 à 10 pouces de longueur, d'un vert satiné tacheté de blanc.
- **Leopoldi** . . . . . 25 "
- Aroïdée d'une grande beauté. Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert luisant, traversées par une large et forte côte d'un blanc d'ivoire, bordée, dans toute sa longueur, par une bande blanche, produisant un brillant contraste avec le fond vert foncé.
- Dipladenia profusa** . . . . . 25 "
- Espèce de floraison facile, à fleurs très-grandes, d'un rouge vif.
- Dracæna albo-marginata** . . . . . 15 "
- Feuilles érigées, d'un vert foncé bordé de rose, portées sur de longs pédoncules tétrés de rose.
- **anerleyensis** . . . . . 15 "
- Feuilles larges, pendantes, recourbées, d'un beau vert légèrement marginé de blanc.
- **Goldiana** . . . . . 25 à 75 "
- Magnifique nouveauté africaine, unique en son genre, tout à fait hors ligne et d'un grand effet ornemental; port érigé, feuilles grandes, bien étalées, dont la page supérieure est couverte de nombreuses marbrures fourchues, alternativement d'un vert foncé et d'un blanc légèrement verdâtre, et dont la page inférieure est d'un vert clair.
- **Mrs. C. J. Freake** . . . . . 15 "
- Très-élégante variété nouvelle, à feuilles lancéolées, recourbées, d'un vert foncé bordé d'une étroite ligne rose pourprée.
- **Princess Margaret** (FLORE, XXIII, 13) . . . . . 20 à 40 "
- Feuilles d'environ 18 pouces de longueur, d'un blanc crème ombré de vert à l'état adulte, avec quelques stries d'un vert foncé, médiane d'un cramoisi pâle; variété distincte et remarquable par ses coloris très-diversifiés.
- Garcinia Mangostana** (FLORE, XXII, 191) . . . . . 75 à 200 "
- Le *Mangostan* dont le beau fruit rouge violacé a la forme d'une petite orange et est l'un des plus exquis des régions tropicales; ses fleurs sont belles, d'un rouge carminé ombré de rouge noirâtre sur une partie de chaque pétale.
- Hemanthus Kalbreyeri** (FLORE, XXIII, 17) . . . . . 5 à 10 "
- Scapo solide et tacheté de rouge clair; splendide ombelle d'environ 15 centimètres de diamètre, portant plus de cent fleurs d'un vermillon éclatant.

- Fr. C.
- Hibiscus schizopetalus** (FLORE, XXIII, 69) . . . . . 10 "
- Espèce très-curieuse et très-ornementale, à fleurs pendantes, dont les pétales, fortement laciniés et frangés, sont d'un rouge orangé vif.
- Himantophyllum miniatum maximum**  
**Van Houttei** . . . . . 25 à 50 "
- Hybride superbe gagné dans l'Établissement à fleurs amples, d'un rouge minium vif, portées sur des hampes élevées.
- **Mad. L. Van Houtte** . . . . . 125 à 1000 "
- **Madem. Marie Van Houtte**  
 125 à 1000 "
- **Madem. Marie Reimers** (FLORE, XXIII, 9) . . . . . 100 à 500 "
- Ces trois superbes nouveautés font partie d'un ensemble de vingt variétés plus belles les unes que les autres, que nous avons acquises de M. Reimers, d'Hambourg; elles donnent de larges bouquets de fleurs, grandes, bien faites, bien posées, d'une tenna parfaite, et des coloris rouges minium les plus éblouissants. Elles viennent d'obtenir, par acclamation, une médaille d'or à l'exposition de Gand de cette année.
- Ixora Duchess of Teck** . . . . . 6 "
- Charmants bouquets, compactes et bien arrondis, de 5 pouces de diamètre, de fleurs d'un rouge saumon ombré d'écarlate, avec reflet violet vers le centre.
- **picturata** . . . . . 15 "
- Hybride très-beau et très-distinct, à bouquets compactes; excellente plante d'exposition.
- Kentia Van Houttei** . . . . . 150 à 500 "
- Lælia autumnalis atrombens** . . . . . 150 "
- Licuala grandis** (*Pritchardia*) . . . . . 125 "
- Palmier nouveau de tout premier ordre, d'un port superbe, d'une élégance de feuillage sans pareille.
- Masdevallia Harryana Van Houttei** . . . . . 100 "
- **Lindeni Cannarti** . . . . . 100 "
- Espèce à très-grandes fleurs.
- Nepenthes albo-marginata** (FLORE, XXII, 165) . . . . . 200 "
- Grande urne d'un vert gai, bordé de blanc à sa partie supérieure, près de l'ouverture.
- **bicalcarata** . . . . . 75 "
- Urne de forte texture et de forme élégante, de 5 à 6 pouces de longueur sur 3 à 4 pouces de largeur, d'un cramoisi clair marqué de lignes parallèles, dessous de l'opercule armé de deux éperons, d'où son nom de *bicalcarata*. Une des plus belles espèces introduites jusqu'à ce jour.
- **Outramiana** . . . . . 150 à 200 "
- Urne de 5 pouces de longueur, d'un vert jaunâtre fortement tacheté de long sang.
- Pavonia Makoyana** . . . . . 15 "
- Nouveauté hors ligne fleurissant une bonne partie de l'année, très-recommandable.
- Philodendron Carderi** . . . . . 15 "
- Feuilles en cœur, larges, d'un vert bouteille foncé, luisant, à côte principale marquée de lignes d'un vert glauque.
- Zamia Hildebrandti** . . . . . 10 à 300 "



# BEGONIA DISCOLOR-REX.

Magnifiques nouveautés mises au commerce depuis le 1<sup>er</sup> novembre 1880.

Ces nouveautés ne ressemblent en rien aux variétés primitivement émises; leur magnifique feuillage panaché ou zonné rappelle les plus belles sortes de serre chaude.

Ces hybrides rustiques ont le port et la floraison du *Begonia discolor* type; ils forment, en peu de temps, de fortes plantes touffues, très-décoratives, pouvant atteindre 60 à 90 centimètres de hauteur, comme celles couronnées à Lyon en septembre dernier, et sur lesquelles on comptait plus de cent feuilles; ils se plaisent surtout en pleine terre, soit dehors l'été, à l'ombre, soit en serre ou sous châssis; on les relève facilement en mottes, pour les mettre en pots au fur et à mesure des besoins.

Pièce, au choix de l'amateur . . . 8 francs.

Six variétés, à notre choix . . . 40 "

Les dix variétés . . . 70 "

**Alégatière (Bruant).** — Variété très-caulescente, ayant la végétation, l'extrême vigueur et la floraison du *B. discolor*. Grand et beau feuillage supporté par de longs pétioles, feuilles cordiformes, d'un vert foncé, centre et bords violacés avec la zone du *B. Rex* parfaitement dessinée, le reste sablé de blanc, revers pourpre.

**Baronne Leroy (Bruant).** — Variété très vigoureuse, à beau feuillage de la forme et de la grandeur de celui du *B. discolor*, d'un vert tendre, centre lavé de violet, bords liserés de violet; toute la surface est couverte d'un nombre infini de petits points blancs, réguliers, du plus joli effet.

**Ed. Pynaort (Bruant).** — Variété d'un superbe effet. Feuillage de bonne largeur, d'un bronze noirâtre, belle et large zone d'un blanc très-pur, nettement dessinée, entourée de vert vif à sa plus grande circonférence.

**Klissing Sohn (Bruant).** — Variété très-vigoureuse, magnifique, à très-grand feuillage vert bronze foncé, parsemé de macules blanches, celles du centre ordinairement plus larges et disposées en zone, qui est parfois parfaitement régulière comme celle du *B. Rex*, revers des feuilles d'un pourpre clair, larges fleurs roses.

**Le florifère (Bruant).** — Variété très-ramifiée, vigoureuse, rustique, remarquable par sa floraison hâtive, identique à celle du *B. discolor* et aussi abondante. Feuillage moyen, allongé, vert foncé autour des nervures, le reste d'un blanc pur.

**Mad. J. Ménéreau (Bruant).** Feuillage de la grandeur de celui du *B. discolor*, orné

d'une magnifique panachure: larges macules d'un blanc satiné très-brillant, disposées en zone, centre violet marbré de blanc, circonférence d'un vert clair marbré de blanc.

**MM. Nicholson (Bruant).** — Variété très-vigoureuse, touffue, peu caulescente, fleurs d'un blanc carné. Gros et longs pétioles hérissés d'écaillés, supportant des feuilles énormes, de dimensions égales à celles des variétés de serre chaude, d'un blanc argenté uniforme à reflets métalliques très-brillants, grosses nervures se dessinant en vert foncé.

**Perle Poitevine (Bruant).** — Superbe variété de végétation ordinaire. Feuillage moyen, magnifique, d'un blanc métallique très-brillant à reflets rosés, avec un petit centre vert bronze foncé, formant contraste; jolies fleurs roses.

**Président de la Devansaye (Bruant).** — Variété très-vigoureuse, de végétation rapide, les jeunes feuilles d'un rose pourpre, les adultes vertes reflétées de pourpre chatoyant, parsemées de points blancs, avec des macules argentées disposées en zone; nervures d'un vert foncé, revers des feuilles d'un pourpre vif, fleurs grandes, d'un rose vif, identiques à celles du *B. discolor*.

**Professeur Poirault (Bruant).** — Variété trapue, demi-caulescente, à beau feuillage orné d'une large zone blanche à reflets métalliques, les bords et le centre d'un vert poudré de blanc, nervures prononcées; beaux bouquets de larges fleurs roses, portées sur de longs pédoncules érigés.



CULTURES  
DE  
LOUIS VAN HOUTTE,  
FOURNISSEUR DU ROI,  
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,  
à GAND (BELGIQUE).

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

Les indications qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France.

N. B. Les plantes marquées d'un :

- b* sont bulbeuses ou tuberculeuses ;
- e* peuvent passer l'été dehors, en pots ;  
peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;
- g* sont grimpantes ;
- or* se plaisent dans la serre à Orchidées, c'est-à-dire chaude et humide ;
- pt* sont des plantes qui, mises en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent à l'ornementation des jardins ;
- aq* sont des plantes aquatiques.

L'indication (FLORE...), placée à la suite des noms d'une plante, signifie que celle-ci a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, splendide recueil qui se publie dans l'Etablissement, dont 22 volumes et 2 fascicules du 23<sup>me</sup> volume ont paru jusqu'à ce jour, et dont les prix et conditions de vente se trouvent rappelés sur la couverture du présent catalogue.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées.

Les plantes nouvelles ou rares sont imprimées en caractères gras.

	Fr. C.		Fr. C.
<i>t</i> <b>Abutilon Sellowianum variegatum</b> 2 à 3 "		<i>pt</i> <b>Achyranthes acuminata</b> . . . . .	" 50
Le plus beau de tous les Abutilon connus. Feuilles très-grandes, richement panachées, de toute beauté.		" — aureo-variegata. . . . .	" 50
<i>or</i> <b>Acalypha Macafeeana</b> . . . . . 2 "		" — Lindenii . . . . .	" 50
Belles feuilles richement colorées dans leur jeunesse.		" — Verschaffelti (FLORE, XV, 191). "	50
" — <b>macrophylla</b> . . . . . 2 à 10 "		" — aureo-variegata. . . . .	" 50
" — <b>mosaica</b> . . . . . 2 "		" — Wallisi . . . . .	" 50
" — <b>torta</b> . . . . . 2 "		<i>or</i> <b>Adelaster albo-venosus</b> . . . . .	5 "
" — <b>tricolor</b> . . . . . 2 "		" <b>Alibertia edulis</b> . . . . .	10 "
<i>t</i> <b>Acanthus montanus</b> . . . . . 2 "		La Goyave noire de la Guyane.	
		<i>g,or</i> <b>I. Allamanda Hendersoni</b> . . . . .	4 "



	Fr. C.
<i>g, or</i> 2. <i>Allamanda neriifolia</i> (FL., IX, 129) . . . . .	4 " "
" 3. — <i>nobilis</i> (FLORE, XVIII, 25) . . . . .	5 " "
" 6. — <i>Wardleiana</i> . . . . .	5 " "
<i>t</i> <i>Alpinia Bangka</i> . . . . .	2 " "
" — <i>calcarata</i> . . . . .	2 " "
" — <i>nufans</i> ( <i>Globba</i> ) . . . . .	4 " "
<i>or</i> — <i>vittata</i> . . . . .	3 à 100 " "
Superbe plante très-décorative, à feuilles d'un beau vert, ornées de larges bandes blanches.	
<i>pt</i> <i>Alternanthera amabilis</i> . . . . .	50 " "
" — — <i>latifolia</i> . . . . .	50 " "
" — — <i>versicolor</i> . . . . .	50 " "
" — — <i>amœna</i> . . . . .	50 " "
" — — <i>atropurpurea</i> . . . . .	50 " "
" — — <i>paronychioides</i> . . . . .	50 " "
" — — <i>aurea major</i> . . . . .	2 " "
" — — <i>spatulata</i> . . . . .	50 " "
<i>t</i> <i>Amomum gracile</i> . . . . .	3 " "
<i>or</i> <i>Anamyrta Cocculus</i> . . . . .	10 " "
" <i>Anchietea salutaris</i> . . . . .	10 " "
Produit un purgatif très-violent.	
<i>t</i> <i>Anona antioquensis</i> . . . . .	4 " "
" — <i>Cherimolia</i> . . . . .	5 " "
" — <i>muricata</i> . . . . .	5 " "
" — <i>squamosa</i> . . . . .	5 " "
<i>or</i> <i>Antiaris toxicaria</i> . . . . .	20 " "
<i>L'Upas de Java.</i>	
<i>g, t</i> <i>Antigonon guatemalensis</i> . . . . .	3 " "
<i>or</i> <i>Aphelandra aurantiaca</i> Roellii (FLORE, XVII, 53) . . . . .	2 " "
" — <i>fascinator</i> . . . . .	3 " "
" — <i>nitens</i> . . . . .	3 " "
" — <i>Porteana</i> (FLORE, X, 41) . . . . .	2 " "
" — <i>Sinitzini</i> . . . . .	3 " "
Feuilles grandes, d'un vert luisant au-dessus, pourpres en dessous; épi de fleurs d'un vermillon éclatant.	
" — <i>squarrosa</i> Leopoldi (FL., IX, 85) . . . . .	2 " "
" — <i>variegata</i> . . . . .	2 " "
<i>t</i> <i>Aralia Chabrierii</i> . . . . .	15 à 50 " "
Nouvel <i>Aralia</i> (?) de la Nouvelle-Calédonie constituant un charmant arbuste d'appartement, d'un port élégant, d'une culture facile, à feuilles très-étroites et très-longues, d'un beau vert foncé avec la veine médiane brunâtre.	
<i>e</i> — <i>dactylifolia</i> . . . . .	6 à 10 " "
" — <i>elegantissima</i> . . . . .	8 à 40 " "
" — <i>elliptica</i> . . . . .	15 " "
" — <i>filicifolia</i> . . . . .	3 à 10 " "
" — <i>foliolosa</i> . . . . .	25 " "
" — <i>Guilfoylei</i> . . . . .	5 " "
" — <i>Humboldtii</i> . . . . .	10 " "
" — <i>laciniata</i> . . . . .	2 à 5 " "
Feuilles marquées de brun olivâtre pâle.	
" — <i>leptophylla</i> . . . . .	5 " "
" — <i>monstrosa</i> . . . . .	15 à 25 " "
Superbe espèce à feuilles d'un vert foncé bordé de blanc, avec des déchiquetures sur les bords.	
" — <i>Osyana</i> . . . . .	6 " "
<i>pt</i> — <i>papyrifera</i> (FLORE, VII, 153) . . . . .	1 à 4 " "
<i>e</i> — <i>plataniifolia</i> . . . . .	3 à 6 " "
" — <i>plumata</i> . . . . .	5 " "
" — <i>reticulata</i> . . . . .	3 " "

	Fr. C.
<i>e</i> <i>Aralia reticulata gracillima</i> . . . . .	5 " "
" — <i>spectabilis</i> . . . . .	30 " "
Plante ornementale à gracieuses feuilles pennées, d'un beau port, robuste et facile à cultiver.	
<i>t</i> — <i>Veitchi</i> . . . . .	4 à 25 " "
" — — <i>gracillima</i> . . . . .	6 à 15 " "
C'est le plus précieux et le plus beau du genre; ses feuilles sont finement découpées en divisions de 5 à 7 fragments, légèrement recourbées à leur extrémité, d'un brun ferrugineux très-foncé, parcouru par des veines d'un blanc rosé sur les bords; la nervure médiane pourpre est très-saillante sur les deux faces; l'ensemble est d'une élégance sans égale.	
" <i>Ardisia crenulata</i> . . . . .	2 " "
" — — <i>fructu albo</i> . . . . .	2 " "
" — <i>Groenewegeni</i> . . . . .	4 " "
" — <i>villosa</i> . . . . .	2 " "
<i>or</i> <i>Argania Sideroxyylon</i> . . . . .	10 " "
<i>g, t</i> 5. <i>Aristolochia barbata</i> . . . . .	6 " "
" 2. — <i>Duchartrei</i> (FL., XVIII, 35) . . . . .	5 " "
" 17. — <i>galeata</i> . . . . .	6 " "
" 3. — <i>gigas</i> . . . . .	5 " "
" 20. — <i>indica</i> . . . . .	2 " "
" 6. — <i>labiosa</i> . . . . .	3 " "
" 8. — <i>ornithocephala</i> (FL., XVII, 145) . . . . .	5 " "
" 9. — <i>ringens</i> . . . . .	4 " "
" 12. — <i>trilobata</i> . . . . .	3 " "
" 18. — <i>variegata</i> . . . . .	5 " "
Feuillage tout marbré.	
<i>t</i> <i>Arrabidaea rosea</i> . . . . .	2 " "
" <i>Artanthe magnifica</i> . . . . .	2 à 5 " "
Feuilles grandes, d'un vert métallique très-brillant au-dessus, rouges en dessous; tige et pétioles d'un vert clair zébré de blanc.	
" <i>Artocarpus Cannoni</i> . . . . .	3 à 5 " "
<i>or</i> — <i>incisa</i> . . . . .	" " "
Le célèbre <i>Arbre à pain</i> des îles de la mer du Sud.	
<i>t</i> — <i>laciniata</i> . . . . .	2 " "
" — — <i>metallica</i> . . . . .	2 " "
<i>or</i> — <i>rigida</i> . . . . .	" " "
<i>t</i> <i>Aspidistra elatior</i> . . . . .	1 " "
" — — <i>foliis aureo-punctatis</i> . . . . .	3 " "
" — — — <i>vittatis</i> . . . . .	2 à 100 " "
" <i>Astrapæa Wallichii</i> . . . . .	3 à 15 " "
<i>or</i> <i>Ataccia cristata</i> (FLORE, IX, 13) . . . . .	10 à 25 " "
Plante dont l'inflorescence singulière consiste en une ombelle longuement pédonculée de fleurs sombres, entre lesquelles pendent, comme de longs fils, les pédicelles des fleurs avortées, ce qui leur donne un caractère méduséen.	
" — <i>pinnatifida</i> ( <i>Tacca</i> ) . . . . .	10 " "
<i>t</i> <i>Bambusa stricta</i> . . . . .	25 " "
" — <i>verticillata</i> . . . . .	15 " "
<i>or</i> <i>Banisteria adenopoda</i> . . . . .	3 " "
<i>t</i> <i>Barbacenia hybrida</i> . . . . .	3 " "
<i>or</i> <i>Barringtonia racemosa</i> . . . . .	10 " "
" <i>Bertolonia guttata albo-punctatissima</i> . . . . .	5 " "
" — — <i>roseo-punctatissima</i> . . . . .	5 " "
Variétés à feuilles admirablement ponctuées, l'une de blanc, l'autre de rose.	
" — <i>hybrida Marchandi</i> ( <i>L. Van Houtte</i> ) . . . . .	3 " "
Feuilles d'un vert velouté, rubané de blanc.	



- Fr. C.
- or *Bertolonia hybrida Mirandæi* (FLORE, XX, 135) (*L. Van Houtte*). 5 "
- Feuilles d'un vert olivâtre velouté, convert de perles carminées.
- " — — *smaragdina* ( ) . . . . . 5 "
- Feuilles d'un vert d'émeraude très-vif.
- " — — *Van Houttei* (FL., XX, 109) ( ) 5 "
- Feuilles d'un vert sombre, veiné d'un rouge d'aniline vif et parsemé de milliers de points de même couleur : coloris vraiment extraordinaire.
- " — — *marmorata* (FLORE, VII, 291) . 3 "
- Feuilles d'un vert obscur et miroitant, s'animant, suivant le jeu de la lumière, de brillants reflets cuivrés, et ornées, sur leur longueur, de marbrures blanches.
- " — — *margaritacea* (FLORE, XVI, 165). 6 "
- Espèce à feuilles d'un vert foncé velouté, pointillé de blanc pur.

### NOUVEAUTÉS de 1879.

On doit se rappeler l'effet prodigieux que produisirent les *Bertolonia nouveaux* de l'Établissement, à l'exposition internationale de Gand, en 1878, et à l'exposition nationale de Bruxelles, en 1880, où ils furent honorés d'une médaille d'or. Tous ces superbes hybrides ont été obtenus de fécondations artificielles intelligemment opérées par le chef de section, F. Marchand, à qui on est aussi redevable des variétés *Marchandi*, *Mirandæi*, *smaragdina* et *Van Houttei*, citées ci-devant.

- " *Bertolonia hybrida Disraeli* (*L. Van Houtte*). . . . . 10 "
- Feuilles très-grandes, allongées, d'un vert brunâtre, veiné et pointillé de blanc rosâtre.
- " — — *Galieræ* (*L. Van Houtte*). . . . . 15 "
- Feuilles moyennes, recourbées, d'un vert sombre, veiné et pointillé de rose pâle comme vernissé.
- " — — *Gladstonei* (*L. Van Houtte*). . . . . 15 "
- Feuilles allongées, d'un beau vert, fortement veiné de blanc argenté et légèrement pointillé de blanc sur le bord.
- " — — *Killischii* (*L. Van Houtte*). . . . . 15 "
- Feuilles grandes, d'un vert clair, veiné de blanc crème.
- " — — *Ohlendorffi* (*L. Van Houtte*). . . . . 10 "
- Feuilles grandes, d'un vert très-foncé velouté, veiné et pointillé de carmin vif.
- " — — *Rodekiana* (FLORE, XXIII, 27) (*L. Van Houtte*). . . . . 15 "
- Feuilles grandes, d'un vert foncé, veiné et ponctué de blanc pur; variété de tout premier mérite.

### NOUVEAUTÉS de 1881.

- " *Bertolonia hybrida Gibsoniana* (*L. Van Houtte*). . . . . 50 "
- Feuilles tout le fond, d'un vert brunâtre, est veiné, quadrillé et pointillé du rose le plus scintillant, d'un ensemble de toute beauté.
- " — — *Hrubyana* (FLORE, XXIII, 25) (*L. Van Houtte*). . . . . 50 "
- Feuilles parcourues, dans leur longueur, par des nervures d'un beau vert sombre sur fond blanc, et dont les intervalles sont ornés d'un quadrillé vert de deux nuances, que recouvre un pointillé blanc simulant de petites perles; nouveauté de de premier ordre.
- " — — *Legrelleana* (FLORE, XXIII, 97) (*L. Van Houtte*). . . . . 50 "
- Feuilles d'un vert de mer, ornées de nervures, de nervures et d'un fin pointillé d'un blanc argenté; nouveauté de très-grand effet.
- " — — *vittata* (*L. Van Houtte*). . . . . 25 "
- Feuilles d'un vert brunâtre, parcourues, dans leur longueur, par des bandes étroites d'un vert opalin.
- e *Bignonia Lindleyi* (FLORE, IX, 135) . 2 "
- Espèce florifère, à gros bouquets de fleurs d'un bleu lilacé.

- Fr. C.
- t *Bignonia ornata*. . . . . 2 "
- " — *Roezlii villosa* . . . . . 3 "
- " *Bixa Orellana* . . . . . 15 "
- Plante tinctoriale produisant le *Rocou*, couleur rouge dont les Indiens se peignent le corps.
- or *Blighia sapida* . . . . . 25 "
- t *Bœhmeria macrophylla* . . . . . 2 "
- " — *tenacissima* . . . . . 2 "
- " *Bomarea Carderi* . . . . . 25 "
- Ce nouveau *Bomarea*, le plus beau du genre, donne de charmantes fleurs pendantes, dans le genre de celles des *Lapageria*, d'un rose clair des plus vifs.
- " *Bombax Ceiba* . . . . . 10 "
- L'Arbre à soie.
- e 11. *Bougainvillea elegantissima* . . . . . 2 "
- " 12. — *fastuosa* . . . . . 2 "
- " 8. — *glabra* . . . . . 2 "
- " 2. — *gracilis* . . . . . 2 "
- " 3. — *lateritia* . . . . . 2 "
- " 10. — *speciosa* . . . . . 2 "
- " 13. — *spectabilis foliis marmoratis*. 2 "
- " 9. — *splendida* . . . . . 2 "
- " *Brosimum Alicastrum* . . . . . 10 "
- or *Brownea Ariza* . . . . . 10 à 20 "
- " — *erecta* . . . . . 10 à 25 "
- " — *graciceps* (FLORE, VI, 153) . . . . . 20 "
- t — *macrophylla* . . . . . 15 "
- t,g *Calonyction sanguinolentum* . . . . . 2 "
- or *Calophyllum Madruno* . . . . . 5 à 25 "
- t,g *Calypttrion Aubletii*. . . . . 2 "
- " *Campomanesia hypoleuca* . . . . . 5 "
- t *Campsidium filicifolium* . . . . . 2 "
- " *Camptopus Manni* . . . . . 5 à 15 "
- Rubiacée à très-grandes feuilles ornementales.
- or *Carapa guianensis* . . . . . 10 "
- " *Carlissa grandiflora*. . . . . 5 "
- " 74. *Carludovica atrovirens (plicata)* 8 à 15 "
- " 76. — *humilis* . . . . . 25 "
- " 326. — *macropoda* . . . . . 10 à 100 "
- " 78. — *microcephala* . . . . . 4 à 15 "
- " 79. — *palmata* . . . . . 8 à 25 "
- Ses feuilles plissées en éventail, partagées en 3-5 lobes palmés, fournissent la matière des chapeaux de Panama, si remarquables par la finesse et la souplesse de leur tissu.
- " 327. — *Sartori* . . . . . 10 à 50 "
- t *Carolinea alba* . . . . . 3 à 10 "
- " — *macrocarpa* . . . . . 3 "
- " — *mexicana* . . . . . 3 "
- " *Castanospermum albicans*. . . . . 5 "
- or *Cavanillea philippensis*. . . . . 15 à 25 "
- " *Centradenia floribunda*. . . . . 1 "
- " — *grandifolia* . . . . . 1 "
- " — *rosea* . . . . . 1 "
- e *Centropogon Lucyanus*. . . . . 2 "
- or *Centrosolenia ænea*. . . . . 2 "
- Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique au-dessus, violet lié de vin en dessous.
- " *Cephaelis Ipecacuanha*. . . . . 3 "
- Plante médicinale herbacée du Brésil, dont les racines jouissent de propriétés anti-dysentériques et émétiques.



Fr. C.

e *Cephalotus follicularis* . . . . . 6 "   
 La curieuse plante aux petites canettes, en exemplaires très-forts importés du pays natal.

g,t *Ceropegia Saundersi* . . . . . 5 "   
 " — *stapelæformis* (Fl., II, juin, pl. IV) 2 "

pt *Cestrum aurantiacum* . . . . . 2 "   
 t *Chavica officinarum* . . . . . 5 "

or *Chlorocodon Whitei* . . . . . 5 "   
 " *Chrysophyllum albidum* . . . . . 10 "

" — *Cainito* . . . . . 10 "   
 " — *macrophyllum* . . . . . 20 à 300 "

Magnifiques feuilles aux revers tissés de jaune d'or.   
 t *Cicca disticha* . . . . . 10 "   
 " *G. Cinchona Calysaya* . . . . . 10 "   
 L'écorce du *Quinquina* est le fébrifuge le plus puissant que l'on connaisse.

or *Cinnamomum aromaticum* . . . . . 5 à 10 "   
 " — *Canella* . . . . . 3 à 10 "

Ces deux espèces produisent la cannelle du commerce.   
 " — *Kiamis* . . . . . 3 "   
 " — *laurifolium* . . . . . 3 à 8 "   
 " — *pedunculatum* . . . . . 5 "   
 t — *sericeum* . . . . . 3 "

Le Cannelier soyeux du Japon.   
 or,g *Cissus albo-nitens* . . . . . 2 "   
 " — *amazonica* . . . . . 2 "   
 " — *argentea* . . . . . 2 "   
 " — *discolor* (FLORE, VIII, 149) . . . . . 2 "

Charmante liane dont le feuillage, violet et vert sombre, est délicatement marbré de blanc argenté.   
 " — *Endresi* . . . . . 2 "   
 " — *Lindeni* . . . . . 2 "   
 " — *porphyrophylla* (Fl., XIV, 323) 3 "

Jolie plante grimpante dont les feuilles olivâtres sont nervurées de rouge.   
 e *Clerodendron Bungei foliis variegatis* 10 "   
 " — *fulgens* . . . . . 5 "   
 " — *Kempferi* . . . . . 4 "   
 ng — *Thomsonæ* (Marshalli) (Fl., XV, 37) 2 "

ng — — *Rollissoni* . . . . . 5 "   
 ng — — *speciosum* . . . . . 2 "   
 " — *villosum* . . . . . 2 "

or *Clidemia vittata* . . . . . 2 à 5 "   
 Superbe Mélastomacée d'une végétation rapide et de culture facile, à nervures médianes légèrement blanchâtres.

t *Coccoloba excoriata* . . . . . 5 "   
 " — *guatemalensis* . . . . . 10 à 100 "

t — *majestica* . . . . . 5 à 10 "   
 or — *pubescens* . . . . . 20 à 75 "

L'arbre aux parasols.   
 " — *regalis* . . . . . 5 à 10 "   
 " *Cocculus Chondodendron* . . . . . 10 "

t — *laurifolius* . . . . . 3 à 8 "   
 " — *Pluckenetti* . . . . . 10 "

or *Cochliostema Jacobianum* (FLORE, XVIII, 33) . . . . . 4 à 50 "

les douze. . . . . 36 "

Magnifiques fleurs portées sur de longs pédoncules, d'un ensemble ravissant où se rencontrent le plus beau bleu d'azur et le lilas le plus tendre.

Fr. C.

or *Cochliostema Jacobianum albo-lineatum* . . . . . 40 "   
 Cette variété nouvelle, gagnée par l'établissement, a des feuilles lignées de blanc; elle a obtenu le 1<sup>er</sup> prix comme plante nouvelle de semis à l'exposition nationale de Bruxelles, en 1880.

Codæum, voir *Croton* ci-après.   
 " *Coffea arabica* . . . . . 3 à 25 "

Le Caféier ordinaire à feuillage luisant, d'un vert foncé, à jolies fleurs blanches légèrement odorantes, auxquelles succèdent des baies rougeâtres.   
 " — — *angustifolia* . . . . . 4 "   
 " — — *foliis variegatis* . . . . . 5 à 10 "

" — — *liberica* . . . . . 2 "   
 le cent . . . . . 150 "

Feuillage plus grand, plus vigoureux que celui des autres espèces; fruits plus gros et d'un arôme plus prononcé quand ils sont torréfiés. — L'établissement traite par correspondance pour les fortes parties de *Coffea liberica* destinées aux colonies, où il en a déjà énormément importé.   
 " — *Moka* . . . . . 4 "   
 " — *myrtifolia* . . . . . 8 "

t *Cola Commersoni* . . . . . 10 à 25 "   
 " — *floribunda* . . . . . 10 à 25 "

Très-belle et curieuse plante, à grand feuillage ailé, à jolies fleurs orangées et blanches.   
 or *Combretum Afzeli* . . . . . 3 "   
 " — *coccineum* . . . . . 5 à 15 "

Excellente plante dont les fleurs sont d'un écarlate très-vif.   
 t — *micropetalum* (FLORE, XIX, 149) 3 à 10 "

Espèce très-florifère, à nombreuses fleurs d'un beau jaune.   
 or *Coniza grandiflora* . . . . . 5 "   
 " *Cookia punctata* . . . . . 15 à 25 "

" *Copaifera officinalis* . . . . . 30 "   
 Arbre brésilien à feuilles pennées, à fleurs blanches, donnant un produit médicinal bien connu.

ng *Coryanthelium Moronæ* . . . . . 5 "   
 t " *Corynostylis Hybanthus albiflora* (Calyptrion) (FLORE, XXI, 107) . . . . . 2 "

or *Cossignia borbonica* . . . . . " "   
 Arbuste très-distiqué, à feuilles ailées, cotonneuses, ornementales, à petites fleurs blanches.

t *Crescentia Cujete* . . . . . 10 "   
 Le *Calebassier* dont les habitants de l'Amérique équinoxiale tirent leur vaisselle.

or " — *macrophylla* (*Ferdinandusa superba*) 5 "   
 " 64. *Croton (Codæum) albicans* . . . . . 10 "

Variété bien distincte, à gracieuses feuilles lancéolées, de 12 à 15 pouces de longueur sur 3 pouces environ de largeur à la partie la plus large, d'un vert foncé brillant, strié et marbré de jaune d'or.

" 33. — *Andreanum* . . . . . 3 à 300 "   
 Feuilles très-grandes, d'un vert clair veiné de jaune d'or dans la jeunesse, passant ensuite par toutes les nuances du vert et du jaune, et devenant, à l'état adulte, vert foncé et rouge sang.

" 54. — *aureo-maculatum* . . . . . 3 à 75 "   
 " 73. — *Baron de Rothschild* . . . . . 15 "

" 74. — *Bergmanni* . . . . . 25 "   
 " 59. — *Burtoni* . . . . . 8 "

Feuilles lancéolées, arquées, de 12 à 15 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur, d'un vert foncé luisant, barré et marbré de jaune d'or.

" 70. — *camptophyllum* . . . . . 3 "   
 " 75. — *Carrieri* . . . . . 15 "

" 57. — *Casanovæ* . . . . . 5 à 25 "



Fr. C.

or 48. *Croton Challenger* . . . 5 à 75 "

Nouveauté de premier ordre, à feuilles largement lancéolées, légèrement recourbées, d'un vert clair fortement pointillé et strié de jaune clair; veine médiane d'un blanc crème passant au rouge carminé.

" 76. — *Comte de Germiny* . . . 20 "

" 28. — *Cooperi* . . . 4 "

" 4. — *cornutum* . . . 2 à 25 "

" 77. — *Crown Prince* . . . 15 "

Feuilles lancéolées, de 12 à 15 pouces de longueur sur 2 pouces de largeur, d'un vert luisant, à veines centrale et latérales d'un jaune d'or vif, s'étendant parfois jusqu'au bord.

" 27. — *chrysophyllum* . . . 3 "

" 5. — *discolor* . . . 3 "

" 34. — *Disraeli* . . . 5 à 15 "

" 78. — *Dormanianum* . . . 10 à 20 "

Feuilles très-singulières, en forme de violon, d'un vert luisant richement maculé et tigré de jaune orange, et veiné de rouge magenta.

" 79. — *Duvali* . . . 15 "

" 39. — *Earl of Derby* . . . 10 à 75 "

Splendide nouveauté de très-grand effet; feuilles d'un jaune brillant à reflet doré.

" 53. — *Eeckhautei* . . . 3 à 25 "

Nouveauté hors ligne introduite et mise au commerce par l'Établissement, trapue, à très-grandes feuilles allongées, d'un vert foncé tout nervuré de jaune d'or.

" 80. — *Eugénie* . . . 15 "

" 43. — *fasciatum (Hendersoni)* 3 à 100 "

Grandes feuilles de 10 pouces de longueur sur 6 de largeur, de la forme d'un œuf renversé, à queues arrondies à la base, d'un vert clair veiné de jaune vif et marqué de quelques taches et points irréguliers. Très-belle variété d'un port élancé, très-décorative.

" 17. — *fucatum* . . . 2 "

" 81. — *giganteum* . . . 3 "

" 82. — *gloriosum* . . . 20 "

" 20. — *grande* . . . 2 à 10 "

" 83. — *guineense* . . . 20 "

" 84. — *Hanburyanum* . . . 30 "

" 67. — *Hawkeri* . . . 10 "

Superbe variété d'un port sain et compacte, à feuilles larges, lancéolées, d'un blanc jaunâtre bordé de vert brillant.

" 65. — *Henryanum* . . . 25 "

Feuilles oblongues-ovées, acuminées, de 9 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur, d'un vert foncé parsemé et maculé de jaune d'or; plante décorative de tout premier ordre.

" 55. — *heteromorphum* . . . 3 "

" 7. — *Hookeri* . . . 2 à 5 "

" 58. — *Imperator* . . . 8 "

Plante très-décorative, à feuilles arquées, de 12 à 18 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur dans la partie la plus ample, d'un vert pâle ombré et marbré de blanc crème mêlé de rouge magenta; le pétiole, la ligule médiane ainsi que la marge sont de cette dernière couleur.

" 8. — *interruptum* . . . 2 à 300 "

" 9. — *irregulare* . . . 2 à 50 "

" 60. — *Jamesi* . . . 5 "

" 10. — *Johannis (angustissimum)* 3 à 30 "

" 71. — *Katoni* . . . 6 "

" 19. — *lacteam* . . . 2 "

" 21. — *limbatum* . . . 3 "

" 32. — *Lord Cairns* . . . 3 "

" 41. — *Macarthurii* . . . 6 à 20 "

Feuilles de formes très-diverses, de coloris jaune maculé, strié et barré différemment sur chacune d'elles.

Fr. C.

or 85. *Croton Mac Farlanei* . . . 20 "

Feuilles pendantes, arquées, linéaires-lancéolées, de 9 à 12 pouces de longueur sur un pouce de largeur, jaunes dans leur jeunesse, irrégulièrement tachetées de vert foncé; toutes les veines et la marge sont d'un cramoisi clair.

" 24. — *majesticum* . . . 3 à 200 "

" 86. — *Massangeanum* . . . 25 "

" 11. — *maximum* . . . 2 à 10 "

" 56. — *Moensei* . . . 5 "

" 29. — *Mooreanum* . . . 3 à 200 "

" 50. — *mutabile* . . . 10 "

Feuilles d'un vert foncé, marbrées de diverses nuances de jaune et de rose dans leur jeunesse, tournant au rouge et à l'orange à l'état adulte.

" 87. — *Nevilleæ* . . . 20 "

" 44. — *nobile* . . . 4 à 175 "

Belle nouveauté à feuilles longues, étroites, retombantes, marquées de cramoisi et de jaune sur fond vert.

" 23. — *ovalifolium* . . . 3 à 100 "

" 45. — *picturatum* . . . 5 à 100 "

Variété belle et distincte, admirablement colorée et de grand effet. Feuilles marquées de jaune clair passant au rouge, à veine médiane d'un rouge vif.

" 61. — *Prince of Wales* . . . 10 à 30 "

Espèce très-distinguée, richement colorée, la plus belle et la plus distincte de toutes celles à feuilles étroites. Ses feuilles sont pendantes, arquées, légèrement tordues; quelques-unes présentent la forme d'une spirale; toutes ont les bords élégamment ondulés. Elles sont d'un jaune pâle, bordé et marbré de carmin vif, avec de rares taches d'un vert vif; la médiane et le pétiole sont d'un rouge magenta. Vraie plante d'exposition, très-ornementale, pouvant servir avantageusement d'ornement de table.

" 42. — *Queen Victoria* . . . 8 à 25 "

Feuilles oblongues-lancéolées, de 9 à 12 pouces de longueur sur 2 pouces de largeur, d'un jaune d'or tacheté de vert; la médiane et les veines adjacentes sont d'un riche cramoisi, la marge est carminée.

" 47. — *Reginæ* . . . 6 à 15 "

Feuilles elliptiques-obovées, marquées de veines d'un jaune d'or qui deviennent rouge orangé; plante d'un aspect charmant, de forme entièrement nouvelle, d'un port élégant et de grand effet.

" 46. — *Rex* . . . 5 "

Superbe variété d'un aspect distingué, dont les feuilles tombantes sont entièrement marquées de cramoisi clair sur fond vert bronzé, avec la médiane d'un cramoisi vif très-prononcé. Les jeunes feuilles sont veinées et tachetées de jaune, et passent au cramoisi avec l'âge.

" 88. — *roseo-pictum* . . . 15 "

Feuilles vertes, la côte médiane et les bords d'un jaune pâle, ainsi que les veines principales qui sont arquées, et entre lesquelles se voient des stries jaunes qui deviennent ensuite d'une belle teinte rose, surtout vers le bord.

" 25. — *spirale* . . . 5 à 10 "

" 89. — *Spincki* . . . 15 "

" 49. — *Sunset* . . . 10 à 25 "

Feuilles d'un vert bronzé foncé, la côte médiane et le bord d'un cramoisi écarlate, tacheté de jaune d'or.

" 40. — *tortile* . . . 5 à 200 "

Feuillage tordu, très-ornemental, tout à fait distinct, d'un vert olivâtre foncé maculé de jaune; le centre est cramoisi marginé de jaune d'or.

" 90. — *Truffantianum* . . . 25 "

" 15. — *undulatum* . . . 3 "

" 52. — *Van Houttei* . . . 6 à 50 "

Nouveauté introduite par l'Établissement. Feuilles larges, de forme entièrement nouvelle, pourpres à l'état adulte, se couvrant de taches de couleur rouille; pétioles d'un blanc verdâtre. Espèce trapue et très-recommandable.



	Fr. C.
or 1. <i>Croton variegatum</i> . . . . .	2 n
n 16. — <i>Veitchii</i> . . . . .	2 à 5 n
n 91. — <i>Vervaeitii</i> . . . . .	5 n
n 26. — <i>volumum</i> . . . . .	3 à 15 n

Feuilles complètement enroulées, d'un vert foncé, barré de jaune vers le centre, d'où partent des taches jaunes régulières qui vont se fondre dans le jaune d'or du bord; veine médiane parfois un peu rosée.

n 72. — <i>Warreni</i> . . . . .	25 à 50 n
Feuilles en spirales, retombantes, vivement panachées de rose et de carmin, tournant au cramoisi, de beaucoup d'effet.	
n 18. — <i>Weismanni</i> . . . . .	3 à 50 n
n 63. — <i>Williamsi</i> . . . . .	8 n

Feuilles de 10 à 12 pouces de longueur sur 3 à 4 pouces de largeur, d'abord d'un vert olivâtre tacheté de jaune et veiné de jaune brillant, devenant ensuite d'un beau cramoisi.

n 22. — <i>Youngi</i> . . . . .	3 à 200 n
12 <i>Croton</i> en 12 sortes à mon choix : 18	
n <i>Cratæva species</i> . . . . .	10 n

Arbuste à juli feuillage trifoliolé, à fleurs blanches.

t <i>Cryptophragmium zeylanicum</i> . . . . .	2 n
n <i>Curculigo recurvata</i> . . . . .	1 à 3 n
n — — <i>foliis striatis</i> . . . . .	.6 à 100 n
n — — — <i>variegatis</i> . . . . .	.5 à 125 n
or 392. <i>Curmeria picturata</i> . . . . .	.5 à 200 n
n 417. — <i>Roezlii</i> . . . . .	.10 à 20 n
n 447. — <i>Wallisi</i> . . . . .	25 à 50 n

Très-jolie Aroïdée à feuillage ornemental. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétioles, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées.

n <i>Cyanophyllum Bowmani</i> . . . . .	3 n
n — <i>magnificum</i> . . . . .	5 à 40 n
n — <i>spectandum</i> . . . . .	3 à 10 n

Les *Cyanophyllum* sont des arbustes à grand effet. À magnifiques et amples feuillages gaufrés, colorés, veloutés et à reflets métalliques.

or <i>Cyclanthus bipartitus</i> . . . . .	5 à 15 n
Genre voisin des Palmiers, à feuilles radicales plissées et bifides.	

ag,t <i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	2 n
n — — <i>albo-variegatus</i> (FL., XIV, 238) 3	n
Plante aquatique très-curieuse, à feuilles en ombelle éti-gées, rubanées de blanc.	

<i>Cyphonandra argentea</i> . . . . .	15 à 30 n
Charmante plante brésilienne à feuilles elliptiques, de 8 à 10 pouces de longueur sur 4 pouces de largeur, fortement costées, d'un blanc argenté barré par de petites veines transversales vertes.	

e <i>Cyrtanthera chrysostephana</i> . . . . .	2 n
or <i>Cyrtoceras acuminatum</i> . . . . .	5 n
n <i>Cyrtosyphonia spectabilis</i> . . . . .	10 n
t <i>Dalechampia Roezlii alba</i> . . . . .	3 n
n — — <i>rosea</i> (FLORE, XVI, 173) . . . . .	2 n
pt <i>Datura arborea alba</i> . . . . .	5 n
n — — <i>flore pleno</i> . . . . .	4 n
n — — <i>sanguinea</i> . . . . .	4 n

<i>Dichidea bengalensis</i> . . . . .	15 n
or <i>Dichorisandra mosaica</i> (FL., XVI, 187) 10	n

Feuilles de toute beauté, d'un vert pâle entièrement couvert de mosaïques d'un vert foncé; fleurs tricolores, où le bleu le plus pur s'allie au blanc et au jaune pâle.

n — <i>ovata</i> . . . . .	2 n
n — <i>undata</i> (FLORE, XVII, 87). . . . .	2 n

Charmant feuillage gracieusement ondulé, d'un vert sombre parcouru longitudinalement par des bandes d'un vert pâle, à revers rouge lie de vin.

	Fr. C.
or <i>Dichorisandra vittata</i> . . . . .	2 n
e <i>Dionæa muscipula</i> . . . . .	4 n

La curieuse plante dite *attrape-mouches*.

b,t,g <i>Dioscorea chrysophylla</i> . . . . .	2 n
n n — <i>discolor</i> . . . . .	2 n
n n — <i>illustrata</i> . . . . .	2 n
n n — <i>melanoleuca</i> . . . . .	2 n
n n — <i>picta</i> . . . . .	1 n
n n — <i>singalensis</i> . . . . .	1 n

or,g 1. <i>Dipladenia amabilis</i> . . . . .	3 à 10 n
n n 2. — <i>amœna</i> . . . . .	5 n
n n 5. — <i>bicolor</i> . . . . .	5 n
n n 6. — <i>boliviensis</i> . . . . .	10 n
n n 17. — <i>Brearleyana</i> . . . . .	15 n
n n 19. — <i>hybrida</i> . . . . .	8 n
n n 14. — <i>magnifica</i> . . . . .	5 n
n n 20. — <i>profusa</i> . . . . .	25 n

Espèce de floraison facile, à fleurs très-grandes, d'un rouge vif.

n n 12. — <i>urophylla</i> (FLORE, V, 425) . . . . .	5 n
<i>Dipterix odorata</i> . . . . .	15 n

Cette espèce produit la fève odorante, dite *Tonka*; feuilles ailées, fleurs pourpres en panicule.

t <i>Dombeya Mastersi</i> . . . . .	3 n
or <i>Donacodes alliacea</i> . . . . .	5 n
n <i>Dorstenia argentata</i> . . . . .	2 n
n — <i>Contrayerva</i> var. <i>Riedeliana</i> . . . . .	5 n

e <i>Doryanthes Palmeri</i> . . . . .	5 à 10 n
n 129. <i>Dracæna albo-marginata</i> . . . . .	15 n

Feuilles érigées, d'un vert foncé bordé de rose, portées sur de longs pédoncules teintés de rose.

n 66. — <i>amabilis</i> . . . . .	3 à 30 n
n 126. — <i>anerleyensis</i> . . . . .	15 n

Feuilles larges, pendantes, recourbées, d'un beau vert légèrement marginé de blanc.

pt 1. — <i>australis</i> . . . . .	2 à 25 n
or 78. — <i>Balmoreaana</i> . . . . .	5 à 15 n
n 67. — <i>Baptisti</i> . . . . .	.4 à 100 n
n 93. — <i>Barroni</i> . . . . .	.4 à 75 n

Espèce ornementale à feuilles de 4 pouces de largeur, pendantes, recourbées, d'un riche bronze bordé de rose foncé à l'état adulte, d'un rose pâle étant jeunes.

pt 118. — <i>Bausei</i> . . . . .	8 à 25 n
-----------------------------------	----------

Espèce remarquable et très-ornementale, à feuilles elliptiques-oblongues d'environ 4 pouces de largeur, se recouvrant l'une l'autre, d'un bronze foncé marginé de cramoisi.

t 3. — <i>brasiliensis</i> . . . . .	2 à 5 n
n 4. — <i>cannæfolia</i> . . . . .	.4 à 20 n
or 112. — <i>Cantrellii</i> . . . . .	.8 à 15 n

Feuilles d'un vert bronzé, bordées de cramoisi à l'état adulte.

n 47. — <i>concinna</i> . . . . .	.5 à 25 n
n 68. — — <i>spec. Madagascar</i> . . . . .	.5 à 25 n
e 6. — <i>congesta</i> . . . . .	1 n
n 102. — <i>Elisabethæ</i> . . . . .	.8 à 15 n

C'est, sans contredit, le plus gracieux et le plus beau de tous les hybrides de *Dracæna*. Port élégant et ferme, feuilles larges, ovales, un peu courtes, gracieusement recourbées à leur extrémité, d'un beau vert luisant marginé de cramoisi vif sur les vieilles, avec une panachure jaune pâle et blanc crème prédominant sur les jeunes. Les pétioles sont teintés d'une légère, mais riche nuance rose. L'aspect compacte et touffu de la plante est tout à fait exceptionnel et lui vaudra une place d'hôte dans toutes les collections de *Dracæna*.

or 113. — <i>Ernesti</i> . . . . .	8 n
------------------------------------	-----



Fr. C.

- or 42. *Dracæna excelsa* . . . . . 4 à 20 "  
 " 59. — *Fraseri* . . . . . 8 à 15 "  
 " 120. — *Frederici* . . . . . 20 "

Excellente acquisition pour décoration de table, de taille moyenne, à feuilles longues, d'un bronze foncé bordé de pourpre, avec une bande verte olivâtre au centre.

- t 77. — *fruticosa* . . . . . 2 à 10 "  
 or 103. — *Gladstonei* . . . . . 5 à 15 "

Variété d'un beau port, à feuilles oblongues, épaisses, de 5 à 6 pouces de largeur, bien retombantes, d'un beau bronze foncé; les jeunes feuilles sont marginées de cramoiisi et de rouge saumon; quelques couleurs se continuent sur les pétioles. Plante très-recommandable, au point de vue décoratif, par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

- t 53. — *gloriosa (Shepherdii)* . . 3 à 25 "  
 or 100. — *Goldiana* . . . . . 25 à 75 "

Magnifique nouveauté africaine, unique en son genre, tout à fait hors ligne et d'un grand effet ornemental; port érigé, feuilles grandes, bien étalées, dont la page supérieure est couverte de nombreuses marbrures fourchues, alternativement d'un vert foncé et d'un blanc légèrement verdâtre, et dont la page inférieure est d'un vert clair.

- t 12. — *gracilis* . . . . . 3 "  
 " 33. — *Guilfoylei* . . . . . 3 à 50 "  
 or 76. — *Hendersoni* . . . . . 3 à 50 "  
 " 79. — *hybrida* . . . . . 3 à 10 "  
 " 90. — *Imperator* . . . . . 5 à 20 "  
 " 57. — *imperialis* . . . . . 5 à 15 "  
 pt 14. — *indivisa* . . . . . 2 à 5 "  
 " 15. — *lineata* . . . . . 2 à 25 "  
 " 124. — *Veitchi* . . . . . 2 à 3 "  
 or 73. — *jaspidea* . . . . . 3 à 75 "  
 t 16. — *Knerkiana* . . . . . 5 à 75 "  
 " 125. — *Krausei* . . . . . 15 "  
 " 70. — *latifolia (grandis)* . . . 6 à 100 "  
 " 131. — *longifolia* . . . . . 10 à 25 "  
 " 128. — *majestica* . . . . . 15 "

L'une des plus belles variétés du genre, à feuilles oblongues, de 4 pouces de largeur, vertes, bordées de rose saumoné.

- or 48. — *metallica* . . . . . 3 à 20 "  
 " 127. — *Mrs. C. J. Frecake* . . . 15 "

Très-élégante variété nouvelle, à feuilles lancéolées, recourbées, d'un vert foncé bordé d'une étroite ligne rose pourpre.

- " 115. — *Mrs. Wills* . . . . . 8 à 15 "

Superbe variété à feuilles d'un vert clair strié de blanc.

- " 119. — *Moensiana* . . . . . 5 à 10 "  
 " 110. — *neo-caledonica* . . . . 6 à 100 "  
 " 32. — *nigro-rubra* . . . . . 3 à 15 "  
 " 92. — *Nitzschneri* . . . . . 5 à 50 "  
 " 21. — *oculata* . . . . . 5 "  
 " 41. — *porphyrophylla* . . . . 3 à 50 "  
 " 123. — *Princess Margaret (FLORE, XXIII, 13)* . . . . 20 à 40 "

Feuilles d'environ 18 pouces de longueur, d'un blanc crème ombré de vert à l'état adulte, avec quelques stries d'un vert foncé, médiane d'un cramoiisi pâle; variété distincte et remarquable par ses coloris très-diversifiés.

- or 51. — *pulcherrima* . . . . . 5 "  
 t 22. — *punctata* . . . . . 3 "  
 or 74. — *Realii* . . . . . 4 à 50 "  
 " 94. — *recurva* . . . . . 5 à 50 "  
 " 91. — *regalis* . . . . . 5 à 30 "

Fr. C.

- or 23. *Dracæna Reginae (FLORE, XVIII, 104)* . . . . . 4 à 50 "

Magnifique variété à feuilles très-larges, compactes, vertes d'abord, largement bordées de jaune à l'état adulte, parfois fortement striées de jaune.

- " 122. — *Renardæ* . . . . . 10 à 20 "

Feuilles recourbées, pendantes, d'un vert foncé marginé de rose cramoiisi et tacheté de rose pâle, de jaune crème et d'incarnat; pétioles d'un rose tendre.

- pt 24. — *rigidifolia* . . . . . 2 "

- or 101. — *Robinsoniana* . . . . . 8 à 25 "

Plante d'un caractère particulier, à feuilles lancéolées-acuminées, arquées, d'un beau vert rayé et marqué de vert bronzé et d'écarlate brunâtre sur les plantes adultes.

- pt 26. — *rubra* . . . . . 2 "

- t 72. — *Rumphii* . . . . . 15 à 50 "

- " 53. — *Shepherdii (gloriosa)* . . 3 à 25 "

- " 99. — *speciosa* . . . . . 5 à 15 "

Feuilles larges, striées et marbrées de jaune crème, bordées de rose sur fond vert olivâtre luisant. Plante très-recommandable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

- " 46. — *splendens* . . . . . 5 à 25 "

- " 83. — *striatifolia* . . . . . 3 à 10 "

- " 106. — *Sydneyi* . . . . . 8 "

Très-belle variété à feuilles de 10 à 12 pouces de longueur sur 1 à 2 pouces de largeur, d'un vert noirâtre, à centre pourpre foncé et à bord rose foncé; les jeunes feuilles sont d'un rose cramoiisi, ainsi que les pétioles. Plante de grand mérite par son port gracieux et sa tendance à se caractériser très-jeune.

- " 95. — *Tellingi* . . . . . 5 à 30 "

- " 29. — *terminalis (versicolor)* . 3 à 10 "

- " 107. — *alba* . . . . . 6 à 20 "

Magnifique nouveauté dont les feuilles sont lancéolées, oblongues-acuminées, d'un vert luisant bien panaché de blanc pur; les jeunes feuilles sont entièrement blanches et donnent un aspect étrange à la plante. C'est une variété très-remarquable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

- " 28. — *stricta (FLORE, XV, 77)* . 3 à 25 "

Feuillage ample, vert diversement teinté et panaché du carmin le plus vif.

- t 30. — *umbraculifera* . . . . . 10 à 75 "

- or 108. — *vestalis* . . . . . 8 à 20 "

Espèce d'un port distingué, à feuilles longuement lancéolées-acuminées, d'un vert brillant marginé de blanc.

- " 109. — *vivicans* . . . . . 5 à 15 "

Espèce très-ornementale, à feuilles longues et étroites; d'un pourpre bronzé, bordé et parfois teinté de rose brillant.

- " 111. — *virginalis* . . . . . 6 à 15 "

- " 116. — *voluta* . . . . . 8 à 20 "

Feuilles remarquablement révolutes, d'un vert bouteille avec la médiane et les bords pourpres.

- " 114. — *Willsi* . . . . . 15 "

Superbe espèce à feuilles d'un beau vert bronzé, strié et marginé de larges bandes roses carminées.

- t 50. — *Youngi* . . . . . 5 à 100 "

- " *Durio zibethinus* . . . . . 10 "

Le *Dourian*, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

- g, or 3. *Echites argyrea* . . . . . 2 "

- " 8. — *nutans* . . . . . 2 "

- " 9. — *maxima (rubro-venia)*  
 (FLORE, XVII, 29) . . . . . 2 "

Feuilles admirablement veinées de carmin vif.

- t *Elettaria atropurpurea* . . . . . 3 "

- or *Episcia Luciana* . . . . . 2 "

Ravissante Gesnériacée à feuilles d'un vert noirâtre vers le milieu du limbe et s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert d'émeraude sur les bords, à grandes fleurs d'un rouge vif.



## Fr. C.

*t Epiphyllum truncatum :*

12 belles variétés greffées sur tiges . 20 "

Cactée à charmantes fleurs dans toute la gamme du blanc, du rose et du carmin, d'une floraison abondante et facile.

*n Eranthemum albo-marginatum* . . . 5 "

Superbe espèce à feuilles marginées de blanc, de bel effet.

*n — Gaudichaudi* . . . 2 "*n — igneum* (FLORE, XVII, 19) . . . 2 "*n — laxiflorum* . . . 2 "*n — marmoratum* . . . 2 "*n — Moorei* . . . 2 "*n — nigrescens* . . . 3 "

Acanthacée de premier ordre et de très-grand effet, introduite par l'Établissement, excellente pour appartement, de culture très-facile. Très-grandes feuilles d'un pourpre noirâtre.

*n — roseum* . . . 3 "*n — Roxburghi* . . . 2 "*n — sanguineum* . . . 2 "*n — sanguinolentum* (FLORE, XV, 157). . . 2 "*n — tricolor* . . . 2 "*n — tuberculatum* . . . 2 "*n — variable* . . . 5 "*or Eriocnema marmorata (Bertolonia)*

(FLORE, VII, 291). . . 3 "

*t Erythroxylon Coca.* . . . 3 "

Plante officinale à fleurs blanches, très-recherchée des Indiens pour ses propriétés excitantes et très-employée en médecine.

*n Eugenia littoralis* . . . 3 "*e — Pitanga* . . . 2 à 10 "*n — pseudocaryophylloides* . . . 5 à 10 "

Ses feuilles ont l'odeur des clous de Girofle.

*e Eupatorium Ayapana* . . . 5 "*t Euphorbia jacquiniiflora* . . . 3 "*n — sanguinea* . . . 2 "*or Fagraea imperialis* . . . 10 "*pt Ferdinanda eminens* . . . 2 "

Grand feuillage ornemental, fleurs blanches en ombelle terminale.

*t 1. Ficus amazonica.* . . . 3 "*n 2. — Annei* . . . 2 "*n 3. — barbata* . . . 1 "*n 5. — Cooperi* . . . 2 à 10 "*or 6. — dealbata.* . . . 5 à 10 "*t 7. — eburnea* . . . 2 à 6 "*n 22. — edulis* . . . 5 "*pt 8. — elastica* . . . 2 à 10 "

L'une des plus belles plantes de la serre tempérée, passant l'été en pleine terre, en plein air; feuilles grandes, luisantes, d'un vert sombre; son suc laiteux produit le Caoutchouc.

*t 24. — exsculpta* . . . 10 "

Feuilles d'une physionomie étrange, à nombreux lobes multipartites, découpés comme à l'emporte-pièce, de forme tout à fait anormale, d'un beau vert foncé.

*t 19. — lancifolia* . . . 2 à 5 "*n 11. — macrophylla (Artocarpus imperialis).* . . . 3 à 10 "*n 25. — Moorei* . . . 10 "*n 20. — Parcelli* (FLORE, XXII, 13) 3 à 6 "

Très-grand et superbe feuillage élégamment marqué de blanc et de jaune pâle.

*n 13. — Porteana* . . . 3 à 6 "

## Fr. C.

*t 14. Ficus pseudonymphaefolia* . . . 5 "*n 23. — radicans.* . . . 5 "*n 21. — repens* . . . 1 "*or Fittonia argyroneura* (FL., XVI, 103) 1 "

Superbe espèce à feuilles réticulées de blanc d'ivoire.

*n — gigantea* . . . 1 "*n — Pearcei* . . . 1 "Le plus beau des *Fittonia* veinés de rouge.*n — Verschaffelti (Gymnostachyum)*

(FLORE, XV, 153) . . . 1 "

*e Fourcroya gigantea.* . . . 2 "*n — interrupta* . . . 2 à 5 "*n — Lindenii* . . . 5 à 100 "

Espèce très-rustique à feuilles bordées de jaune, excellente pour figurer dans les collections de plantes panachées pour expositions.

*t Franciscea calycina* . . . 5 "*n — confertiflora foliis variegatis.* . . 3 "*n — eximia* (FLORE, X, 173) . . . 3 "*n — laurifolia* . . . 2 "*n — Lindenii* . . . 3 "*n — rosea perfecta* . . . 5 "Les *Franciscea* sont des plantes rameuses à floraison abondante, très-agréables par la diversité des nuances (blanches, bleues, roses, violettes, etc.) et par la dimension de leurs fleurs.*or Garcinia Mangostana* (FLORE, XXII, 191) . . . 75 à 200 "Le *Mangostan* dont le fruit rouge violacé est un des plus exquis des régions tropicales.*n — Livingstonei.* . . . 5 à 10 "*t Gardenia citridora* (FLORE, XII, 139). . 4 "*n — Devoniana* (FLORE, III, 191) . . . 2 "*f — florida flore pleno* . . . 2 à 4 "*n — major (intermedia).* . . . 2 à 4 "*n — radicans* . . . 2 à 4 "*n — foliis variegatis.* . . . 4 "*or — Stanleyana* (FLORE, II, janv., pl. I) . 5 "Les *Gardenia* ont presque tous des fleurs blanches, grandes, belles et suavement odorantes.*n Geoffroya superba* . . . 10 "*t Graptophyllum medio-auratum* . . . 2 "*n — Nortoni* . . . 3 "*e Greya Sutherlandii* (FLORE, XVII, 45) 3 "

Arbrisseau magnifique dont les feuilles luisantes sont d'un vert pâle maculé de violet.

*or Guaiacum officinale* . . . 15 "Plante officinale, autrement dite *Gaiac*, très-employée en médecine comme sudorifique; feuilles ailées, fleurs bleues en été.*t Guarea coffeæfolia* . . . 5 "*n Guatteria tuberosa* . . . 4 "*n Guilandina Bonducella* . . . 10 "Légumineuse vulgairement nommée *Bonduc*.*or Gustavia Lindenii* . . . 20 "*pt Habrothamnus elegans argenteus* . . 2 "*or Hamadictyon argyreum* . . . 2 "*g, or — maximum (Echites rubro-venia)*

(FLORE, XVII, 29) . . . 2 "

Feuilles admirablement veinées de carmin vif.

*pt Hebeclinium atrorubens* . . . 2 "

Se couronne d'un large corymbe de superbes fleurs bleues.

*n — ianthinum* . . . 1 "



	Fr. C.
<i>pt</i> <i>Hebeclinium ianthinum foliis variegatis</i> . . . . .	5 "
Nouveauté mise au commerce par l'Établissement; fleur rouge à œil blanc, feuilles panachées.	
" — <i>megalophyllum</i> . . . . .	2 "
Se distingue surtout par son admirable feuillage.	
" — <i>pânamense</i> . . . . .	1 "
<i>or</i> <i>Hedysarum gyrans</i> . . . . .	6 "
La plante <i>Télégraphe</i> dont les jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.	
<i>t</i> <i>Hemerocallis picta</i> . . . . .	10 "
" <i>Heptapleurum venulosum</i> . . . . .	5 à 10 "
" <i>Heritiera littoralis</i> . . . . .	5 "
Feuilles ovales, blanchâtres en dessous; fleurs petites, rouges, en panicule axillaire.	
" <i>Herrania palmata</i> . . . . .	10 "
" <i>Hevea brasiliensis</i> . . . . .	15 "
<i>e,g</i> <i>Hexacentris mysorensis</i> (FL., VIII, 1) . . . . .	2 "
Arbrisseau grimpant donnant de magnifiques grappes de fleurs jaunes et rouges, très-ornementales.	
" — — — <i>lutea</i> (FLORE, IX, 217) . . . . .	2 "
<i>t</i> 8. <i>Hibiscus hybridus</i> . . . . .	1 "
" 13. — — — <i>rosa sinensis albo-variegatus</i> . . . . .	3 "
" 26. — — — <i>argenteo-variegatus</i> . . . . .	5 "
Grande fleur d'un jaune chamois, à base cramoisie écarlate.	
" 14. — — — <i>carmineus perfectus</i> . . . . .	2 "
" 25. — — — <i>Colleri</i> . . . . .	4 "
" 11. — — — <i>Cooperi (tricolor)</i> (FLORE, XV, 109) . . . . .	2 "
" 19. — — — <i>cruentus</i> . . . . .	3 "
" 24. — — — <i>Dennisoni</i> . . . . .	4 "
Espèce nouvelle ayant des caractères tout différents de ceux de ses congénères; feuilles épaisses, dans le genre de celles du <i>Lierre</i> ; fleurs grandes, très-belles, d'un blanc crème.	
" 17. — — — <i>flavus plenus</i> . . . . .	3 "
" 21. — — — <i>fulgidus</i> . . . . .	3 "
" 20. — — — <i>hermesinus</i> . . . . .	3 "
" 12. — — — <i>metallicus</i> . . . . .	2 "
" 15. — — — <i>miniatus semi-plenus</i> . . . . .	3 "
" 3. — — — <i>plenus</i> . . . . .	2 "
" 16. — — — <i>vivicans</i> . . . . .	5 "
" 28. — — — <i>zebrinus</i> . . . . .	10 "
" 29. — <i>schizopetalus</i> (FLORE, XXIII, 69) . . . . .	10 "
Espèce très-curieuse et très-ornementale, à fleurs pendantes, dont les pétales, fortement laciniés et frangés, sont d'un rouge orangé vif.	
<i>or</i> <i>Higginsia Ghiesbreghtii (Campylobotrys)</i> . . . . .	3 "
" — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	5 "
" — <i>Ortgiesi</i> . . . . .	5 "
" — <i>refulgens</i> . . . . .	5 "
" — <i>regalis</i> (FLORE, XVI, 101) . . . . .	5 "
Magnifique feuillage vert bouteille nuancé, à revers pourpre; fleurs d'un jaune verdâtre.	
" — <i>Roetzlii</i> . . . . .	5 "
" — <i>smaragdina</i> . . . . .	5 "
<i>t</i> <i>Himantophyllum cyrtanthiflorum</i> . . . . .	3 à 75 "
" — — <i>grandiflorum</i> . . . . .	10 à 25 "
" — — <i>intermedium splendens</i> . . . . .	.6 à 15 "
" — — <i>miniatur</i> (FLORE, IX, 237) . . . . .	.5 à 15 "

	Fr. C.
<i>t</i> <i>Himantophyllum miniatur maximum</i> . . . . .	15 à 50 "
Le magnifique <i>Himantophyllum miniatur</i> , dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes fleurs rouge minium son un ornement presque perpétuel dans nos serres tempérées, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l' <i>Himantophyllum miniatur maximum</i> .	
" — — — <i>Van Houttei</i> . . . . .	50 "
Hybride superbe gagné dans l'Établissement à fleurs amples, d'un rouge minium vif, portées sur des hampes élevées.	
" — — <i>Mad. L. Van Houtte</i> . . . . .	125 à 1000 "
" — — <i>Madem. Marie Van Houtte</i> . . . . .	125 à 1000 "
" — — <i>Madem. Marie Reimers (FLORE, XXIII, 9)</i> . . . . .	100 à 500 "
Ces trois superbes nouveautés font partie d'un ensemble de vingt variétés plus belles les unes que les autres, que nous avons acquises de M. Reimers, d'Hambourg; elles donnent de larges bouquets de fleurs, grandes, bien faites, bien posées, d'un tenné parfaite et des coloris rouges minium les plus éblouissants.	
" <i>Hippobromus alatus</i> . . . . .	3 "
<i>or</i> <i>Hippomane ilicifolia</i> . . . . .	5 à 25 "
Le <i>Mancenillier</i> , dont on a fabuleusement exagéré les propriétés vénéneuses pour ceux qui se reposent sous son ombrage; ce qui est vrai, c'est que le suc laiteux qu'il distille est un poison des plus actifs.	
<i>g,or</i> 1. <i>Hoya angustifolia</i> . . . . .	2 "
" 16. — <i>australis</i> . . . . .	5 "
" 2. — <i>bella</i> (FLORE, IV, 399) . . . . .	2 "
" <i>t</i> 4. — <i>carnosa</i> . . . . .	2 "
" <i>or</i> 7. — <i>fraterna</i> . . . . .	8 "
" 8. — <i>imperialis</i> (FLORE, IV, 393) . . . . .	5 "
" 19. — <i>lutea</i> . . . . .	3 "
" 9. — <i>maxima</i> . . . . .	10 "
" 20. — <i>Paxtoni</i> . . . . .	4 "
" <i>t</i> 12. — <i>picta</i> . . . . .	3 "
" 14. — <i>variegata</i> (FLORE, VIII, 241) . . . . .	2 "
<i>très-fort</i> . . . . .	50 "
Les <i>Hoya</i> sont des plantes charnues, sarmentueuses, volubiles, à jolies fleurs en ombelles, diversement colorées, d'un fort bel effet.	
<i>t</i> <i>Hymenæa Courbaril</i> . . . . .	5 à 10 "
<i>or</i> <i>Hypocyrtia brevicalyx</i> . . . . .	3 à 5 "
" <i>Impatiens Jerdoniæ</i> (FLORE, IX, 133) . . . . .	5 "
<i>pt</i> <i>Ischroma coccineum</i> (FLORE, XII, 151) . . . . .	2 "
" — <i>Tonelianum</i> . . . . .	4 "
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.	
<i>e</i> <i>Ipomœa digitata</i> . . . . .	2 "
" — <i>Horsfalliæ</i> . . . . .	10 "
" <i>g</i> — <i>truncata</i> . . . . .	2 "
Le <i>Ipomœa</i> sont des plantes volubiles, à beau feuillage et à charmantes fleurs ne durant que peu d'heures, mais se succédant pendant longtemps.	
<i>or</i> <i>Isonandra Gutta</i> . . . . .	" "
Produit la <i>Gutta-Percha</i> .	
" <i>Ixora coccinea</i> . . . . .	2 "
" — <i>Colei</i> . . . . .	5 "
" — <i>Dixiana</i> . . . . .	3 "
" — <i>Duchess of Teck</i> . . . . .	6 "
Bouquets de fleurs de 5 pouces de diamètre, d'un rouge saumon ombré d'écarlate, avec reflet violet vers le centre.	
" — <i>hydrangeæformis</i> . . . . .	4 "
" — <i>picturata</i> . . . . .	15 "



	Fr. C.
or <i>Ixora Williamsi</i> . . . . .	20 "
Énorme et superbe bouquet de larges fleurs très-distinctes, d'un rouge saumon.	
t <i>Jacaranda mimosæfolia</i> (FL., III, 185) . . . . .	4 "
" <i>Jambosa densiflora</i> . . . . .	5 "
" — <i>Korthalsi</i> . . . . .	2 "
" — <i>purpurascens</i> . . . . .	15 "
Le <i>Jambosier</i> produit des fruits dont la médecine a tiré parti et qui servent aussi à des usages culinaires.	
" 4. <i>Jasminum Sambac</i> flore pleno . . . . .	4 "
" 5. — — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . . . .	4 "
" 6. — — <i>Grande-Duchesse de Toscane</i> . . . . .	4 "
" <i>Jatropha Manihot</i> . . . . .	3 "
Le <i>Manioc</i> ou la <i>Médéciner</i> dont les racines donnent une farine qui sert dans la pâtisserie et dans les potages où elle prend le nom de <i>Tapioca</i> .	
or <i>Kopsia fruticosa</i> . . . . .	5 "
" <i>Lagetta lintearia</i> . . . . .	6 "
e <i>Lasiandra macrantha</i> . . . . .	2 "
" — — <i>floribunda</i> . . . . .	4 "
t <i>Lasiolipsis Bennetti multijuga</i> . . . . .	3 "
" <i>Ledenbergia roseo-ænea</i> . . . . .	2 "
" <i>Leea sanguinea</i> . . . . .	3 "
" <i>Lindenia rivalis</i> . . . . .	5 "
" <i>Lucuma deliciosa</i> . . . . .	6 "
Arbre ornemental donnant des fleurs vertes, auxquelles succèdent des fruits exquis.	
" — <i>mammosa</i> . . . . .	15 "
" <i>Machærium firmum</i> . . . . .	3 "
D'un port très-distingué; produit une sorte de Palissandre.	
" <i>Mackaya bella</i> . . . . .	2 "
Magnifique <i>Acauthacée</i> dont les abondantes fleurs campanulées sont d'un lilas clair délicat.	
e <i>Magnolia Galeottiana</i> . . . . .	4 "
" — <i>mexicana</i> . . . . .	6 à 15 "
" — <i>pumila</i> . . . . .	4 à 8 "
t <i>Mammea americana</i> . . . . .	10 "
or <i>Mangifera indica</i> . . . . .	20 "
Bel arbre produisant un fruit ornemental, de premier mérite aux Indes.	
t <i>Manihot Glaziova</i> . . . . .	5 "
or <i>Marcgravia paradoxa</i> . . . . .	5 "
Plante grimpante propre à garnir les murs sombres, à fleurs blanches.	
" <i>Medinilla magnifica</i> (FLORE, VI, 125 et IX, 287) . . . . .	5 à 10 "
Beau feuillage gaufré; fleurs roses, en grappes très-fourmies, très-gracieuses.	
t <i>Melicocca bijuga</i> . . . . .	4 "
" <i>Memecylon ramiflorum</i> . . . . .	3 à 6 "
e <i>Meninia turgida</i> . . . . .	2 "
t <i>Mezonia erecta</i> (FLORE, XI, 35) . . . . .	2 "
" <i>Miconia peruviana</i> . . . . .	2 "
g, or <i>Mikania speciosa</i> . . . . .	2 "
p, e — <i>violacea</i> . . . . .	2 "
e <i>Monochætum ensiferum</i> . . . . .	2 "
" — <i>sericeum multiflorum</i> . . . . .	2 "
or <i>Monodora Myristica grandiflora</i> . . . . .	5 à 10 "
Le <i>Muscadier</i> de Guinée.	
t <i>Morinda Rojoc</i> . . . . .	6 "
or <i>Myristica moschata</i> . . . . .	" "
Le <i>Muscadier</i> des Moluques, à beau feuillage et à jolies fleurs jaunes.	

	Fr. C.
or <i>Myroxylon balsamiferum</i> . . . . .	10 "
Produit le <i>Baume du Pérou</i> .	
e <i>Myrtus Pimenta</i> . . . . .	4 à 6 "
Son fruit ou coque est excitant et aromatique; on s'en sert dans l'art culinaire et dans la parfumerie.	
or <i>Napoleona Whitfieldii</i> (FL., IV, 386) . . . . .	2 "
Charmante fleur de couleur abricot et pourpre, prenant une teinte bleuâtre par la dessiccation.	
" 25. <i>Nepenthes albo-marginata</i> (FLORE, XXII, 165) . . . . .	200 "
" 20. — <i>ampullaria</i> (FLORE, XXII, 165) . . . . .	20 à 50 "
" 13. — — <i>picta</i> . . . . .	20 à 75 "
" 32. — <i>bicalcarata</i> . . . . .	75 "
" 21. — <i>Chelsoni</i> . . . . .	40 à 200 "
" 3. — <i>gracilis major</i> . . . . .	15 à 30 "
" 18. — <i>Hookeriana</i> . . . . .	50 à 75 "
" 4. — <i>hybrida</i> . . . . .	20 "
" 5. — — <i>Dominiana</i> . . . . .	25 à 75 "
" 6. — — <i>maculata</i> . . . . .	20 à 50 "
" 22. — <i>intermedia</i> . . . . .	40 à 75 "
" 7. — <i>lævis</i> . . . . .	10 à 50 "
" 8. — <i>lanata, très-rare</i> . . . . .	300 "
" 28. — <i>Outramiana</i> . . . . .	150 à 200 "
" 9. — <i>phyllamphora</i> . . . . .	10 à 40 "
" 10. — <i>Rafflesiana</i> (FLORE, XVI, 167) . . . . .	40 "
" 29. — <i>sanguinea</i> (FLORE, XXII, 165) . . . . .	" "
" 17. — <i>Sedeni</i> . . . . .	15 à 30 "
L'une des espèces les plus remarquables du genre, très-distincte, à tige robuste, obtusément trigone, glabre, légèrement velue à l'extrémité; feuilles sessiles, épaisses, lancéolées, légèrement pubescentes en dessous; urnes ( <i>Ascidies</i> ) oblongues, ovales, ventruës, atteignant jusqu'à 8 pouces de longueur, velues, à côtes ailées et dentelées; cirrhes soyeuses à poils blancs ou ferrugineux.	
" 23. — <i>vittata</i> . . . . .	25 à 50 "
" 24. — <i>major</i> . . . . .	30 à 50 "
La vogue est aujourd'hui pleinement acquise à ces charmantes plantes à urnes ( <i>Ascidies</i> ) surmontées d'un couvercle, qui sont diversifiées de grandeur et de coloris dans les espèces ci-dessus énumérées et qui produisent un si joli effet, mêlées avec d'autres plantes de même tempérament.	
or <i>Oldfieldia africana</i> . . . . .	8 "
" <i>Oleobachia palustris</i> . . . . .	35 "
Plante élégante dont les feuilles digitées, à 5-7 divisions, sont vertes avec la veine médiane plus pâle.	
e <i>Oplismenus imbecillis foliis variegatis</i> (FLORE, XVII, 5) . . . . .	1 "
" <i>Otacanthus cæruleus</i> (FLORE, XV, 53) . . . . .	2 "
" <i>Ouvirandra fenestrata</i> . . . . .	15 "
Plante aquatique à dentelles, de Madagascar, très-curieuse.	
t <i>Pachira alba</i> ( <i>Carolinea</i> ) . . . . .	3 à 10 "
e <i>Pachyphytum bracteosum</i> . . . . .	2 "
t <i>Palicourea discolor</i> . . . . .	2 "
" <i>Panicum maximum variegatum</i> . . . . .	1 "
or <i>Paullinia oceanica</i> . . . . .	6 "
" — <i>thalictrifolia</i> (FLORE, XIX, 10) . . . . .	4 "
" — — <i>argentea</i> . . . . .	5 à 15 "
Plante grimpante à feuilles argentées, ressemblant à celles d'un <i>Adiantum</i> .	
or <i>Pavetta borbonica</i> . . . . .	10 "
Feuillage ornemental d'un vert foncé tacheté de vert pâle.	
" — — <i>maxima</i> . . . . .	20 "
" — — <i>picta</i> . . . . .	25 "



	Fr. C.
<i>e Pavetta indica</i> . . . . .	2 "
Fleurs en panicule, jaunâtres, odorantes.	
<i>Pavonia Makoyana</i> . . . . .	15 "
Nouveauté hors ligne fleurissant une bonne partie de l'année, très-recommandable.	
<i>t — Wioti</i> . . . . .	3 "
Curieuse Malvacée brésilienne se couvrant de charmantes fleurs pourpres, de très-longue durée.	
<i>n 9. Peperomia argentea</i> . . . . .	2 "
<i>n 2. — argyrea</i> . . . . .	2 "
<i>n 1. — arifolia</i> . . . . .	2 "
<i>n 10. — peltata</i> . . . . .	2 "
<i>n 16. — prostrata</i> . . . . .	.5 à 10 "
Charmante espèce propre pour corbeille, pendante, se garnissant de nombreuses petites feuilles orbiculaires, panachées de brun et de vert pâle.	
<i>n 6. — resediflora</i> . . . . .	2 "
<i>n 7. — velutina</i> . . . . .	2 "
<i>n 8. — Verschaffelti</i> . . . . .	2 "
<i>n Persea gratissima</i> . . . . .	4 "
L'Avocatier, très-estimé pour son fruit; grandes feuilles coriaces, fleurs blanchâtres.	
<i>n Petrea volubilis</i> . . . . .	2 à 5 "
Arbrisseau grimpant à fleurs bleuâtres.	
<i>or Pharus vittatus (FLORE, IV, 316)</i> . . . . .	10 "
Feuilles très-élégantes, striées de blanc sur fond vert pourpre.	
<i>n Phyllagathis rotundifolia</i> . . . . .	.2 à 10 "
<i>t Pilea callitrichoides</i> . . . . .	2 "
Pendant les mois de juin et juillet, à l'aide de cette plante, on peut produire un feu d'artifice en miniature. Pour cela, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir; on en trempe le sommet dans de l'eau et on l'en retire immédiatement en le secouant assez fort pour le débarrasser du liquide qui le couvre. Au bout d'une minute, le fillet de chaque étamine projettera son pollen, destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie.	
<i>n — microphylla</i> . . . . .	2 "
<i>n Pilocarpus pinnatifidus</i> . . . . .	10 "
<i>e Pinckneya pubens (FLORE, XIX, 13)</i> . . . . .	5 "
Cinchonacée à fleurs blanches mouchetées de rose; l'une des divisions du calice représente une expansion foliacée très-curieuse, de couleur blanc crème bordé de rose.	
<i>or 10. Piper Cubeba</i> . . . . .	3 "
Produit le poivre de Cubèbe, très-usité en médecine.	
<i>n 11. — excelsum</i> . . . . .	2 "
<i>n 15. — aureo-pictum</i> . . . . .	5 "
<i>e 14. — Futokadsura</i> . . . . .	2 "
Poirier du Japon.	
<i>t 12. — incanum</i> . . . . .	1 "
<i>or 13. — nigrum</i> . . . . .	4 "
Produit le poivre commun, condiment ordinaire de tous nos mets.	
<i>n Pisonia longirostris</i> . . . . .	.4 à 10 "
<i>ag Pistia Stratiotes</i> . . . . .	2 "
Plante aquatique flottante de serre chaude, qu'on peut tenir dans un bassin, en plein air, l'été.	
<i>t Plectranthus atropurpureus albo-variegatus</i> . . . . .	3 "
<i>pt — fruticosus</i> . . . . .	2 "
Genre de Coleus à feuillage charnu, à senteur de citron.	
<i>e Pleroma macranthum (Lasiandra)</i> . . . . .	2 "
<i>n — — floribundum</i> . . . . .	4 "
<i>n Plumbago coccinea var. rosea</i> . . . . .	2 "

	Fr. C.
<i>e Pogostemon Patchouli</i> . . . . .	2 "
Plante bien connue pour son parfum aromatique; feuillage velu, fleurs blanchâtres.	
<i>t Poinsettia pulcherrima</i> . . . . .	3 à 6 "
Excellente Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant.	
<i>n — — plenissima</i> . . . . .	5 "
<i>n — — roseo-carminata</i> . . . . .	5 "
<i>pt Polymnia grandis</i> . . . . .	2 "
<i>ag Pontederia crassipes</i> . . . . .	2 "
On peut tenir cette plante dans une terrine pleine d'eau; elle a de très-curieux pétioles renflés qui servent à la maintenir sur le liquide, et de belles fleurs bleues.	
<i>t Porphyrocoma lanceolata</i> . . . . .	2 "
Épi de belles fleurs rouges.	
<i>n Psychotria cyanococca (Fl., XIX, 15)</i> . . . . .	3 "
Produit des grappes de baies du plus beau bleu d'outre-mer.	
<i>n — — expansa</i> . . . . .	2 "
<i>n Pteridophyllum zeylanicum</i> . . . . .	.5 à 25 "
Feuilles composées à nervure ailée.	
<i>or Quassia amara</i> . . . . .	15 "
Plante officinale à feuilles ailées, à fleurs d'un beau rouge vif, en grappe terminale.	
<i>n Quivisia heterophylla</i> . . . . .	10 "
<i>n Reidia glaucescens</i> . . . . .	2 "
<i>e Rhopala corcovadensis</i> . . . . .	.5 à 15 "
<i>n — — elegans</i> . . . . .	.5 à 15 "
<i>n — — Jonghi</i> . . . . .	.35 "
Les <i>Rhopala</i> , par leur feuillage décoratif, sont un des plus beaux ornements des serres.	
<i>t,g Rhynchosia albo-nitens</i> . . . . .	2 "
<i>e Rogiera cordata (FLORE, VIII, 13)</i> . . . . .	2 "
<i>n — — superba</i> . . . . .	4 "
Jolis corymbes de fleurs roses.	
<i>t Rondeletia speciosa brilliantissima (sic)</i> . . . . .	3 "
<i>e Rubus maculatus</i> . . . . .	2 "
<i>n — — rosae-folius flore simplici (FLORE, XVII, 3)</i> . . . . .	3 "
Framboisier des Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, des fruits comestibles de forme charmante.	
<i>t Rudgea macrocephala (Fl., XVII, 17)</i> . . . . .	10 "
Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; panicules de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger et excellentes pour bouquets.	
<i>t Ruellia Devosiana</i> . . . . .	2 "
<i>e — — macrantha</i> . . . . .	3 "
Plante brésilienne de serre tempérée, à très-grandes fleurs comme celles des <i>Gloxinia</i> , d'un beau carmin violacé; on peut la mettre l'été en pot ou en pleine terre, à l'air libre, où elle forme de jolis buissons.	
<i>n — — maculata</i> . . . . .	2 "
<i>n Salvadoria persica</i> . . . . .	3 "
<i>n Sanchezia nobilis</i> . . . . .	2 à 5 "
Feuilles longues de 25 à 30 centimètres, larges de 10 à 15, à nervures pennées, vertes ou richement colorées de blanc jaunâtre ou de jaune vif; fleurs jaunes en panicule terminale, garnies de larges bractées d'un rouge brique.	
<i>n — — glaucophylla</i> . . . . .	2 à 5 "
<i>n Sansevieria angolensis (cylindrica)</i> . . . . .	10 "
Ses longues feuilles tétritéiformes sont des plus bizarres, et d'une grande souplesse unie à une solidité à toute épreuve.	
<i>n — — ruficincta</i> . . . . .	2 "
<i>t Sapindus Saponaria</i> . . . . .	10 "
L'Arbre à savon; fleurs blanches.	



	Fr. C.		Fr. C.
<i>t</i> <i>Sapota Achras</i> . . . . .	10 "	<i>pt</i> <i>Tetrapanax papyrifera (Aralia)</i> (FLORE, VIII, 153) . . .	1 à 4 "
Le <i>Sapotillier</i> dont les fruits sont comestibles.		Arbuste dont les tiges renferment dans leur intérieur une moelle abondante, dont les Chinois fabriquent un papier très-renommé pour les gravures.	
" <i>Sarcocephalus cordatus</i> . . . . .	10 "	<i>or</i> <i>Theobroma Cacao</i> . . . . .	10 à 50 "
<i>e</i> <i>Scutellaria Mociniana</i> . . . . .	2 "	Ses graines forment la base du <i>Chocolat</i> .	
" — <i>pulchella purpurea</i> . . . . .	2 "	<i>t</i> 1. <i>Theophrasta attenuata</i> , très-forts	5 à 25 "
<i>or</i> <i>Sideroxylon Mastichodendron</i> . . . . .	10 "	" 3. — <i>glauca</i> . . . . .	10 "
<i>t</i> <i>Simaruba excelsa</i> . . . . .	6 "	" 4. — <i>imperialis</i> , très-forts . . .	10 à 300 "
Plante officinale à feuillage ornemental.		Ses feuilles atteignent des proportions considérables, un mètre de longueur sur 20 à 25 centimètres de largeur.	
<i>or</i> <i>Simonsia chrysophylla</i> . . . . .	8 "	" 5. — <i>Jussieui</i> . . . . .	15 "
<i>e</i> <i>Sinclairia discolor</i> . . . . .	2 "	Espèce remarquable par ses longues feuilles qui atteignent 45 à 50 centimètres de longueur sur 8 à 10 centimètres de largeur.	
" <i>Solanum Warszewiczii</i> . . . . .	3 "	" 6. — — <i>latifolia</i> . . . . .	10 "
<i>or</i> <i>Sonerila hybrida Alfred Mame</i> . . . . .	3 "	" 7. — <i>latifolia</i> . . . . .	10 "
" — — <i>Baronne de Marches</i> . . . . .	3 "	" 8. — <i>latifolia</i> . . . . .	5 à 10 "
" — — <i>Hendersonii</i> . . . . .	2 "	" 9. — <i>macrophylla</i> , vrai . . . . .	800 "
" — — <i>argentea</i> . . . . .	2 "	Espèce tout à fait supérieure par son grand et beau feuillage.	
" — — <i>marmorata</i> . . . . .	2 "	" 10. — <i>minor</i> . . . . .	5 à 10 "
" — — <i>Mad. Ed. André</i> . . . . .	3 "	<i>t, g</i> <i>Thunbergia chrysops</i> . . . . .	2 "
" — — <i>Mad. Ed. Ollet</i> . . . . .	3 "	" — <i>coccinea</i> . . . . .	2 "
" — — <i>Mad. Victor Alesch</i> . . . . .	3 "	Plante grimpante à beau feuillage, à fleurs d'un rouge orangé, très-odorantes, pendant en longues grappes.	
<i>or</i> — <i>margaritacea</i> (FLORE, XI, 105) . . . . .	2 "	" — <i>fragrans</i> . . . . .	2 "
Charmante petite plante à feuilles d'un vert satiné, parsemé de petites taches argentées, à fleurs en cymes terminales, d'un rose carminé, simulant de petites perles.		" — <i>Harvisii</i> (FLORE, XII, 177) . . . . .	2 "
Tous les <i>Sonerila</i> sont de mignonnes plantes à feuilles diversement pointillées, du plus gracieux effet, à fleurs charmantes, blanches ou roses.		Grandes et magnifiques fleurs bleu de ciel, à gorge jaune d'or.	
<i>t</i> <i>Sophora tetraptera</i> . . . . .	2 "	" — <i>lutea</i> . . . . .	2 "
" <i>Spathodea gigantea</i> . . . . .	10 "	" — <i>natalensis</i> . . . . .	2 "
<i>or</i> <i>Sphærogyne cinnamomea</i> . . . . .	3 à 25 "	Jolies fleurs longuement pédicellées, d'un beau rouge, disposées en panicule terminale qui atteint parfois 30 centimètres de longueur.	
" — <i>imperialis</i> . . . . .	10 à 100 "	<i>e</i> <i>Thysacanthus rutilans</i> . . . . .	2 "
" — <i>latifolia</i> . . . . .	10 à 100 "	<i>t</i> <i>Torenia asiatica</i> (FLORE, II, 157) . . . . .	1 "
Tige revêtue de poils d'un brun ferrugineux; noble feuillage velouté à revers rouge.		Grandes fleurs d'un pourpre lilacé, marquées de trois larges macules d'un pourpre foncé velouté.	
<i>e</i> <i>Spigelia splendens</i> (FLORE, XVII, 121) . . . . .	3 "	" — — <i>pulcherrima</i> (FLORE, XIII, 95) . . . . .	1 "
Brillante espèce à délicieuses fleurs coccinées.		Variété plus belle que le type; fleurs d'un magnifique bleu violacé, à lobes latéraux presque noirs, l'inférieur blanc.	
<i>or</i> <i>Spondias cytherea</i> . . . . .	15 "	" — <i>Bailloni</i> . . . . .	1 "
Arbre à fruit des tropiques.		Nouvelle espèce à fleurs jaunes.	
<i>e</i> <i>Stadmannia australis</i> . . . . .	5 à 15 "	" — <i>Fournieri</i> . . . . .	1 "
<i>Bois de fer</i> de la Nouvelle-Hollande. Fleurs blanchâtres auxqueltes succèdent des fruits rouges orangés renfermés dans une enveloppe jaune citron, d'un très-bel effet et d'un goût très-acidulé, mais agréable.		Dans le genre de l' <i>asiatica pulcherrima</i> , mais plus florifère. Les <i>Torenia</i> sont des plantes sarmenteuses, excellentes pour garnir les corbeilles.	
" — <i>sorbifolia</i> . . . . .	15 à 25 "	" <i>Toxicophlæa spectabilis</i> . . . . .	4 à 10 "
Feuillage très-ornemental.		" — <i>Thunbergii</i> . . . . .	3 "
<i>t</i> <i>Stannia formosa (Posoqueira)</i> (FLORE, VI, 169) . . . . .	5 "	" <i>Tradescantia discolor</i> . . . . .	2 "
Nombreuses fleurs longuement tubulées, de 10 à 12 centimètres, disposées par 8-11 en corymbes terminaux.		" — — <i>foliis variegatis</i> (FL., XI, 193) . . . . .	2 "
<i>gr, t</i> <i>Stephanotis floribunda</i> . . . . .	2 "	" — <i>multicolor Mad. Leguesme</i> . . . . .	2 "
Décore nos serres chaudes de ses guirlandes de feuilles épaisses, ornementales, qui recouvrent des bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, répandant un délicieux arôme.		Variété issue du <i>Tradescantia zebrina</i> , dont elle a le port, la vigueur et la rusticité; ses feuilles sont en partie zébrées, en partie striées de rose, de violet, de lilas et de blanc; ces divers coloris, le plus souvent parfaitement tranchés, sont parfois faiblement fondus l'un dans l'autre, de façon à former un ensemble harmonieux qui charme le regard. Les branches elles-mêmes sont parfois colorées.	
<i>t</i> <i>Swietenia chloroxylon</i> . . . . .	2 "	<i>t</i> — <i>zebrina argentea</i> . . . . .	1 "
<i>or</i> — <i>Mahagoni</i> . . . . .	10 "	<i>pt</i> <i>Udhea bipinnata</i> . . . . .	2 "
Cette espèce fournit l' <i>Acajou</i> vrai.		Plante vigoureuse à grandes feuilles laciniées, bonne pour la pleine terre en été.	
<i>e</i> <i>Syphocampylus Humboldtianus</i> . . . . .	2 "	<i>t</i> <i>Uroskinnera spectabilis</i> (FL., XVI, 109) . . . . .	3 "
<i>l</i> <i>Tabernaemontana Camassa</i> . . . . .	4 "	" <i>Urvillea ferruginea</i> . . . . .	5 "
Belles fleurs blanches, odorantes.			
<i>or</i> <i>Tamarindus indica</i> . . . . .	5 "		
Le <i>Tamarin</i> , employé en médecine; feuilles pennées, fleurs jaunes.			
<i>pt</i> <i>Teleianthera versicolor</i> . . . . .	50 "		
<i>or</i> <i>Terminalia nobilis</i> . . . . .	10 "		



Fr. C.  
 † *Vangueria edulis* . . . . . 15 "  
 Rubiacée de Madagascar, à fleurs blanches, axillaires;  
 fruits comestibles dans son pays.

or *Vanilla aromatica* . . . . . 10 "  
 Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faite de nos serres  
 chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde arti-  
 ficiellement les fleurs.

ag *Victoria regia* (FL., III, mars, pl.VII) 25 "  
 La *Reine des eaux*, dont les feuilles énormes atteignent  
 2 mètres de diamètre, et les fleurs de 30 à 35 centimètres de  
 diamètre; pétales extérieurs blanchâtres, se colorant en  
 rouge carmin en se rapprochant du centre. Les plantes que  
 nous offrons sont solides et seront disponibles à la fin de mai.

Fr. C.  
 pt *Wigandia caracasana latifolia* . . . 2 "  
 " — *floribunda* . . . . . 2 "  
 " — *urens* . . . . . 2 "

Le feuillage des *Wigandia* est très-ornemental et prend un  
 beau développement quand on met ces plantes en pleine  
 terre, dehors, vers la fin de mai; fleurs en entounoir.

or *Xanthosoma Lindenii* (*Phyllotanium*)  
 5 à 200 "

Imposante Aroïdée très-ornementale, d'un port compacte,  
 à feuilles grandes, oblongues-sagittées, d'un vert brillant  
 entièrement veiné de blanc argenté.

## SPECIALITÉS

## DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

### AMARYLLIDÉES.

Fr. C.  
 3725. † *Amaryllis equestris* flore pleno  
 (*Hippeastrum*) . . . . . 10 "  
 2533. † — *fulgida* flore pleno (*Hippea-*  
*strum*) (FLORE, XV, 89). . . 10 "

Ses fleurs sont doubles et d'un beau rouge saumoné.

3314. † — *Josephinae* (*Brunswigia*) . . 20 "  
 2564. † — *pardina* (FLORE, XXII, 25-27)  
 5 à 15 "

— — *variétés de semis, obtenues*  
*dans l'Établissement.* 3 à 100 "

3322. † — *procera* . . . . . 25 "  
 3421. † — *Reginae* . . . . . 5 "  
 2565. † — *reticulata* (FLORE, V, 450) . 10 "  
 2971. † — — *hybrida* . . . . . 5 à 15 "  
 3367. † — — *Pirloti*. . . . . 10 à 25 "  
 3736. † — *robusta* . . . . . 5 "  
 3422. † — *vittata* Harrisoni . . . . . 6 "  
 — — *en variétés.* . . . . . 3 à 100 "

† *Amaryllis* en magnifiques variétés, de 25 à  
 100 francs la douzaine, en oignons de force à  
 fleurir. — Voir le Catalogue de Bulbes n° 188,  
 page 209, où l'on trouvera l'énumération et le  
 prix des diverses collections, avec des détails  
 très-circonstanciés sur la culture de ces plantes.

3320. † *Brunswigia orientalis* . . . . . 10 "  
 3505. † *Buphonia ciliaris* . . . . . 10 "  
 3508. † — *toxicaria major* . . . . . 12 "  
 3507. † — — *minor* . . . . . 12 "  
 3554. † *Coburgia flava*. . . . . 3 "  
 3555. † — *incarnata* . . . . . 2 "  
 les douze. . . . . 20 "

1794. † *Crinum amabile*, très-forts 10 à 30 "  
 3595. † — *americanum* . . . . . 8 "  
 2975. † — *asiaticum* . . . . . 10 à 20 "  
 3596. † — *brachynema* (FL., XXII, 63) 5 à 15 "

Fleurs blanches répandant une odeur suave.

3601. † — *crassifolium* . . . . . 5 à 15 "  
 3741. † — *cærulescens*, fort. . . . . 25 "

Fr. C.  
 3585. † *Crinum Makoyanum* . . . . . 25 "  
 3608. † — *scabrum* (FLORE, XXI, 113) 8 "  
 3670. † *Cyrtanthus obliquus*. . . . . 5 "  
 2557. † *Doryanthes Palmeri* (FLORE,  
 XVIII, 147) . . . . . 5 à 10 "

2558. † *Eucharis amazonica* . . . . . 3 à 5 "  
 Charmantes fleurs blanches, suavement odorantes.

3298. † — *candida* . . . . . 2 "  
 3503. † — *grandiflora* . . . . . 4 "  
 3297. † — *pumila*. . . . . 3 "

3724. † *Euryclis australasica* . . . . . 20 "  
 Fleurs d'un blanc pur, en ombelle, d'un aspect ravissant.

1827. † — *Cunninghami* . . . . . 3 "  
 1839. † *Griffinia hyacinthina*. . . . . 8 "  
 3812. † *Hæmanthus coccineus* . . . . . 2 50  
 3726. † — *Kalbreyeri* (FLORE, XXIII,  
 17). . . . . 5 à 10 "

Scape solide et tacheté de rouge clair; splendide ombelle  
 d'environ 12 centimètres de diamètre, portant plus de cent  
 fleurs d'un vermillon éclatant.

3817. † — *natalensis*. . . . . 6 "  
 3819. † — *pubescens*. . . . . 2 "  
 3820. † — *punicus*. . . . . 3 "

Fleurs d'un rouge sang.

3823. † — *tigrinus* . . . . . 2 50  
 1848. † — *virescens intermedius* . . . 2 50

2559. *Himantophyllum cyrtanthiflorum*  
 (FLORE, XVIII, 87) . . . . . 3 à 75 "

Fleurs en corymbe d'un rouge minium clair, pendantes,  
 d'un charmant effet.

3702. — — *grandiflorum*. . . . . 10 à 25 "  
 2974. — — *intermedium splendens* . 6 à 15 "  
 2560. — — *miniaturum* (FLORE, IX, 237) 5 à 15 "  
 très-forts . 30 à 100 "

3716. — — *Mad. L. Van Houtte*  
 (L. Van Houtte) . 125 à 1000 "

3704. — — *Madem. Marie Van*  
*Houtte* ( ) . 125 à 1000 "



Fr. C.

3707. *Himantophyllum miniatum* *Madem.**Marie Reimers* (L. Van Houtte)

(FLORE, XXIII, 9) . . . 100 à 500 "

Ces trois nouveautés, dont les bouquets, les fleurs et les coloris sont tout à fait hors ligne, sont vraiment magnifiques. La variété *Madem. Marie Reimers*, qui a été décrite et figurée dans la FLORE, donne une faible idée de la splendeur de ces plantes.

2561. — — maximum . . . 15 à 50 "

Le bel *Himantophyllum miniatum*, dont le feuillage et les larges bouquets de grandes fleurs érigées, rouge minium, sont un ornement presque perpétuel dans les serres tempérées, trouve ici son maître; toutes ces qualités, mais amplifiées, sont le partage de l'*Himantophyllum miniatum maximum*.

3703. — — — Van Houttei. . . . 50 "

Variété superbe gagnée dans l'Établissement, à fleurs grandes, bien faites, d'un rouge minium vif, à centre orange, portées sur des hampes élevées.

Tous les *Himantophyllum* sont inappréciables comme plantes décoratives; ils fleurissent presque constamment. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis d'un rouge minium, diversement intense dans les différentes sortes.

Fr. C.

1850. *Hymenocallis adnata* princeps

(FLORE, XXII, 15) . . . 5 "

3187. — caribæa . . . . . 4 "

3470. — mexicana . . . . . 5 "

3850. *Ismene Amancaes* . . . . . 10 "

Très-grandes fleurs jaunes, dont les jeunes Péruviennes se parent à la fête de la Saint-Jean.

3853. — viridiflora . . . . . 10 "

3737. *Pancratium amcenum* . . . . . 10 "

3738. — rotatum . . . . . 10 "

3324. *Vallota purpurea* (*Amaryllis*) . . . 2 50

3325. — — major (n) . . . . . 5 "

## AROIDÉES.

Fr. C.

190. *Alocasia alba* . . . . . 2 "267. — *Gibsoni* . . . . . 3 "266. — *gigantea* . . . . . 5 à 10 "185. — *intermedia* . . . . . 15 "186. — *Jenningsi* . . . . . 2 "52. — *Lowi* (FLORE, XXI, 89) . . . 8 à 25 "45. — *macrorrhiza foliis variegatis* 4 à 25 "382. — *Marshalli* . . . . . 2 "37. — *metallica* (FLORE, XXI, 97). 6 à 25 "

Feuilles colossales en forme de larges boucliers, de plus d'un pied d'envergure, très-épaisses, très-ornementales, se maintenant verticalement, d'un vert foncé recouvert d'un vernis bronzé du plus brillant effet.

20. — *plumbea* (FLORE, XXI, 83) 5 à 10 "319. — *Sedeni* . . . . . 5 à 100 "489. — *Thibautiana* . . . . . 50 "268. — *tigrina superba* . . . . . 10 "53. — *Veitchi, vrai* . . . . . 20 "66. — *zebrina* (FLORE, XV, 81) 6 à 150 "72. *Amorphophallus campanulatus*. . . 5 "73. — *Konjak* . . . . . 10 "121. — *nivosus* . . . . . 3 "265. — *Rivieri* (FLORE, XIX, 43) . . 1 à 5 "

Superbe Aroïdée à *facies* de Palmier. Tubercules devenant très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure environ quatre pieds de longueur, dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les baricures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers; elle est précieuse pour décor de massifs.

488. *Anthurium Andreanum* . . . 25 à 50 "

Splendide Aroïdée, la plus belle peut-être du genre, à grande spathe fortement veinée, du vermillon cramoisi le plus vif, et à spadice jaune à bout blanc.

296. — *acaule* . . . . . 6 "191. — *Augustinum* . . . . . 5 à 10 "192. — *bellum* . . . . . 10 "492. — *consanguineum* . . . . . 10 "

Fr. C.

383. *Anthurium crystallinum* . . . 6 à 75 "

Énormes feuilles d'un vert foncé, fortement veinées de blanc pailleté, d'un grand effet ornemental.

456. — *Dechardi* . . . . . 5 à 30 "

Charmante Aroïdée nouvelle, excellente pour décoration d'appartement, formant de superbes touffes régulières d'un vert intense, sur lequel se détachent ses grandes fleurs blanches, légèrement parfumées.

197. — *fissum* . . . . . 10 "409. — *floribundum* . . . . . 5 à 10 "198. — *Galeottianum*. . . . . 5 "491. — *glaucescens* . . . . . 5 "351. — *hybridum* . . . . . 15 "456. — *Laucheanum* . . . . . 10 à 75 "200. — *leuconeum, forts* . . . 10 à 25 "201. — *Lindigi* . . . . . 10 "202. — *magnificum* . . . . . 5 à 75 "203. — *mauritanum* . . . . . 10 "204. — *Maximilianum* . . . . . 10 "473. — *ornatum* . . . . . 40 à 75 "

Magnifique espèce, remarquable par ses fleurs et par son feuillage. Les exemplaires d'une bonne venue ont les pétioles d'environ 3 pieds de longueur. La feuille est d'un vert clair légèrement veiné de blanc, en forme de cœur et a de 10 à 12 pouces de largeur; les fleurs, tenues sur de vigoureux pédoncules, s'élevant bien au-dessus du feuillage; la spathe, d'un blanc pur, a de 4 à 8 pouces de longueur sur 3 pouces de largeur, et se termine en pointe vers le sommet; le spadice, de 15 pouces de longueur, est droit, bien apparent, noirâtre ombré de violet et légèrement pointillé de blanc.

301. — *peltatum radiatum* . . . 25 à 50 "210. — *radicans* . . . . . 3 "464. — *reflexum* . . . . . 5 "211. — *regale* . . . . . 3 à 50 "

Feuilles très-longues, de 2 pieds environ, d'un rouge sang à l'état jeune, puis brun marron, puis jaune olive, et enfin vert émeraude.

213. — *Scherzerianum* (FLORE, XVII, 129)

3 à 200 "

Espèce très-florifère et très-ornementale, à fleurs d'un vermillon rutilant, de très-grand effet.

474. — — *grandiflorum* . . . 10 à 100 "



Fr. C.

463. *Anthurium Veitchi*, très-forts, 150 à 300 "  
Nouveauté de tout premier ordre, de grand effet, à feuilles excessivement allongées, atteignant 2 à 3 pieds de longueur sur un pied de largeur, retombantes, très-coriaces, d'un vert foncé reflété d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément creusées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence ondulée.

490. — *violaceum* . . . . . 3 "

462. — *Warocqueanum* . . . . . 25 "  
très-forts. 150 à 300 "

Nouveauté de tout premier ordre, la plus belle des Aroïdées, dont les feuilles atteignent 3 pieds de longueur sur plus d'un pied de largeur, d'un très-riche vert velouté, contrastant avec les nervures médianes et secondaires qui sont d'un vert plus pâle.

75. *Ariopsis peltata* . . . . . 2 "

324. *Arisæma præcox* . . . . . 5 "

76. — *ringens* (FLORE, XII, 167). . . . . 5 "

3875. — *serotinum* . . . . . 2 "

3362. — *Sieboldi* . . . . . 5 "

*Caladium* : voir le Catalogue n° 191,  
page 74, où ils sont énumérés et  
côtés par pièce et par collections.

416. *Colocasia argyroneura* . . . . . 3 "

136. — *batavensis* . . . . . 2 "

14. — *esculenta* . . . . . 2 "

493. — *odora* . . . . . 5 à 25 "

78. *Conophallus bulbifer* . . . . . 2 "

392. *Curmeria picturata* . . . . . 5 à 200 "

417. — *Roezlii* . . . . . 10 à 20 "

447. — *Wallisi* . . . . . 25 à 50 "

Très-jolie Aroïdée à feuilles ornementales, moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées.

355. *Dieffenbachia amazonica* . . . . . 3 à 15 "

482. — *amœna* . . . . . 25 "

Feuilles oblongues-aiguës, d'un vert foncé maculé d'abondantes taches allongées, blanches et jaune pâle, très-apparentes sur les deux faces.

280. — *Baraquiniana* . . . . . 2 à 100 "

292. — *Bausei* . . . . . 5 à 125 "

326. — *Bowmani* . . . . . 2 à 200 "

418. — *brasiliensis* . . . . . 5 à 25 "

Superbe Aroïdée à feuillage ornemental, produisant un grand effet par sa riche panachure irrégulière d'un blanc verdâtre sur fond vert très-foncé.

483. — *Carderi* . . . . . 25 "

Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert foncé, admirablement et régulièrement maculé et panaché.

445. — *Chelsoni* . . . . . 5 à 50 "

Cette variété diffère des autres sortes à feuilles panachées par sa feuille d'un vert foncé, qui est garnie d'une bande plumeuse grise le long de la nervure médiane et ornée de macules d'un jaune vif sur le reste du limbe.

485. — *delecta* . . . . . 25 "

Feuilles elliptiques-lancéolées, de 8 à 10 pouces de longueur, d'un vert satiné tacheté de blanc.

290. — *eburnea* . . . . . 3 à 10 "

220. — *gigantea* . . . . . 4 "

421. — *illustriis* . . . . . 6 à 25 "

Espèce d'un port élégant et de croissance facile, dont les feuilles sont couvertes de macules jaunes entremêlées d'un pointillé blanc argenté, d'un bel effet.

407. — *imperialis*, très-forts 10 à 100 "

Fr. C.

458. *Dieffenbachia imperialis nobilis* 15 à 200 "

385. — *latimaculata* . . . . . 5 à 25 "

486. — *Leopoldi* . . . . . 25 "

Aroïdée d'une grande beauté. Feuilles oblongues-ovées, d'un riche vert luisant, traversées par une large et forte côte d'un blanc d'ivoire, bordée, dans toute sa longueur, par une bande blanche, et produisant un brillant contraste avec le fond vert foncé.

446. — *marmorata* . . . . . 25 à 100 "

Belle espèce à grandes et épaisses feuilles ovales, de 12 à 15 pouces de longueur sur 5 pouces de largeur, d'un vert clair irrégulièrement tacheté et ponctué de blanc crème; l'une des plus distinctes et des plus élégantes du genre.

338. — *nebulosa* . . . . . 3 à 10 "

379. — *nobilis* . . . . . 5 à 15 "

461. — *Parlatorei* . . . . . 15 à 150 "

Admirable Aroïdée à feuilles épaisses, d'un vert noirâtre, luisantes, comme vernissées; port très-distinct par son étrange faïence et sa grande vigueur.

223. — *Pearcei* . . . . . 2 à 10 "

235. — *Seguine picta* . . . . . 2 à 10 "

484. — *splendens* . . . . . 25 "

Brillante Aroïdée, remarquable par l'éclat de son coloris. La tige est légèrement tigrée de vert foncé et de vert pâle.

481. — *Shuttleworthii* . . . . . 15 à 25 "

460. — *velutina* . . . . . 10 "

291. — *Wallisi* . . . . . 6 "

79. *Echidnium Schomburghii* . . . . . 3 "

303. *Gonatanthus sarmentosus* . . . . . 2 "

263. *Monstera deliciosa* (*Tornelia fragrans*) . . . . . 5 à 20 "

487. *Philodendron Carderi* . . . . . 15 "

Feuilles en cœur, larges, d'un vert bouteille foncé, luisant, la côte principale marquée de lignes d'un vert glauque.

235. — *giganteum* . . . . . 3 à 8 "

459. — *gloriosum* . . . . . 10 "

236. — *grandifolium* . . . . . 6 à 10 "

237. — *heliconiæfolium* . . . . . 2 "

238. — *Lindenii* . . . . . 5 "

239. — *longilaminatum* . . . . . 10 "

411. — *melanochrysum* . . . . . 5 "

475. — *Melinoni* . . . . . 25 à 50 "

241. — *panduræforme* . . . . . 5 "

263. — *pertusum* . . . . . 5 à 20 "

242. — *pinnatifidum* . . . . . 10 "

457. — *speciosum* . . . . . 10 "

410. — *verrucosum* (*daguense*) . . . . . 5 "

388. *Pistia Stratiotes* . . . . . 2 "

249. *Pothos argyrea major* . . . . . 2 "

250. — — — *lucida* . . . . . 3 "

494. — (?) *celatocaulis* (FLORE, XXIII, 133). . . . . 25 à 40 "

Très-singulière Aroïdée grimpante, à feuilles d'un vert sombre, imbriquées, recouvrant entièrement la tige.

251. — *pentaphylla* . . . . . 5 "

1900. *Richardia africana* (*Calla æthiopica*) 1 "

Feuilles d'un vert brillant, grande spathe d'un blanc pur, odorante.

1001. — *albo-maculata* (n) (FL., XXI, 165),

en pot . . . . . 1 "

Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs. Feuilles d'un vert foncé, vernissé, tout couvert de mouchetures blanches; fleurs en cornet, d'un blanc pur, d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison.



	Fr. C.		Fr. C.
257. <i>Spathiphyllum cannæfolium</i>	30 à 75 "	271. <i>Xanthosoma appendiculatum</i>	2 "
258. — <i>heliconiæfolium</i>	25 "	389. — <i>Lindenii</i> ( <i>Phyllotanium</i> )	5 à 200 "
256. — <i>Minahassæ</i>	10 à 30 "	Imposante Aroïdée très-ornementale, d'un port compacte, à feuilles grandes, oblongues-sagittées, d'un vert brillant entièrement veiné de blanc argenté.	
495. — <i>Ortgiesi</i>	20 "	68. — <i>Maffa</i>	2 "
476. — <i>pictum</i>	10 à 25 "	273. — <i>utile</i>	2 "
423. <i>Stendnera colocasiæfolia</i>	2 "	70. — <i>violaceum</i>	2 "
Feuilles peltées, cordiformes, d'un vert bleuâtre.		397. <i>Zamioculcas Loddigesii</i>	5 "
274. <i>Typhonium divaricatum</i>	3 à 8 "		

## BÉGONIAS TUBÉREUX.

	Fr. C.		Fr. C.
154. <i>boliviensis</i> (FLORE, XVII, 21)	50 "	328. <i>Frœbeli</i>	1 "
221. <i>cinnabarina rosea</i> ( <i>Lemoine</i> )	1 50	Grand bouquet de fleurs d'un écarlate vif.	
155. <i>diversifolia</i> (FLORE, XVIII, 7)	25 "	383. <i>Memoria Van Houttei</i> ( <i>Frœbel</i> )	1 "
156. <i>Evansiana</i> ( <i>discolor</i> )	50 "	Tiges florales droites, se couvrant de fleurs d'un amarante velouté vif.	
les six.	2 "	339. <i>octopetala rosea</i>	3 "
Très-belle fleur d'un carmin clair, très-grand feuillage nervuré de rouge.		174. <i>Wiltoniana</i>	50 "

## BÉGONIAS TUBÉREUX HYBRIDES.

Médailles d'or à Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Liège, Lille, Tournai, etc.

Les amateurs de Bégonias tubéreux qui ont visité notre Établissement pendant l'été, ont vu fleurir en pleine terre les admirables variétés que nous avons obtenues de semis; ces plantes sont d'un très-beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre. Leurs coloris sont très-variés : on y rencontre le blanc, le jaune, l'orange, le chamois, le saumon, l'incarnat, le rose, le carmin, l'écarlate, le cramoiis, le grenat, le naccarat, le vermillon, le pourpre, l'amarante, et toutes les nuances intermédiaires.

CULTURE. — On empote les tubercules dès le mois de mars, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau; ils s'y établissent et sont prêts à être mis, en mai, en pleine terre, en plein soleil, où ils fleurissent pendant les cinq mois de la belle saison. On les garde l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au-dessus de 0, à la manière des Glaïeuls, etc.

## DEUXIÈME SÉRIE.

Une variété au choix de l'amateur. fr. 2-50  
10 — à mon choix. " 20 "

239. *Mad. Oscar Lamarche* (*L. Van Houtte*). Grande fleur d'un rouge orangé.  
243. *Paul Masurel* (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur d'un beau rose orangé.  
264. *James Backhouse* (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 45). Grande fleur bien faite, d'un rouge corail; a obtenu le 1<sup>er</sup> prix à l'exposition de Bruxelles.  
269. *Pearcei vitellina* (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien arrondie, d'un orange foncé.  
271. *Léopold II* (*L. Van Houtte*). Grande fleur d'un écarlate vif, pétales latéraux allongés.  
355. *Comte de Flandre* (*L. Van Houtte*) (FLORE, XXIII, 45). Magnifique grande fleur de la plus belle des formes, pétales larges, bien étalés, bien arrondis, d'un orange saumoné, revers saumon carminé; variété de tout premier ordre.  
365. *Mad. Descat* (*L. Van Houtte*). Fleur très-belle, bien faite, pétales larges, blancs, légèrement lavés de rose sur les pétales verticaux.  
367. *Dr Göppert* (*L. Van Houtte*). Fleur très-belle, grande, bien faite, pétales bien arrondis, d'un rose vif, plus clair au centre; feuilles énormes.  
413. *Princesse Mestschersky* (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; fleur très-grande, plate, bien faite, pétales arrondis, d'un carmin clair vif.



445. Souvenir de L. Van Houtte (*Blancquaert et Vermeire*). Très-grande fleur vermillon, pétales arrondis.  
 508. Souvenir de William Saunders (*L. Van Houtte*). Fleur blanche teintée d'incarnat, bordée de rose très-pâle.

## TROISIÈME SÉRIE. — Nouveautés de 1880.

Une variété au choix de l'amateur. 5 francs.

Les 10 variétés . . . . . 45 "

360. Bossnet (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un superbe rose carminé.  
 369. Massillon (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur, grande et bien faite, pétales arrondis, d'un rouge saumon très-vif.  
 409. Fléchier (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; grande fleur bien faite, pétales arrondis, d'un blanc carné très-tendre.  
 414. Fénélon (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; grande fleur plate, bien faite, pétales bien arrondis, d'un carmin très-vif.  
 504. Pascal (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur d'un rouge laque carminé.  
 511. Corneille (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un écarlate très-vif.  
 513. Racine (*L. Van Houtte*). Énorme fleur d'un vermillon vif.  
 597. Boileau (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un cramoisi vif.  
 640. A. De Lean (*Blancquaert et Vermeire*). Variété très-vigoureuse; fleur érigée, bien ronde, d'un carmin velouté à reflet rouge brique.  
 641. Le progrès (*Blancquaert et Vermeire*). Grande fleur de couleur lie de vin velouté, boutons rouge sang noirâtre.

## QUATRIÈME SÉRIE. — Variétés à fleurs doubles.

281. Comtesse de Flandre (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; fleur bien faite, d'un beau rouge saumoné. . . . . 8 francs.  
 308. balsaminæflora (*Lemoine*). Fleur orange, pétales verticaux larges, pétales latéraux plus courts . . . . . 3 "  
 309. Gloire de Nancy (*Lemoine*). Variété splendide, d'un vermillon vif, aigrette d'étamines transformées en plus de 60 pétales. . . . . 8 "  
 310. Lemoinei (*Lemoine*). Grande fleur orange vermillonnée. . . . . 7 "  
 314. salmonea plena (*Lemoine*). Grande fleur d'un rose saumoné clair. . . . . 4 "  
 329. Rachel (*L. Van Houtte*). Fleur d'un jaune citron vif. . . . . 8 "  
 376. anemonæflora plena (*Lemoine*). Fleur rose corail . . . . . 7 "  
 411. Madem. Jeanne Pecquereau (*L. Van Houtte*). Grande fleur très-bien faite, d'un jaune soufre, centre jaune plus foncé. . . . . 8 "  
 424. Madem. Henriette Boutez (*L. Van Houtte*). Fleur écarlate. . . . . 8 "  
 449. Comtesse Horace de Choiseul (*Lemoine*). Fleur pleine comme celle d'un *Camellia*, blanche en s'ouvrant, et passant à une teinte rose clair, presque saumonée . . . . . 10 "  
 453. pæoniæflora (*Lemoine*). Énorme fleur très-pleine, de forme Pivoine, rose de Chine saumoné; longs pédoncules fléchissant sous le poids des fleurs . . . . . 8 "  
 465. Louis Bouchet (*Bouchet*). Fleur très-pleine, d'un rouge orangé vif . . . . . 8 "  
 466. Marie Bouchet (*Bouchet*). Fleur énorme, très-pleine, d'un rouge cocciné foncé . . . . . 7 "  
 571. Le Dante (*L. Van Houtte*). Variété de premier ordre; fleur bien faite, conique, très-double, d'un vermillon vif. . . . . 10 "  
 616. Cervantes (*L. Van Houtte*). Fleur bien double, d'un cramoisi vif. . . . . 10 "  
 622. Miracle (*Lemoine*). Fleur d'un beau rouge solferino. . . . . 8 "

BÉGONIAS TUBÉREUX ayant déjà fleuri, en superbe mélange.

Les douze : 5 francs. — Les vingt-cinq : 8 francs. — Les cinquante : 14 francs. — Le cent : 25 francs.



## BEGONIA DISCOLOR REX.

Pièce : fr. 1-50.

539. Madame Svahn (*Svahn*).  
 541. Lucienne Bruant ( *n* ).  
 542. Edouard André ( *n* ).  
 543. A. Carrière ( *n* ).

544. W. E. Gambleton (*Svahn*).  
 545. Comtesse Gab. de Clermont-Tonnerre ( *n* ).  
 546. Marguerite Bruant ( *n* ).

Cette nouvelle race de Bégonias, issue d'un heureux croisement entre le *B. discolor* et les variétés à beau feuillage du *Begonia Rex*, que l'on cultive en serre tempérée, a fait sensation dans le monde horticole. Elle participe des qualités essentielles des deux parents : elle a la vigueur, le port élégant et la floraison du *B. discolor*, avec le beau feuillage panaché des variétés du *B. Rex*. Mis en pleine terre, l'été, ou cultivés en pots, de préférence à mi-ombre, ces nouveaux Bégonias y prennent un accroissement rapide; en massifs, dans les jardins, ou en pots, en serre, ils feront partout merveille.

## BÉGONIAS HERBACÉS,

A FEUILLES PANACHÉES, MARBRÉES, MACULÉES, ETC.

12 belles variétés anciennes, à notre choix . 10 francs.  
 25 — — — — — 20 "

## NOUVEAUTÉS à 2 francs pièce.

316. Diamant.  
 318. Ch. Schürer.  
 319. Acté.  
 320. Annica.  
 326. Victor Lemoine.  
 420. Louise Chrétien.  
 442. Miranda.  
 468. Andalousie.  
 469. argentea hirsuta.  
 470. — zebрина.  
 471. Jules De Haussy.  
 472. Jules Duplessis.  
 473. Lebrun.  
 474. Mad. Crousse.  
 475. Mad. de la Peyrouse.  
 476. Mad. Maletta.  
 477. Michel-Ange.  
 478. Mr. Andrews.

479. Paul Payonne.  
 480. picturata major.  
 481. quadrizonalis ornata.  
 482. Rei Fernando major.  
 484. Victor Bleu.  
 485. sericea.  
 528. Perle de Paris.  
 529. Ed. André.  
 530. Vandermeulen.  
 531. Madem. Marie Denis.  
 532. Voie lactée.  
 533. M. Monterny.  
 534. Lucrèce.  
 535. Secrétaire Delamarre.  
 536. fulva.  
 621. Adrien Robine.  
 623. Merveille.

## NOUVEAUTÉS à 3 francs pièce.

341. Otto Forster.  
 628. Mad. Marie Talabot.  
 630. Marie.  
 631. Pluton.  
 632. purpurascens.  
 633. George Renouard.

634. lactea rosea.  
 635. Mad. Courty.  
 636. Mad. Planchon.  
 637. margaritacea.  
 638. Marron.  
 639. multicolor.

## BÉGONIAS SEMI-LIGNEUX.

- Fr. C.  
 340. argyrostigma gigantea . . . . . 3 "  
 Espèce brésilienne à feuilles pointillées de blanc argenté;  
 très-belle hampe garnie de fleurs rouges.  
 480. corallina . . . . . 3 "

- Fr. C.  
 188. Laura . . . . . 1 "  
 381. Limminghei . . . . . 2 "  
 189. multiflora . . . . . 1 "



## BROMÉLIACÉES.

Les BROMÉLIACÉES sont aujourd'hui en grand honneur, et c'est justice; ce sont d'admirables plantes, qui décorent aussi luxueusement les serres tempérées que les appartements où elles trouvent un milieu approprié à leur nature. Leur port distingué, leur feuillage ornemental, panaché ou zébré chez bon nombre d'espèces, leurs épis de fleurs singulières, diversement colorées et accompagnées presque toujours de bractées des teintes les plus vives, les font rechercher avidement par les amateurs. Ce sont de précieuses plantes de collection.

	Fr. C.		Fr. C.
2. <i>Æchmea cærulescens</i> . . . . .	3 à 10 "	133. <i>Encholirion roseum</i> . . . . .	3 à 5 "
1. — <i>coelestis</i> ( <i>Hoplophyton</i> ) . . . . .	2 "	77. — <i>Saundersi</i> . . . . .	5 à 15 "
119. — — <i>glomerata</i> . . . . .	10 "	29. <i>Guzmania fragrans</i> . . . . .	2 "
71. — <i>Melinoni</i> . . . . .	5 "	<i>les douze</i> . . . . .	18 "
37. — <i>spectabilis</i> . . . . .	6 "	28. — <i>picta</i> ( <i>Nidularium fulgens</i> ) . . . . .	6 "
4. — <i>Weilbachi</i> . . . . .	3 "	78. — <i>tricolor</i> (FLORE, IX, 159) . . . . .	3 à 6 "
7. <i>Ananassa sativa foliis variegatis</i> 25 à 50 "		30. <i>Hechtia Ghiesbreghtii</i> . . . . .	10 "
155. <i>Anoplophyton Rolissoni</i> . . . . .	20 "	31. — <i>glomerata, fort</i> . . . . .	15 "
158. — <i>subbullatum</i> . . . . .	15 "	79. <i>Hohenbergia strobilacea</i> . . . . .	2 "
8. <i>Billbergia amoena</i> . . . . .	3 "	141. <i>Hoplophyton calyculatum</i> . . . . .	5 "
129. — <i>Baraquiniana</i> . . . . .	6 "	166. — <i>Lindenii</i> . . . . .	5 "
101. — <i>cærulescens</i> . . . . .	5 "	155. <i>Karatas Plumieri</i> . . . . .	5 à 10 "
139. — <i>chlorosticta</i> . . . . .	15 "	32. <i>Nidularium agavifolium</i> . . . . .	3 "
10. — <i>Croyana</i> . . . . .	5 "	28. — <i>fulgens</i> ( <i>Guzmania picta</i> ) . . . . .	6 "
11. — <i>discolor</i> . . . . .	4 "	33. — <i>Innocenti</i> . . . . .	4 "
110. — <i>excellens</i> . . . . .	15 "	35. — <i>Meyendorffi</i> . . . . .	5 "
130. — <i>gigantea</i> . . . . .	25 "	171. — <i>princeps</i> . . . . .	10 "
109. — <i>granulosa</i> . . . . .	10 "	36. — <i>Scheremetieffi</i> . . . . .	3 "
106. — <i>horrida</i> . . . . .	5 "	46. — <i>triste</i> . . . . .	3 "
169. — <i>iridifolia</i> . . . . .	4 "	116. <i>Pepinia aphelandræiflora</i> . . . . .	2 "
59. — <i>Joinvillei</i> . . . . .	2 "	38. <i>Pholidophyllum zonatum</i> . . . . .	3 "
13. — <i>Leopoldi</i> . . . . .	4 "	167. <i>Pitcairnia Andreana</i> . . . . .	2 "
14. — <i>Liboniana</i> (FLORE, X, 195) . . . . .	2 "	83. — <i>bracteata commutata</i> . . . . .	5 "
15. — <i>longifolia</i> . . . . .	2 "	144. — <i>corallina</i> . . . . .	10 "
16. — <i>melanacantha</i> . . . . .	4 "	85. — <i>imbricata</i> . . . . .	4 "
17. — <i>pyramidalis</i> . . . . .	5 "	87. — <i>polyanthoides</i> . . . . .	4 "
18. — <i>Quesneliana</i> ( <i>Quesnelia rufa</i> )		88. — <i>punicea</i> . . . . .	3 "
(FLORE, X, 157) . . . . .	" "	90. — <i>speciosissima</i> . . . . .	4 "
135. — <i>Reginæ Amelæ</i> . . . . .	15 à 30 "	91. — <i>staminea</i> . . . . .	4 "
127. — <i>rhodocyanea superba</i> . . . . .	10 "	93. — <i>undulata</i> . . . . .	3 "
20. — <i>sanguinea</i> . . . . .	3 "	94. — <i>undulatifolia</i> . . . . .	5 "
22. — <i>thyrsoides</i> . . . . .	3 "	40. <i>Portea kermesina</i> . . . . .	15 "
23. — <i>Wiotiana</i> . . . . .	5 "	42. <i>Pourretia brevifolia</i> . . . . .	3 à 16 "
24. — <i>zebrina, fort</i> . . . . .	5 "	151. — <i>dasyliroides</i> . . . . .	3 "
132. <i>Bromelia Binoti, forts</i> . . . . .	10 à 25 "	43. — <i>mexicana</i> . . . . .	4 "
113. — <i>macrodosa</i> . . . . .	4 "	44. <i>Puya heterophylla</i> . . . . .	5 "
98. <i>Caraginata lingulata</i> . . . . .	4 "	45. — <i>recurvata</i> . . . . .	5 "
168. <i>Chevalliera Veitchi</i> ( <i>Æchmea</i> ) 25 à 50 "		47. — <i>xanthocalyx</i> . . . . .	5 "
Superbe espèce nouvelle dont les fleurs sont réunies en un		48. <i>Tillandsia bivittata</i> . . . . .	5 "
thyrses compactes de fort bel effet.		168. — <i>complanata</i> . . . . .	15 à 25 "
73. <i>Cryptanthus acaulis</i> . . . . .	2 "	27. — <i>glaucophylla</i> . . . . .	8 "
115. — — <i>ruber</i> . . . . .	2 "	157. — <i>juncifolia</i> . . . . .	25 "
74. <i>Echinostachys Pineliana</i> . . . . .	5 "	122. — <i>Legrellei</i> . . . . .	5 "
159. — <i>Van Houtteana</i> . . . . .	5 à 20 "	114. — <i>Lindenii</i> . . . . .	25 à 100 "
Plante d'un beau port, à feuilles très-serrées, très-épi-		Charmannte espèce à long épi de grandes fleurs bleu de	
neuses, d'un beau vert foncé.		cobalt, à bractées d'un rose tendre.	
128. <i>Encholirion corallinum</i> . . . . .	3 à 5 "	164. — — <i>major</i> . . . . .	25 à 75 "
75. — <i>Jonghi</i> . . . . .	10 "	138. — <i>mosaica</i> . . . . .	40 à 100 "



	Fr. C.		Fr. C.
155. <i>Tillandsia Rollissoni</i> ( <i>Anoplophyton</i> )	20 "	140. <i>Vriesea Hillegeeriana</i> , très-forts	25 à 50 "
50. — <i>splendens</i> ( <i>Vriesea</i> ) (FLORE, II,		Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe, tigrée au bas de la feuille.	
mai, pl. IV).	2 à 5 "	153. — <i>Malzinei</i>	10 "
126. — <i>tessellata</i>	40 "	54. — <i>psittacina</i>	5 "
137. — <i>Zahnii</i>	5 à 20 "	154. — — <i>aureo-lineata</i>	" "
97. <i>Vriesea brachystachys</i>	5 "	134. — <i>sanguinolenta maculata</i>	25 "
53. — <i>Glaziovana, extra-fort</i>	200 "	50. — <i>splendens</i> ( <i>Tillandsia</i> ) (FLORE,	
161. — <i>guttata</i>	15 "	II, mai, pl. IV)	2 à 5 "

## CYCADÉES.

Les CYCADÉES sont des plantes ornementales par excellence. La plupart des espèces de cette famille sont curieuses sous le rapport de leur végétation, et bon nombre d'entre elles sont considérées, à juste titre, comme de premier ordre pour l'ornementation des serres et des appartements. Elles offrent une tige unique, généralement simple, garnie, à son sommet et en couronne, de grandes feuilles formées d'un très-grand nombre de folioles raides, épaisses, disposées de chaque côté du pétiole commun. Les Cycadées sont de riches pendants aux Palmiers, auxquels on les associera avantageusement pour la décoration des serres et des jardins d'hiver.

	Fr. C.		Fr. C.
30. <i>Bowenia serrulata</i>	25 "	18. <i>Dioon edule</i>	50 à 300 "
Cette espèce australienne est très-ornementale; c'est la plus distincte et la plus remarquable de toutes les Cycadées, et la seule à frondes bipinnées. Elle a le tronc court et gros; au sommet se développent ses larges feuilles qui sont d'une grande beauté.			
29. — <i>spectabilis</i>	50 "	17. <i>Macrozamia plumosa</i>	50 "
31. <i>Cycas Boddami</i> ( <i>gracilis glauca</i> )	25 à 200 "	12. <i>Zamia corallipes</i>	50 "
2. — <i>circinalis</i>	15 à 2000 "	7. — <i>furfuracea</i>	5 à 30 "
3. — <i>media</i>	10 à 200 "	44. — <i>Hildebrandti</i>	10 à 300 "
14. — <i>neo-caledonica</i>	15 à 125 "	45. — <i>Hopei</i> ( <i>Catakidozamia</i> )	15 "
21. — <i>Normanbyana</i>	20 "	8. — <i>Mac Kenzi</i> ( <i>Macrozamia</i> )	2 à 5 "
4. — <i>revoluta</i>	5 à 500 "	10. — <i>mexicana, très-fort</i>	250 "
33. — <i>Rumphii</i>	15 "	28. — <i>Miqueli</i>	5 "
		24. — <i>obliqua</i>	25 à 200 "
		27. — <i>Perowskiana</i> ( <i>Denisoni</i> )	5 à 50 "
		13. — <i>villosa</i>	150 à 300 "

## CYRTANDRACÉES.

Cette famille confine de très-près à celle des GESNÉRIACÉES; leurs fleurs ressemblent à celles des TYDÆA; ce sont des plantes volubiles qu'on met avantageusement dans des vases suspendus, ou qu'on peut faire grimper le long des murs.

	Fr. C.		Fr. C.
7. <i>Æschynanthus Boschianus</i>	1 "	5. <i>Æschynanthus zebrinus</i>	1 "
1. — <i>cordifolius</i>	1 "	or <i>Chirita lilacina</i>	2 "
8. — <i>javanicus</i>	1 "	t — <i>sinensis</i>	2 "
9. — <i>Lobbianus</i>	1 "	n — <i>foliis variegatis</i>	2 "
2. — <i>longiflorus</i>	1 "	or <i>Cyrtandra bicolor</i>	2 "
10. — <i>pulcher</i>	1 "	Superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui d'un <i>Rhododendron campanulatum</i> .	
3. — <i>ramosissimus</i>	1 "	t <i>Didymocarpus argenteo-maculatus</i>	10 "
11. — <i>splendidus</i>	1 "	n — <i>Rexii</i>	2 "
5. — <i>tricolor</i>	1 "		



# FOUGÈRES

## DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

### (FILICES.)

N. B. Les Fougères de SERRE CHAUDE ne sont précédées d'aucun signe; celles qu'on peut cultiver en SERRE FROIDE sont précédées d'une croix (†); enfin les FOUGÈRES EN ARBRE sont désignées par un astérisque (\*).

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE seront données par correspondance.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Acrophorus PRESL.</b>		<b>Adiantum L.</b>	
298. hemipterus M. . . . .	2 à 5 "	436. Seemannii HOOK. . . . .	2 "
<b>Acrostichum L.</b>		Fougère à très-grandes feuilles.	
524. villosum SW. . . . .	5 "	301. trapeziforme L. . . . .	2 "
<b>Actinopteris LINK.</b>		331. Veitchi . . . . .	3 "
120. radiata LINK. . . . .	5 "	342. velutinum . . . . .	6 "
les douce . . . . .	40 "	496. venustum DON. . . . .	2 "
<b>Adiantopsis FÉE.</b>		517. Williamsi . . . . .	15 "
526. radiata FÉE . . . . .	5 "	<b>Alsophila R. BR.</b>	
Fougère très-originale, ressemblant à un Palmier Hottentot en éventail, à frondes sveltes ne s'élevant qu'à quelques pouces, équidistantes entre elles.		142. † *australis R. BR. . . . .	.1 à 25 "
<b>Adiantum L.</b>		457. *capensis J. SM. . . . .	25 à 50 "
122. † Capillus Veneris L. . . . .	1 "	141. *elegans MART. . . . .	30 à 200 "
365. † — — amabile . . . . .	2 "	140. † *excelsa R. BR. . . . .	2 "
328. † — — crispulum . . . . .	2 "	527. † *Loddigesi . . . . .	.8 à 15 "
363. † — — Daphnitis . . . . .	2 "	426. † *Van Geerti . . . . .	10 à 25 "
329. † — — magnificum . . . . .	2 "	<b>Anemia SW.</b>	
366. † — — undulatum . . . . .	2 "	397. † collina RADD. . . . .	2 "
125. concinnum H. et B. . . . .	3 "	430. † Phyllitidis SW. . . . .	2 "
126. — latum M. . . . .	1 "	<b>Anemidictyon J. SM.</b>	
128. † cuneatum LANGSD. et FISCH. . . . .	1 "	483. Phyllitidis tessellatum . . . . .	15 "
369. curvatum KLFS. . . . .	5 "	Jolie Fougère à feuillage élégamment panaché.	
300. diaphanum BL. . . . .	1 "	<b>Angiopteris HOFFM.</b>	
542. dissectum . . . . .	3 "	148. evecta HOFFM. . . . .	.400 "
487. Edgeworthii HOOK. . . . .	2 "	149. longifolia DEVR. . . . .	5 à 500 "
340. excisum LEYI . . . . .	3 "	150. macrophylla HORT. . . . .	5 à 100 "
129. — multifidum M. . . . .	3 "	151. pruinosa KZE. . . . .	.600 "
130. Farleyense M. (FLORE, XIX, 7) 3 à 150 "		152. Verschaffelti HORT. . . . .	5 à 100 "
Charmante Fougère d'une rare élégance, dont le feuillage est d'une extrême légèreté.		<b>Antigramma PRESL.</b>	
525. Flemingi . . . . .	6 "	380. rhizophylla SM. . . . .	5 "
440. Funcki . . . . .	4 "	<b>Aspidium SW.</b>	
424. gracillimum . . . . .	1 50 "	498. caryotoideum . . . . .	1 "
425. hispidum SW. . . . .	1 "	<b>Asplenium SWARTZ.</b>	
471. Ludemannianum. . . . .	10 "	153. alatum HUMB. et BP. . . . .	5 "
135. macrophyllum SW. . . . .	2 "	443. † aristatum SW. . . . .	2 "
543. Scutulum M. . . . .	20 "	155. † dimorphum KZE. . . . .	.2 à 10 "
Mignonne Fougère atteignant rarement 6 pouces de hauteur, à frondes non retombantes, d'un vert foncé, très-propres pour garnitures de bouquets, etc.		370. formosum WILLD. . . . .	10 "
484. neo-guineense. . . . .	15 "	474. † lepidocaulon. . . . .	2 "
Nouvelle Fougère d'une grande élégance, à frondes d'un vert sombre à l'état adulte.		265. † Nidus L. . . . .	5 "
394. peruvianum H. K. . . . .	2 "	371. normale DON. . . . .	5 "
367. polyphyllum WILLD. . . . .	2 à 5 "	540. Novæ-Caledoniæ . . . . .	25 "
311. rubellum . . . . .	3 "	Nouveauté remarquable et bien distincte, dont les frondes coriaces, étalées dans leur milieu, sont comme ramassées dans leur pourtour.	
316. † Sanctæ Catharinæ . . . . .	2 "	381. † obtusatum FORST. . . . .	2 "
136. Scutum . . . . .	1 "	419. schizodon . . . . .	3 "
		162. † Veitchianum M. . . . .	1 à 4 "
		362. viviparum PRESL. . . . .	2 "

Fr. C.

- Athyrium** ROTH.  
 164. †\* *decurtatum* PRESL. . . . . 3 à 10 "  
**Balanium** KLFS.  
 180. †\* *antarcticum* PRESL. . . . . 1 à 500 "  
**Blechnum** L.  
 165. †\* *brasiliense* DESV. . . . . 2 à 50 "  
 382. † *longifolium* H. B. K. . . . . 1 "  
 499. *pulchellum* . . . . . 10 "  
**Campyloneuron** PRESL.  
 317. *decurrens* PRESL. . . . . 3 "  
**Cheilanthes** SW.  
 169. *elegans* DESV. . . . . 3 "  
 395. *farinosa* KLFS. . . . . 5 "  
 455. *gracillima* EATON. . . . . 10 "  
 529. *micromera* LINK. . . . . 5 "  
 530. *vestita* SW. . . . . 5 "  
**Cibotium** KLFS.  
 170. †\* *princeps* LINDL., *forts* . . . . . 25 à 50 "  
 171. †\* *regale* M. . . . . 3 à 40 "  
 172. †\* *Schiedei* SCHLECHT. . . . . 15 à 50 "  
 173. †\* *spectabile* HORT., *forts* . . . . . 6 à 25 "  
**Cyathea** SM.  
 428. †\* *Burkei*, *forts troncs* . . . . . 200 à 1500 "  
       — *jeunes plantes* . . . . . 5 "  
 L'une des plus belles Fougères arborescentes de serre froide. Le tronc, fort et droit, est couronné d'un riche ensemble de frondes d'un vert foncé, très-gracieusement retombantes.  
 175. †\* *dealbata* SW. . . . . 2 à 75 "  
 435. †\* *Dregei* KZE. . . . . 400 "  
 Espèce de l'Afrique méridionale, d'un port érigé, formant une superbe couronne de frondes d'un vert brillant.  
 303. † *medullaris*, *forts* . . . . . 5 à 25 "  
       *très-fort* . . . . . 100 "  
 Imposante Fougère à pétioles noirs.  
**Cyrtomium** PRESL.  
 176. † *falcatum* PRESL. . . . . 1 "  
**Davallia** SM.  
 177. † *canariensis* SM. . . . . 2 "  
 406. † *elegans dissecta* SM. . . . . 3 "  
 538. *Mariesii*. . . . . 10 "  
 312. *Mooreana* . . . . . 5 "  
 463. † *Novæ-Zelandiæ* COLENSO. . . . . 4 "  
 375. † *tenuifolia* SW. . . . . 2 "  
**Dicksonia** L'HÉRIT.  
 180. †\* *antarctica* LABILL. . . . . 1 à 500 "  
       *douze jeunes plantes* . . . . . 9 "  
 464. \**Deplanchei* . . . . . 200 "  
 Fougère d'une extrême rareté, l'une des plus splendides de ce beau genre. Les pétioles sont d'un brun doré; les frondes sont dressées et se courbent gracieusement, de façon à laisser admirer les fines dentelures de leurs pinnules. Cette espèce requiert la serre tempérée.  
 408. †\* *squarrosa* SW. . . . . 5 "  
**Diplazium** SW.  
 183. *decussatum* J. SM. . . . . 2 à 5 "  
 184. *grandifolium* SW. . . . . 50 "  
**Doryopteris** FÉE.  
 206. † *Alcyonis* HORT. . . . . 3 "  
 207. † *Currori* HORT. . . . . 2 "  
       *les douze* . . . . . 12 "

Fr. C.

- Doryopteris** FÉE.  
 465. † *nobilis* M. . . . . 5 à 10 "  
**Eupodium** J. SM.  
 185. *Kaulfussi* J. SM. . . . . 5 à 50 "  
**Gleichenia** R. B.  
 187. † *dicarpa* R. B. . . . . 8 à 15 "  
 537. † *longipinnata* . . . . . 20 "  
 188. † *Speuncaea* R. B. . . . . 8 à 15 "  
**Goniophlebium** BLUME.  
 377. *Reinwardti*. . . . . 10 "  
 547. *subauriculatum* PRESL. . . . . 15 "  
**Gymnogramma** DESV.  
 190. *chrysophylla Laucheanæ* HORT. . . . . 1 "  
 387. *decomposita* HORT. . . . . 1 "  
 304. *hybrida* . . . . . 1 "  
 482. *Mülleri* HOOK. . . . . 15 "  
 273. *Parsonsi*. . . . . 1 "  
 386. *tartarea* DESV. . . . . 1 "  
 195. *Wettenhalliana* M. . . . . 1 "  
**Hemidictyum** PRESL.  
 503. *marginatum* PRESL., *fort* . . . . . 30 "  
**Hemionitis** L.  
 502. *palmata* L. . . . . 2 "  
**Hymenodium** FÉE.  
 198. *crinatum* FÉE (FLORE, IX, 203) 5 à 15 "  
**Lastrea** BORY.  
 519. \**aristata variegata* . . . . . 15 "  
 Une des plus jolies Fougères à feuillage panaché; feuilles charnues, d'un riche vert foncé avec une bande d'un vert jaunâtre pâle au milieu de chaque pinnule.  
 201. *patens* PRESL. . . . . 2 "  
**Litobrochia** PRESL.  
 410. *leptophylla* FÉE . . . . . 3 "  
 501. † *vespertilionis* PRESL. . . . . 2 "  
**Lomaria** WILLD.  
 211. † *ciliata* M. . . . . 1 "  
 476. † *discolor bipinnatifida* . . . . . 10 à 20 "  
 213. † *fluviatilis* SPRENG. . . . . 2 "  
 214. † *gibba* LABILL. . . . . 1 à 3 "  
 217. † *Patersoni* SPRENG. . . . . 2 "  
 411. † *procera* SPRENG. . . . . 10 "  
 352. †\* *zamioides* GARDN., *forts*. . . . . 2 à 10 "  
**Lycopodium** L.  
 544. *ulicifolium* VENT. . . . . 15 à 25 "  
**Lygodium** SW.  
 511. † *japonicum* SW. . . . . 5 "  
 405. † *scandens* SW., *fort*. . . . . 5 "  
**Marattia** SM.  
 319. *Laucheanæ* HORT. . . . . 5 à 50 "  
**Microlepia** PRESL.  
 485. *hirta cristata* . . . . . 3 à 10 "  
 122. † *strigosa* M. . . . . 1 à 5 "  
**Nephrodium** RICH.  
 222. † *molle corymbiferum* M. . . . . 3 à 6 "  
**Nephrolepis** SCHOTT.  
 510. *davallioides furcans* . . . . . 6 à 15 "  
 488. *Duffi*. . . . . 3 à 6 "  
 Fougère à frondes gracieusement retombantes, et à découpures d'une rare élégance.



	Fr. C.
Nephrolepis SCHOTT.	
223. † neglecta . . . . .	2 à 5 "
224. † undulata J. SM. . . . .	2 "
Niphobolus KLFS.	
390. Lingua corymbiferus M. . . . .	6 à 10 "
Nothochlæna R. BR.	
531. nivea DESV. . . . .	2 "
Olfersia RADD.	
532. cervina KZE. . . . .	10 "
Onychium KLFS.	
227. † japonicum KZE. . . . .	2 "
Phegopteris L.	
512. polypodioides . . . . .	5 "
Phymatodes PRESL.	
450. † leiorrhiza WALL. . . . .	3 à 10 "
Platycerium DESV.	
228. † alcornue DESV. . . . .	2 à 10 "
393. † — majus . . . . .	10 à 75 "
229. biforme BL. . . . .	10 à 50 "
230. grande J. SM. . . . .	10 à 20 "
468. Wallichi HOOK. . . . .	100 "
473. Willinckii . . . . .	50 "

## Polypodium L.

307. † albo-punctatum RADD. . . . .	3 "
533. angustifolium KZE. . . . .	3 "
321. † glaucum RADD. . . . .	2 "
512. Phegopteris L. . . . .	5 "

## Espèce rustique.

## Pteris L.

310. arguta AIR. . . . .	1 "
234. argyrea M., <i>forts</i> . . . . .	1 à 10 "
235. † cretica albo-lineata HOOK. . . . .	1 "

*les douze.*

418. cristata Dixoni. . . . .	3 "
236. hirsuta excelsa. . . . .	3 "
546. leptophylla SW. . . . .	3 "
308. quadriaurita tricolor (FL., XIII, 157) 2	"
417. semipinnata L. . . . .	3 "
239. † serrulata L. . . . .	1 "
351. † — cristata M. . . . .	1 "
477. † — Leyi. . . . .	3 "

*les douze.*

Charmante nouveauté très-élégante, de forme bizarre, excellente pour corbeilles.

545. † — Ouvrardi . . . . .	2 "
551. undulata. . . . .	5 "

## Selaginella PALISS. DE BEAUV.

244. africana A. BRAUN. . . . .	2 "
245. apoda SPRING, <i>par mètre de longueur</i> 5	"
C'est avec cette Selaginella qu'on forme les bordures des massifs en serre chaude.	
246. atroviridis SPRING. . . . .	2 "
520. bellula . . . . .	5 "
Port érigé, tiges teintées de rouge, s'élevant à environ un pied de hauteur, garnies de branches latérales retombantes d'un gracieux effet.	
296. brevipes . . . . .	2 "
247. cæsia HORT. . . . .	1 "

25 sortes de Fougères de serre chaude et froide, à notre choix, en bonnes plantes. fr. 18 "

12 — — — froide,	— — — " 9 "
12 — — — chaude,	— — — " 9 "

	Fr. C.
Selaginella PALISS. DE BEAUV.	
325. californica . . . . .	5 "
278. caulescens SPRING. . . . .	2 "
248. conferta HORT. . . . .	2 "
280. convoluta SPRING. . . . .	2 "
281. cuspidata LINK. . . . .	2 "
282. — elongata SPR. . . . .	2 "
249. denticulata, <i>par mètre de longueur</i> 2	"
Selaginelle propre à former des bordures à l'intérieur des serres froides et tempérées.	
250. — variegata . . . . .	1 "
251. dichroa . . . . .	2 "
252. erythropus SPRING. . . . .	2 "
285. Galeottiana SPRING. . . . .	1 "
253. Griffithi SPRING. . . . .	2 "
288. inæqualifolia SPRING. . . . .	2 "
453. japonica. . . . .	3 "
534. Kraussiana aurea . . . . .	3 "
254. lepidophylla SPRING. . . . .	2 "
289. Ludoviciana A. BRAUN. . . . .	2 "
255. Lyalli SPRING. . . . .	2 "
292. Martensi SPRING. . . . .	2 "
388. — compacta . . . . .	2 "
257. — — foliis argenteo-varieg. HORT. 2	"
258. microphylla . . . . .	2 "
259. Poulteri M. . . . .	2 "
293. rubricaulis HORT. . . . .	2 "
294. sarmentosa A. BRAUN. . . . .	2 "
322. setosa . . . . .	2 "
295. stenophylla. . . . .	2 "
323. stolonifera SPRING . . . . .	2 "
522. texta. . . . .	" "
260. variabilis . . . . .	2 "
261. viticulosa KLZ. . . . .	2 "
324. Vogelii SPRING. . . . .	2 "
262. Wallichi SPRING . . . . .	2 "
263. Willdenowi HORT. . . . .	2 "
12 Selaginella en 12 sortes, à notre choix : 12	"
Sellignea BORY.	
536. Feei . . . . .	5 "

## Thamnopteris PRESL.

264. † australis M. . . . .	4 à 8 "
265. † Nidus PRESL. . . . .	5 "

## Todea WILLD.

469. africana WILLD. . . . .	3 à 25 "
309. † barbara M. . . . .	2 à 50 "
266. † hymenophylloides RICH. . . . .	10 à 40 "
320. † — compacta . . . . .	15 "
480. † — intermedia . . . . .	60 "
525. †* plumosa . . . . .	40 "

Fougère excessivement élégante, d'un port compacte, de petite stature, à frondes courtes, recourbées ainsi que les pinnales.

## Trichomanes L.

268. † radicans SW., <i>forts</i> . . . . .	10 à 75 "
Woodwardia SM.	


535. † angustifolia SM. . . . .	5 "
515. † radicans SM. . . . .	6 "

## GESNÉRIACÉES.

Les Gesnériacées ci-dessous ont un tout autre caractère que celles qui se trouvent énumérées dans notre Catalogue N° 191, pages 63 et suivantes, qui toutes ont des rhizomes ou des tubercules se conservant à sec pendant l'hiver, tandis que celles-ci, à l'exception des *GESNERIA DISCOLOR* et *DONKELAARI*, gardent leur végétation pendant l'hiver.

	Fr. C.
<i>Alloplectus bicolor</i> . . . . .	3 "
<i>Centrosolenia ænea</i> . . . . .	2 "
Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique au-dessus, violet lie de vin en dessous.	
— <i>bullata</i> . . . . .	3 "
<i>Columnnea Schiedeana</i> . . . . .	2 "
Longues fleurs jaunes panachées de brun.	
<i>Cyrtodeira fulgida</i> . . . . .	2 "
— <i>metallica</i> . . . . .	1 "
Feuilles veloutées, d'un vert brunâtre, avec la partie médiane blanchâtre; jolies petites fleurs d'un brillant écarlate.	
<i>Drymonia Turrialvæ</i> . . . . .	5 "
Feuilles crénelées, irrégulièrement gaufrées, d'un vert foncé à reflet blanchâtre, rouges en dessous; fleurs en grappes, à calyce rouge brique et à ample corolle blanche.	
<i>Episcia Luciani</i> . . . . .	2 "
Ravissante Gesnériacée à feuilles d'un vert noirâtre vers le milieu du limbe et s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords, à grandes fleurs d'un rouge vif.	
89. <i>Gesneria discolor</i> . . . . .	3 "
Magnifiques fleurs d'un brillant rouge laque.	

	Fr. C.
90. <i>Gesneria Donkelaari</i> (FLORE, IX, 119) . . . . .	5 "
Le plus riche de floraison et de coloris des <i>Gesneria</i> . Feuilles grandes et d'un beau vert foncé; tige et pétioles d'un rouge noirâtre; fleurs grandes, tube et limbe carmin vif, gorge jaunâtre.	
57. <i>Locheria magnifica</i> (FLORE, X, 117). 1 "	
Limbe très-large, du cramoisi le plus vif, élégamment moucheté de lignes et de macules pourpres noirâtres.	
<i>Moussonia elegans</i> . . . . .	2 "
<i>Pearcea hypocyrtiflora</i> (FLORE, XVII, 85) 3 "	
Beau port, beau feuillage, élégantes fleurs presque globuleuses, d'un rouge minium au-dessus, jaunes en dessous.	
<i>Rhytidophyllum floribundum</i> (FL., II, 178) 5 "	
<i>Sciadocalyx digitaliflora</i> . . . . .	2 "
<i>Sinningia purpurea</i> . . . . .	2 "
<i>Tapeinotes Carolinæ</i> (FLORE, XVIII, 43) 2 "	
Feuilles très-grandes, vertes au-dessus, rouges en dessous; fleurs très-curieuses, ventruës, couvertes de poils, d'un blanc pur.	
1821. <i>Tydaea hypocyrtoides</i> . . . . .	5 "

 Pour l'énumération, la description et les prix des autres GESNÉRIACÉES à rhizomes et à tubercules, telles qu'*ACHIMENES*, *DICYRTA*, *DIRCÆA*, *DOLICHODEIRA*, *EUCODONIA*, *GESNERIA*, *GLOXINIA*, *KOLLIKERIA*, *NÆGELIA*, *PLECTOPOMA*, *ROSANOWIA*, *SCHEERIA*, *STENOGAстра*, *TYDÆA*, etc., voir notre Catalogue N° 191, pages 63 et suivantes.

## LILIACÉES.

	Fr. C.
1866. <i>Gloriosa Planti</i> ( <i>Methonica</i> ) (FLORE, IX, 121). . . . .	50 "
les douze. . . . .	5 "

	Fr. C.
1867. <i>Gloriosa superba</i> . . . . .	5 à 10 "

## ORCHIDÉES TROPICALES.

Nous fournissons 25 différentes belles sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, aux prix de 150, 200 francs et plus, en plantes saines et de premier choix.

	Fr. C.
<i>Acineta Humboldtii</i> (FLORE, X, 65) 10 à 15 "	
<i>Acropera aurea</i> . . . . .	50 "
<i>Ada aurantiaca</i> . . . . .	15 à 30 "
<i>Aerides affine</i> . . . . .	25 à 35 "
— — <i>superbum</i> . . . . .	50 "
— <i>crassifolium</i> . . . . .	15 "
— <i>crispum</i> (FLORE, V, 438). . . . .	20 à 30 "
Très-belle espèce fleurissant en juin-juillet, en longs racèmes de fleurs blanches teintées de rose.	
— <i>curvifolium</i> . . . . .	10 "
— <i>Fieldingi</i> . . . . .	15 à 50 "

	Fr. C.
<i>Aerides Lindleyanum</i> . . . . .	50 à 100 "
— <i>Lobbi</i> . . . . .	50 "
— <i>maculosum</i> . . . . .	25 à 75 "
— <i>odoratum</i> . . . . .	10 à 25 "
— — <i>majus</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>quinquevulnerum</i> . . . . .	50 "
— <i>suavissimum</i> . . . . .	30 à 50 "
— <i>Warneri</i> . . . . .	50 "
<i>Angræcum</i> . . . . .	
— <i>sesquipedale</i> (FL., XIV, 49). 100 à 200 "	



	Fr. C.	
<i>Angræcum superbum</i> . . . . .	50 à 100 "	
<i>Anguloa Clowesi</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>eburnea</i> . . . . .	25 "	
<i>Anæctochilus concinnus</i> . . . . .	40 "	
— <i>Dawsonianus</i> (FL., XVIII, 21) . . . . .	10 à 15 "	
— <i>imperialis</i> . . . . .	25 "	
— <i>Legrellæ</i> . . . . .	50 "	
— <i>Lowi</i> . . . . .	40 "	
— <i>Petola</i> . . . . .	25 "	
— <i>pulcher</i> . . . . .	10 "	
— <i>Reinwardti</i> . . . . .	70 "	
— <i>Rollissoni</i> . . . . .	40 "	
— <i>setaceus intermedius</i> . . . . .	40 "	
<i>Arpophyllum giganteum</i> . . . . .	25 à 75 "	
<i>Barkeria Skinneri</i> . . . . .	10 à 15 "	
— <i>spectabilis</i> (FLORE, I, 139) . . . . .	15 "	
<i>Batemaniana Burtii Wallisi</i> . . . . .	100 "	
— <i>Meleagris</i> . . . . .	15 "	
<i>Bifrenaria aurantiaca</i> . . . . .	15 "	
— <i>Harrisoni alba</i> . . . . .	15 "	
<i>Bletia Gebinæ</i> . . . . .	10 "	
— <i>Shepherdii</i> . . . . .	10 "	
<i>Bolbophyllum aureum</i> . . . . .	10 "	
— <i>Carrayanum</i> . . . . .	15 "	
— <i>guttatum</i> . . . . .	15 à 20 "	
— <i>Henshalli</i> . . . . .	15 "	
— <i>Lobbi</i> . . . . .	10 à 15 "	
— <i>Thouarsi</i> . . . . .	15 "	
<i>Bollea coelestis</i> . . . . .	25 "	
<i>Brassavola Digbyana</i> (FL., III, 237) . . . . .	10 à 25 "	
— <i>glauca</i> . . . . .	10 à 15 "	
— <i>nodosa</i> . . . . .	10 "	
<i>Brassia brachyata</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>Gireoudiana</i> . . . . .	15 "	
— <i>guttata</i> . . . . .	15 "	
— <i>verrucosa</i> . . . . .	10 à 15 "	
— <i>major</i> . . . . .	20 "	
<i>Broughtonia sanguinea</i> . . . . .	15 "	
<i>Burlingtonia fragrans</i> . . . . .	5 "	
— <i>granatensis</i> . . . . .	15 "	
— <i>rigida</i> . . . . .	15 "	
— <i>venusta</i> . . . . .	15 à 30 "	
<i>Calanthe Veitchii superba</i> . . . . .	25 "	
— <i>vestita</i> (FLORE, VIII, 181) . . . . .	10 "	
— <i>roseo-aculeata</i> . . . . .	10 "	
<i>Catasetum macrocarpum</i> . . . . .	30 "	
— <i>species</i> . . . . .	20 "	
<i>Cattleya Acklandiæ</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>amethystiglossa</i> . . . . .	60 "	
— <i>amethystina</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>citrina</i> (FLORE, XVI, 147) . . . . .	10 à 25 "	
— <i>crispa</i> ( <i>Lælia</i> ) . . . . .	15 à 50 "	
— <i>Dowiana</i> (FLORE, XVI, 185). . . . .	40 à 75 "	
— <i>elegans</i> ( <i>Lælia</i> ) . . . . .	60 "	
— <i>Forbesi</i> . . . . .	10 "	
— <i>gigas</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>guttata</i> . . . . .	10 à 25 "	
— <i>Leopoldi</i> (FLORE, XIV, 209). . . . .	30 "	

	Fr. C.	
<i>Cattleya labiata</i> (FLORE, XVIII, 115). . . . .	50 "	
— <i>Loddigesi</i> . . . . .	25 "	
— <i>maxima</i> (FLORE, XX, 139) . . . . .	35 à 75 "	
— <i>Mendeli</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>Mossiiæ</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>superba</i> . . . . .	30 "	
Les <i>Cattleya labiata</i> et <i>Mossiiæ</i> sont les plus beaux du genre par la grandeur et les coloris de leurs fleurs.		
— <i>Perrini</i> ( <i>Lælia</i> ). . . . .	10 à 75 "	
Belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.		
— <i>præstans</i> ( <i>Lælia</i> ) (FL., XVII, 127) . . . . .	25 à 50 "	
— <i>purpurata</i> ( <i>Lælia</i> ) (FL., XI, 133) . . . . .	15 à 75 "	
— <i>Skinneri</i> . . . . .	15 à 30 "	
— <i>speciosissima</i> . . . . .	15 à 35 "	
— <i>superba</i> (FLORE, IX, 177) . . . . .	25 "	
— <i>Trianeæ</i> . . . . .	20 à 30 "	
<i>Chysis bractescens</i> (FLORE, VII, 87) . . . . .	20 à 30 "	
<i>Cœlia macrostachya</i> . . . . .	10 à 25 "	
<i>Cœlogyne assamica</i> . . . . .	15 "	
— <i>barbata</i> . . . . .	20 "	
— <i>cristata</i> (FLORE, XVII, 163). . . . .	10 à 75 "	
— <i>fimbriata</i> . . . . .	15 "	
— <i>flaccida</i> . . . . .	10 à 15 "	
Longs racèmes de fleurs blanches, très-odorantes.		
— <i>fuliginosa</i> . . . . .	15 à 20 "	
— <i>lagenaria</i> ( <i>Pleione</i> ) (FL., XXIII, 37). . . . .	10 "	
— <i>ocellata</i> . . . . .	20 "	
— <i>pandurata</i> (FLORE, XX, 145) . . . . .	15 à 25 "	
<i>Colax jugosus</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>viridis</i> . . . . .	15 "	
<i>Comparettia coccinea</i> . . . . .	15 "	
<i>Cynoches lepidum</i> . . . . .	20 à 30 "	
— <i>musciferum</i> . . . . .	25 à 35 "	
<i>Cymbidium aloifolium</i> . . . . .	5 à 15 "	
— <i>eburneum</i> . . . . .	10 à 20 "	
— <i>giganteum</i> . . . . .	20 à 50 "	
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	10 à 15 "	
— <i>Hookerianum</i> . . . . .	25 "	
— <i>Mastersi</i> . . . . .	20 à 40 "	
<i>Cypripedium barbatum</i> (FL., III, 190) . . . . .	2 à 5 "	
— <i>biflorum</i> . . . . .	10 à 15 "	
— <i>Crossi</i> . . . . .	15 à 25 "	
— <i>grandiflorum</i> (FL., XVIII, 91) . . . . .	5 à 50 "	
— <i>Veitchii</i> ( <i>barbatum superbum</i> ) (FLORE, XIV, 161) . . . . .	25 à 50 "	
Ces deux derniers <i>Cypripedium</i> sont les plus beaux du genre.		
— <i>Boxalli</i> . . . . .	15 "	
— <i>caudatum</i> ( <i>Selenipedium</i> ) (FLORE, VI, 99) . . . . .	20 à 50 "	
— <i>roseum</i> ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .	50 "	
— <i>concolor</i> (FLORE, XXII, 107). . . . .	30 "	
— <i>Dayanum</i> (FLORE, XV, 55). . . . .	40 "	
Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.		
— <i>Dominianum</i> . . . . .	50 "	
— <i>Harrisianum</i> (FLORE, XXII, 33) . . . . .	20 à 75 "	
— <i>Hartwegii</i> . . . . .	20 "	
— <i>hirsutissimum</i> (FLORE, XV, 97) . . . . .	20 à 35 "	
— <i>Hookeræ</i> (FLORE, XV, 125) . . . . .	10 à 25 "	

	Fr. C.
<b>Cypripedium insigne</b> . . . . .	2 à 5 "
<i>fort</i> . . . . .	25 "
— — <b>Chantini</b> ( <i>violaceum punctatum</i> ) . . . . .	25 à 50 "
— — <b>Maulei</b> (FLORE, XV, 123) . . . . .	5 à 15 "
Magnifique variété dont le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.	
— <b>javanicum</b> (FLORE, VII, 165) . . . . .	15 à 25 "
— <b>laevigatum</b> (FLORE, XVII, 83) . . . . .	50 à 75 "
— <b>Lawrenceanum</b> (FLORE, XXIII, 5) . . . . .	40 à 75 "
Nouveau <i>Sabot de Vénus</i> tout à fait distinct, très-florifère, à fleurs de coloris très-diversifiés.	
— <b>longifolium</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>Lowi</b> (FLORE, IV, 375) . . . . .	50 "
— <b>niveum</b> . . . . .	20 "
— <b>Parishi</b> . . . . .	30 à 100 "
— <b>Pearcei</b> ( <i>Selenipedium</i> ) (FLORE, XVI, 73). . . . .	10 à 25 "
— <b>purpuratum</b> (FLORE, XI, 173) . . . . .	20 à 30 "
— <b>Roezlii</b> . . . . .	25 à 75 "
— <b>Stonei</b> (FLORE, XVIII, 137). . . . .	20 "
— <b>venustum</b> . . . . .	5 à 10 "
— <b>vevillarium</b> . . . . .	100 "
Espèce à grande fleur de brillant effet, l'une des plus jolies du genre.	
— <b>villosum</b> (FLORE, XVI, 223). . . . .	15 à 25 "
Ses fleurs sont les plus grandes du genre; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.	
— <b>vitatum</b> ( <i>Selenipedium</i> ) . . . . .	20 à 35 "
Les <i>Cypripedium</i> sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée; quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois marbré, maculé, etc. Les <i>Sabots de Vénus</i> méritent donc, à tous égards, la prédilection que leur témoignent les amateurs.	
<b>Cyrtopodium flavum</b> . . . . .	15 "
<b>Dendrobium aggregatum</b> . . . . .	20 à 30 "
— <b>albo-sanguineum</b> (FLORE, VII, 209) . . . . .	25 "
— <b>bigibbum</b> (FLORE, XI, 141) . . . . .	25 "
— <b>Calceolaria</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>Cambridgeanum</b> . . . . .	20 à 30 "
— <b>chrysanthum</b> . . . . .	15 "
— <b>chrysotoxum</b> . . . . .	20 "
— <b>cretaceum</b> (FLORE, VIII, 187). . . . .	20 "
— <b>Dalhousieanum</b> (FLORE, VII, 147). . . . .	25 "
— <b>densiflorum</b> (FLORE, XIV, 5) . . . . .	15 à 50 "
— <b>Devonianum</b> (FLORE, VII, 1). . . . .	15 à 25 "
— <b>Farmeri</b> (FLORE, VII, 267). . . . .	20 à 40 "
— <b>fimbriatum</b> . . . . .	10 à 15 "
— <b>formosum giganteum</b> (FLORE, XVI, 45) . . . . .	15 à 35 "
Fleurs grandes, blanches, à macule jaune, d'une durée de plus de deux mois.	
— <b>Hilli</b> . . . . .	15 "
— <b>lituiflorum</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>Lowi</b> . . . . .	25 "
— <b>marmoratum</b> . . . . .	10 à 25 "
— <b>nobile</b> . . . . .	10 à 15 "
— <b>nodatum</b> (FLORE, XV, 155) . . . . .	10 à 20 "
— <b>Paxtoni</b> (FLORE, VII, 217) . . . . .	15 à 20 "
— <b>Pierardi</b> . . . . .	10 "

	Fr. C.
<b>Dendrobium primulinum</b> . . . . .	25 "
— <b>Ruckerianum</b> . . . . .	20 "
— <b>speciosum</b> . . . . .	20 à 30 "
— <b>taurinum</b> (FLORE, XVIII, 133) . . . . .	20 à 35 "
— <b>thyrsoflorum</b> . . . . .	15 "
— <b>transparens</b> . . . . .	15 "
<b>Dendrochilum filiforme</b> . . . . .	20 à 30 "
— <b>glumaceum</b> . . . . .	10 "
<b>Disa grandiflora</b> (FLORE, II, 160). . . . .	10 à 25 "
<b>Epidendrum atropurpureum</b> ( <i>macrochilum roseum</i> ) (FLORE, IV, 372) . . . . .	30 "
— <b>aurantiacum</b> . . . . .	15 "
— <b>bifidum</b> . . . . .	15 "
— <b>ciliare</b> . . . . .	10 à 15 "
— <b>cinnabarinum</b> . . . . .	15 "
— <b>cochleatum</b> . . . . .	10 "
— <b>dichromum</b> . . . . .	15 "
— <b>fragrans</b> . . . . .	10 "
— <b>leopardinum</b> . . . . .	25 à 40 "
— <b>macrochilum</b> . . . . .	25 "
— <b>roseum</b> (FLORE, IV, 372). . . . .	30 "
— <b>nemorale</b> . . . . .	15 "
— <b>odoratissimum</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>prismatocarpum</b> . . . . .	25 "
— <b>venosum</b> . . . . .	10 "
— <b>verrucosum</b> . . . . .	15 "
— <b>vitellinum majus</b> . . . . .	15 à 25 "
Variété très-florifère, à fleur orange et jaune, beaucoup plus grande que celle du type.	
<b>Galeandra Baueri</b> . . . . .	40 "
<b>Gongora atropurpurea</b> . . . . .	15 "
— <b>bufonia</b> . . . . .	10 "
<b>Grammatophyllum Ellisii</b> (FLORE, XIV, 257) . . . . .	75 à 150 "
— <b>multiflorum</b> . . . . .	50 "
— <b>speciosum</b> (FLORE, XIII, 177), <i>fort</i> . . . . .	150 "
<b>Habenaria maxima kircudensis</b> . . . . .	35 "
<b>Houlletia Brocklehurstiana</b> . . . . .	15 à 25 "
<b>Huntleya alba violacea</b> . . . . .	30 "
<b>Ionopsis paniculata</b> . . . . .	15 à 25 "
<b>Lælia acuminata</b> (FLORE, I, 51) . . . . .	15 "
— <b>anceps</b> . . . . .	20 "
— <b>autumnalis</b> . . . . .	10 à 25 "
— <b>atro-rubens</b> . . . . .	75 à 150 "
— <b>cinnabarina</b> . . . . .	15 "
— <b>crispa</b> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .	15 à 50 "
— <b>Dayana</b> . . . . .	30 "
— <b>elegans</b> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .	60 "
— <b>erubescens</b> . . . . .	25 "
— <b>majalis</b> . . . . .	10 "
— <b>peduncularis</b> . . . . .	15 "
— <b>Perrini</b> ( <i>Cattleya</i> ) . . . . .	10 à 75 "
Très-belle espèce à grandes fleurs d'un pourpre clair.	
— <b>præstans</b> ( <i>Cattleya</i> ) (FLORE, XVIII, 127) . . . . .	25 à 50 "
— <b>purpurata</b> ( <i>Cattleya</i> ) (FLORE, XI, 133) . . . . .	15 à 75 "
— <b>superbiens</b> (FLORE, XI, 209) . . . . .	25 à 60 "
Noblesse de port, élégance de forme, éclat des couleurs, cette Orchidée à tout pour elle.	



	Fr. C.
<i>Leptotes bicolor</i> . . . . .	15 "
<i>Limatodes rosea</i> (FLORE, XXII, 43) . . . . .	15 "
<i>Liparis elegantissima</i> . . . . .	25 "
<i>Lycaste aromatica</i> . . . . .	.8 à 15 "
— <i>balsamea</i> ? . . . . .	15 "
Espèce à très-grandes fleurs jaunes.	
— <i>cruenta</i> . . . . .	15 "
— <i>gigantea</i> . . . . .	15 à 30 "
— <i>Harrisoni</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>macrophylla</i> . . . . .	20 "
— <i>Skinneri</i> (FLORE, IV, 303-4) . . . . .	15 à 25 "
— <i>xytriophora</i> . . . . .	15 "
<i>Masdevallia amabilis</i> . . . . .	25 "
— <i>bella</i> . . . . .	50 à 75 "
— <i>Benedicti</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>Bonplandi</i> . . . . .	20 "
— <i>Bruchmülleri</i> . . . . .	10 à 20 "
— <i>caudata</i> . . . . .	10 "
— <i>Chimæra</i> . . . . .	50 à 75 "
— <i>civilis</i> . . . . .	10 "
— <i>coriacea</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>cucullata</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>Harryana</i> (FLORE, XXI, 155) . . . . .	15 à 25 "
— <i>Van Houttei</i> . . . . .	100 "
— <i>Houtteana</i> (FLORE, XX, 87) . . . . .	30 "
— <i>ignea</i> . . . . .	15 à 30 "
— <i>major</i> . . . . .	40 "
— <i>superba</i> . . . . .	60 "
— <i>infracta</i> (FLORE, XXIII, 43) . . . . .	15 à 25 "
— <i>Lindeni</i> . . . . .	20 à 40 "
— <i>Cannarti</i> . . . . .	100 "
Espèce à très-grandes fleurs, mais de même coloris que le <i>Lindeni</i> .	
— <i>maculata</i> (FLORE, XXI, 11) . . . . .	15 à 30 "
— <i>melanopoda</i> . . . . .	20 "
— <i>ochtodes</i> . . . . .	10 à 25 "
— <i>Peristeria</i> (FLORE, XXII, 171) . . . . .	25 "
— <i>polysticta</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>tovarensis</i> . . . . .	15 à 50 "
— <i>Trochilus</i> . . . . .	60 "
— <i>Veitchiana</i> (FLORE, XVII, 155) . . . . .	35 à 50 "
Les <i>Masdevallia</i> fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs, carmin cramoisi chez le <i>Harryana</i> et le <i>Lindeni</i> , écarlate ou orange chez le <i>coccinea</i> , l' <i>ignea</i> et le <i>Veitchiana</i> , ou bien tigrées, ponctuées, etc., comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.	
<i>Maxillaria cinnabarina</i> . . . . .	20 "
— <i>grandiflora</i> . . . . .	10 "
— <i>Lehmanni</i> . . . . .	25 "
— <i>leontoglossa</i> . . . . .	15 "
— <i>species</i> . . . . .	15 "
— <i>picta</i> . . . . .	10 "
— <i>venusta superba</i> . . . . .	15 à 25 "
Grandes fleurs blanches, à odeur suave.	
<i>Mesospidium sanguineum</i> . . . . .	15 à 25 "
Fleurs d'un beau rouge vif.	
— <i>vulcanicum</i> . . . . .	15 "
<i>Miltonia bicolor</i> . . . . .	10 "
— <i>Clowesi</i> . . . . .	15 à 25 "
Très-belles fleurs tricolores.	

	Fr. C.
<i>Miltonia flavescens</i> . . . . .	10 "
— <i>Moreliana</i> . . . . .	20 à 35 "
— <i>Regnelli</i> . . . . .	20 "
— <i>Russelliana</i> . . . . .	15 "
— <i>spectabilis</i> . . . . .	10 à 20 "
— <i>stellata</i> . . . . .	15 "
— <i>virginalis</i> . . . . .	10 "
— <i>Warszewiczi</i> ( <i>Oncidium fuscatum</i> ) (FLORE, XVIII, 23) . . . . .	15 à 25 "
<i>Mormodes luxatum</i> . . . . .	30 à 50 "
— <i>pardinum</i> . . . . .	20 "
<i>Odontoglossum Alexandræ</i> ( <i>Bluntii</i> ) . . . . .	15 à 40 "
— <i>Lehmanni</i> . . . . .	20 "
Grandes fleurs blanches mouchetées de carmin.	
— <i>angustatum</i> . . . . .	75 "
— <i>bictoniense</i> (FLORE, XV, 3) . . . . .	15 à 20 "
— <i>Cervantesi</i> . . . . .	10 à 25 "
— <i>cirrhosum</i> . . . . .	10 à 20 "
— <i>citrosimum</i> (FLORE, VI, 307) . . . . .	15 à 25 "
— <i>roseum</i> . . . . .	15 à 30 "
— <i>cordatum</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>coronarium</i> . . . . .	35 "
— <i>cristatum</i> . . . . .	20 à 40 "
— <i>crocidipterum</i> . . . . .	25 "
— <i>Dawsonianum</i> . . . . .	15 à 30 "
— <i>Egertoni</i> . . . . .	15 "
— <i>Ehrenbergi</i> (FL., VIII, 263) . . . . .	10 à 15 "
Coquette espèce très-florifère, à labelle blanc pur.	
— <i>grande</i> (FLORE, I, 125) . . . . .	.8 à 15 "
— <i>Halli</i> . . . . .	25 "
— <i>leucoglossum</i> . . . . .	20 "
— <i>xanthoglossum</i> . . . . .	20 "
— <i>hastatum</i> . . . . .	15 "
— <i>hastilabium</i> . . . . .	25 "
— <i>Insleayi</i> (FLORE, I, 243) . . . . .	10 à 25 "
— <i>Klabochianum</i> . . . . .	15 "
— <i>leopardinum</i> . . . . .	15 "
— <i>Lindleyanum</i> . . . . .	30 "
— <i>Londesboroughianum</i> . . . . .	25 à 60 "
— <i>luteo-purpureum</i> . . . . .	35 "
— <i>maculatum</i> . . . . .	25 "
— <i>superbum</i> . . . . .	15 "
— <i>madrense</i> . . . . .	15 "
— <i>membranaceum</i> . . . . .	15 "
— <i>nevium</i> (FLORE, VI, 191) . . . . .	50 "
— <i>nebulosum</i> . . . . .	15 "
— <i>Pescatorei</i> (FLORE, XVI, 23) . . . . .	25 à 40 "
— <i>Phalænopsis</i> . . . . .	20 "
— <i>pulchellum grandiflorum</i> . . . . .	15 "
— <i>recurvum</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>Roezlii</i> . . . . .	25 à 50 "
— <i>album</i> . . . . .	25 à 50 "
— <i>roseum</i> . . . . .	40 à 60 "
— <i>Rossii majus</i> (FLORE, XXI, 95) . . . . .	15 "
— <i>Schlipperianum</i> . . . . .	20 "
— <i>superbiens</i> . . . . .	15 "
— <i>triumphans</i> . . . . .	20 "
Belle espèce à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.	

	Fr. C.
<b>Odontoglossum Uro-Skinneri</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>vexillarium</b> (FLORE, XX, 27) 25 à 100 "	
Une des plus jolies Orchidées introduites dans ces derniers temps. Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre.	
— — <b>Lehmanni</b> . . . . .	25 "
<b>Oncidium altissimum</b> . . . . .	10 à 25 "
— <b>ampliatum majus</b> (FLORE, XX, 147) . . . . .	20 à 75 "
— <b>andigenum</b> . . . . .	20 à 30 "
— <b>anomalum</b> . . . . .	15 "
— <b>aurosom</b> . . . . .	20 à 35 "
— <b>Batemanii</b> . . . . .	15 "
— <b>bifolium majus</b> . . . . .	20 à 30 "
— <b>caesium</b> . . . . .	15 "
— <b>Cavendishianum</b> . . . . .	20 à 30 "
— <b>crispum</b> (FLORE, XXI, 7). . . . .	15 "
— <b>cucullatum</b> (FLORE, VIII, 235) 20 à 35 "	
— <b>divaricatum</b> . . . . .	15 à 30 "
— <b>flexuosum</b> . . . . .	10 à 30 "
— <b>Forbesi</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>fuscatum</b> ( <i>Miltonia Warszewiczii</i> ) (FLORE, XVIII, 23) . . . . .	15 à 25 "
— <b>Harrisoni</b> . . . . .	15 "
— <b>hians</b> . . . . .	15 "
— <b>Kramerianum</b> (FL., XIX, 41) 20 à 30 "	
— <b>Lanceanum</b> (FLORE, XVIII, 37) 20 à 30 "	
— <b>leopardinum</b> . . . . .	15 "
— <b>macranthum</b> . . . . .	60 "
— <b>Marshallianum</b> . . . . .	15 "
— <b>ornithorrhynchum</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>Papilio majus</b> (FLORE, IX, 165). . . . .	20 "
— <b>prætextum</b> . . . . .	15 "
— <b>pubes</b> . . . . .	10 "
— <b>pulvinatum</b> . . . . .	15 à 35 "
— <b>ramosum</b> . . . . .	15 "
— <b>sarcodes</b> . . . . .	20 à 40 "
— <b>serratum</b> . . . . .	15 à 35 "
— <b>sphacelatum</b> . . . . .	10 à 35 "
— <b>splendidum</b> (FLORE, XVIII, 11) . . . . .	" "
— <b>stelligerum</b> . . . . .	10 à 20 "
— <b>textum</b> . . . . .	15 "
— <b>tigrinum</b> ( <i>Barkeri</i> ) . . . . .	15 à 30 "
Grandes fleurs à labelle jaune vif, à odeur suave.	
— <b>Uncia</b> . . . . .	10 "
— <b>unicolor</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>Wentworthianum</b> . . . . .	15 "
<b>Palumbina candida</b> . . . . .	15 "
<b>Paphinia Saundersiana</b> . . . . .	20 "
<b>Peristeria elata</b> . . . . .	25 à 40 "
<b>Pescatorea cerina</b> ( <i>Zygopetalum cerinum</i> ) (FLORE, XVII, 177) . . . . .	40 à 60 "
— <b>Dayana splendens</b> . . . . .	100 "
— <b>Klabochiana</b> . . . . .	30 "
— <b>Lehmanni</b> . . . . .	40 "
— <b>Roezlii</b> . . . . .	25 "
<b>Phajus grandiflorus</b> . . . . .	15 à 15 "
Hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs.	
— <b>maculatus</b> . . . . .	15 "

	Fr. C.
<b>Phajus Woodfordi</b> . . . . .	10 à 15 "
<b>Phalænopsis amabilis</b> (FL., I, 201) 60 à 100 "	
— <b>Cornu cervi</b> . . . . .	50 à 75 "
— <b>equestris</b> ( <i>rosea</i> ) . . . . .	75 "
— <b>grandiflora</b> . . . . .	20 à 35 "
— <b>Hookeri</b> . . . . .	30 "
— <b>Lowi</b> (FLORE, XVIII, 143) . . . . .	" "
— <b>Luddemanniana</b> (FL., XVI, 53) 35 à 75 "	
— <b>Schilleriana</b> (FL., XV, 115). 50 à 100 "	
Les <i>Phalænopsis</i> sont les perles des Orchidées. L' <i>amabilis</i> et le <i>grandiflora</i> (blancs), et le <i>Schilleriana</i> (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.	
<b>Pholidota imbricata</b> . . . . .	10 "
<b>Pilumna laxa</b> ( <i>Trichopilia</i> ) . . . . .	15 "
— <b>nobilis</b> . . . . .	10 "
<b>Pleione Hookeriana</b> . . . . .	25 "
— <b>humilis</b> . . . . .	25 "
— <b>lagenaria</b> ( <i>Cælogyne</i> ) (FL., XXIII, 37) 10 "	
— <b>maculata</b> . . . . .	10 "
— <b>Wallichiana</b> . . . . .	15 à 25 "
Les <i>Pleione</i> sont des Orchidées de petite taille, mais à grandes fleurs. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le <i>P. lagenaria</i> .	
<b>Promenaea stapelioides</b> . . . . .	15 "
— <b>xanthina</b> . . . . .	20 "
<b>Renanthera Lowi</b> ( <i>Vanda</i> ) (FLORE, XXI, 163) . . . . .	400 "
<b>Restrepia antennifera</b> . . . . .	25 "
— <b>elegans</b> (FLORE, VII, 271) . . . . .	30 à 50 "
<b>Saccolabium ampullaceum</b> . . . . .	25 "
— <b>Blumei</b> . . . . .	15 à 30 "
— <b>majus</b> . . . . .	50 "
— <b>Warneri</b> . . . . .	50 "
— <b>curvifolium</b> . . . . .	20 "
— <b>giganteum</b> ( <i>Vanda densiflora</i> ), (FLORE, XVII, 89) . . . . .	50 "
Magnifique espèce à forte tige garnie de grandes fleurs.	
— <b>guttatum</b> . . . . .	50 "
— <b>retusum</b> (FLORE, XIV, 190). . . . .	50 "
<b>Schomburgkia species</b> . . . . .	15 "
<b>Scuticaria Steelii</b> . . . . .	15 à 25 "
<b>Selenipedium caudatum</b> (FL., VI, 99) 20 à 50 "	
— <b>roseum</b> . . . . .	50 "
— <b>Pearcei</b> (FLORE, XVI, 73). . . . .	10 à 25 "
— <b>vittatum</b> . . . . .	20 à 35 "
<b>Sigmatostalix radicans</b> . . . . .	10 à 20 "
<b>Sobralia macrantha</b> (FLORE, VII, 69). . . . .	40 "
<b>Sophrontitis cernua</b> . . . . .	10 "
— <b>coccinea</b> (FLORE, XVII, 7) . . . . .	15 "
Espèce d'un port nain, à grandes fleurs d'un rouge vif.	
— <b>grandiflora</b> (FLORE, I, 48) . . . . .	10 "
— <b>violacea</b> . . . . .	10 "
<b>Stanhopaea aurea punctatissima</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>Barkeri</b> . . . . .	15 "
— <b>bicolor</b> . . . . .	20 "
— <b>Devoniensis</b> (FLORE, X, 17). . . . .	15 "
— <b>expansa</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>grandiflora</b> . . . . .	15 à 25 "
— <b>graveolens</b> (FLORE, II, août, pl. 1). 15 "	
— <b>guttata</b> . . . . .	10 à 15 "



	Fr. C.
<i>Stanhopea insignis</i> . . . . .	20 "
— <i>Jenischiana</i> . . . . .	15 "
— <i>Lindleyana</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>Martiana</i> (FLORE, XX, 99) . . . . .	40 "
— <i>oculata</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>saccata</i> . . . . .	10 "
— <i>tigrina</i> . . . . .	10 "
— <i>superba</i> (FLORE, VII, 191) . . . . .	15 à 25 "
<i>Thunia alba</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>macrochila</i> . . . . .	15 "
— <i>Marshalli</i> . . . . .	25 "
<i>Trichopilia coccinea</i> (FLORE, XIV, 261) . . . . .	15 "
— <i>crispa marginata</i> (FL., XVIII, 167) . . . . .	100 "
— <i>fragrans</i> . . . . .	15 à 25 "
— <i>hymenantha</i> . . . . .	20 "
— <i>laxa</i> ( <i>Pilumna</i> ) . . . . .	15 "
— <i>nobilis</i> . . . . .	10 "
— <i>picta</i> . . . . .	25 "
— <i>suavis</i> (FLORE, VIII, 20) . . . . .	10 à 25 "
— <i>tortilis</i> . . . . .	10 à 15 "

Les *Trichopilia* sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre au-dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.

<i>Uropedium Lindenii</i> (FLORE, VI, 123) . . . . .	30 à 50 "
<i>Vanda Batemani</i> (FL., XVIII, 161) . . . . .	100 à 350 "
— <i>cærulea</i> . . . . .	50 "
— <i>Cathearti</i> (FLORE, XII, 133) . . . . .	100 "
— <i>cristata</i> . . . . .	50 "

	Fr. C.
<i>Vanda densiflora</i> ( <i>Saccolabium giganteum</i> ) (FLORE, XVII, 89) . . . . .	50 "
— <i>gigantea</i> ( <i>Lindleyana</i> ) . . . . .	25 à 200 "
— <i>insignis</i> . . . . .	50 "
— <i>Lobbi</i> . . . . .	50 "
— <i>Lowii</i> ( <i>Renanthera</i> ) (FL., XXI, 163) . . . . .	400 "
— <i>Parishi</i> . . . . .	35 à 75 "
— <i>Roxburghii</i> (FLORE, II, fév., pl. II) . . . . .	25 "
— <i>suavis</i> . . . . .	35 à 75 "
— <i>teres</i> (FLORE, VI, 330) . . . . .	10 à 20 "
— <i>tricolor</i> (FLORE, VI, 329) . . . . .	20 à 100 "
— <i>aurea</i> . . . . .	40 "
<i>Vanilla aromatica</i> . . . . .	10 à 25 "
Orchidée grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres quand on en féconde artificiellement les fleurs. Les fruits de cette espèce fournissent la Vanille du commerce.	
<i>Warrea cyanea</i> . . . . .	15 "
<i>Warszewiczella discolor</i> . . . . .	15 "
— <i>marginata</i> . . . . .	40 "
<i>Zygopetalum crinitum</i> . . . . .	20 à 35 "
— <i>Gautieri</i> . . . . .	50 "
— <i>superbum</i> . . . . .	75 "
— <i>Mackayi</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>compactum</i> . . . . .	10 à 15 "
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	20 à 35 "
— <i>superbum</i> . . . . .	25 à 50 "
— <i>maxillare</i> . . . . .	10 à 20 "

Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.

## PALMIERS.

Il est inutile de faire l'éloge des PALMIERS, auxquels l'illustre Linné a appliqué, à juste titre, la dénomination de *Princes* du règne végétal, et ils le sont, en effet, aussi bien dans les abris vitrés que nous leur consacrons, que dans les forêts inter-tropicales. On sait le rang prédominant qu'ils occupent dans les serres, dont ils sont le principal ornement. Port, feuillage, etc., tout, chez eux, est admirable.

La force des exemplaires sera communiquée aux personnes qui en feront la demande.

Les Palmiers dont les noms sont précédés du signe † sont de SERRE FROIDE.

	Fr. C.
1. <i>Acanthophoenix crinita</i> ( <i>Arcca crinita</i> BORY) (FLORE, XVI, 181) . . . . .	10 à 25 "
très-forts . . . . .	300 à 500 "
Palmier d'un port gracieux, à feuillage léger, très-divisé, à revers blanc, d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui appartiennent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.	
475. <i>Acanthorrhiza aculeata</i> . . . . .	40 "
3. — <i>Warszewiczii</i> . . . . .	40 "
4. <i>Acrocomia lasiospatha</i> , forts. . . . .	35 à 100 "
6. <i>Areca alba</i> . . . . .	3 à 10 "
7. — <i>aurea</i> (FLORE, XVII, 43) . . . . .	3 à 200 "
Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.	
277. † — <i>Baueri</i> ( <i>Seaforthia robusta</i> ) . . . . .	3 à 1000 "
10. — <i>furfuracea</i> . . . . .	5 à 100 "

	Fr. C.
382. <i>Areca gracilis</i> . . . . .	25 "
12. † — <i>lutescens</i> . . . . .	2 à 100 "
13. — <i>madagascariensis</i> . . . . .	5 à 15 "
Charmant Palmier à frondes gracieuses, à stipes et à pétioles maculés de rouge.	
14. † — <i>monostachya</i> . . . . .	5 à 10 "
236. — <i>nobilis</i> ( <i>Oncosperma Van Houtteana</i> ) (FLORE, XVII, 147) . . . . .	25 "
Très-joli Palmier dont le stipe et les pétioles sont garnis d'épines rouges, et le feuillage tout laciné.	
18. — <i>rubra</i> HORT. (non BORY) . . . . .	1 à 250 "
194. † — <i>sapida</i> ( <i>Kentia</i> ) . . . . .	3 à 50 "
spécimen très-fort . . . . .	1000 "
189. — <i>speciosa</i> ( <i>Hyophorbe amaricaulis</i> ) (FLORE, XVI, 177) . . . . .	5 à 100 "

	Fr. C.		Fr. C.
191. <i>Areca Verschaffelti</i> ( <i>Hyophorbe</i> ) (FLORE, XVI, 171), <i>forts</i> . . . 5 à 500 " <i>les douze</i> . . . 40 "		359. <i>Chamædorea Warscewiczii</i> . . . 10 à 20 "	
Un des plus beaux Palmiers connus.		347. — <i>Wendlandii</i> . . . 10 à 25 "	
19. <i>Arenga obtusifolia</i> . . . 3 à 100 "		120. † <i>Chamærops excelsa</i> ( <i>Trachycarpus</i> ) (FLORE, XXII, 207) 1 à 100 "	
20. — <i>saccharifera</i> . . . 3 à 300 "		122. † — <i>humilis</i> . . . 1 à 200 "	
22. <i>Astrocaryum Ayri</i> . . . .50 "		124. † — <i>Martiana</i> . . . .75 "	
26. † — <i>mexicanum</i> . . . .50 à 1200 "		410. † — <i>Palmetto</i> . . . .2 "	
Beau Palmier à frondes pinnées, blanches en dessous.		394. † — <i>Ritchiana</i> . . . .15 "	
42. <i>Attalea spectabilis</i> . . . .25 "		292. — <i>stauracantha</i> . . . .5 à 200 "	
409. <i>Bentinkia Rendah</i> . . . .5 à 10 "		131. † <i>Cocos flexuosa</i> . . . .5 à 25 "	
457. <i>Brahea Roezlii</i> . . . .10 "		449. — <i>Mariæ Reginæ</i> . . . .5 à 10 "	
Palmier d'un port magnifique, très-ornemental, à frondes en éventail, d'un vert noirâtre au-dessus, d'un blanc bleuâtre en dessous.		490. — <i>Maximiliani</i> . . . .10 "	
57. <i>Calamus adpersus</i> . . . .10 "		133. — <i>Mikaniana</i> . . . .6 à 500 "	
59. — <i>africanus</i> . . . .15 "		137. † — <i>plumosa</i> . . . .5 à 25 "	
60. — <i>ciliaris</i> . . . .20 à 60 "		138. † — <i>Ramanzoffiana</i> . . . .5 à 15 "	
481. — <i>Flagellum, fort</i> . . . .200 "		139. — <i>schizophylla, très-fort</i> . . .200 "	
62. — <i>Getah</i> . . . .10 à 75 "		142. — <i>Weddelliana, forts</i> . . .2 à 25 "	
383. — <i>Hystrix</i> . . . .10 à 25 "		<i>les douze</i> . . .18 à 40 "	
389. — <i>javanensis</i> . . . .25 "		Charmant Palmier d'une légèreté extrême et d'une rare élégance.	
67. — <i>niger</i> . . . .10 à 100 "		207. † <i>Corypha australis</i> ( <i>Livistona</i> ) 1 à 50 "	
393. — <i>sumatranus</i> . . . .10 à 25 "		<i>très-forts</i> .100 à 150 "	
478. <i>Calyptroglyne spicata</i> . . . .10 à 35 "		491. — — <i>robusta</i> . . . .200 "	
479. <i>Calyptronoma Swartzii</i> . . . .25 "		440. — <i>elata</i> . . . .10 "	
74. <i>Carludovica atrovirens</i> . . . .8 à 15 "		429. † — <i>filifera</i> . . . .25 à 50 "	
76. — <i>humilis</i> . . . .25 à 200 "		144. — <i>macroglossa (spinosa)</i> . . .10 "	
326. — <i>macropoda</i> . . . .15 à 100 "		147. <i>Dæmonorops fissus</i> . . . .10 à 25 "	
78. — <i>microcephala</i> . . . .4 à 15 "		150. — <i>latispinus</i> . . . .10 à 25 "	
79. — <i>palmata</i> . . . .8 à 25 "		385. — <i>Lewisianus</i> . . . .10 à 25 "	
327. — <i>Sartori</i> . . . .10 à 75 "		152. — <i>melanocheates</i> . . . .10 à 100 "	
83. <i>Caryota excelsa, fort</i> . . . .200 "		154. — <i>periacanthus</i> . . . .10 à 100 "	
84. — <i>furfuracea</i> . . . .3 à 500 "		156. — <i>trichrous</i> . . . .10 à 25 "	
88. — <i>sobolifera</i> . . . .5 à 200 "		<i>fort</i> . . . .200 "	
90. — <i>urens, forts</i> . . . .3 à 100 "		411. <i>Dypsis madagascariensis</i> . . .5 à 10 "	
92. <i>Ceroxylon andicola</i> . . . .25 à 40 "		482. — <i>species</i> . . . .10 "	
94. — <i>niveum</i> . . . .15 à 125 "		161. <i>Elæis guineensis macrocarpa,</i> <i>très-forts</i> .300 à 500 "	
<i>très-fort</i> . . . .500 "		164. <i>Euterpe edulis</i> . . . .2 à 75 "	
96. † <i>Chamædorea amazonica</i> . . .15 à 75 "		242. — <i>Sancona (Oreodora)</i> . . .25 à 150 "	
97. — <i>Arenbergi</i> . . . .10 à 20 "		167. <i>Gaussia princeps</i> . . . .20 "	
98. — <i>atrovirens</i> . . . .15 à 50 "		442. <i>Geonoma Carderi</i> . . . .25 "	
101. † — <i>concolor</i> . . . .10 à 30 "		216. — <i>fenestrata (Malortica simplex)</i> .20 "	
357. — <i>Deckeriana</i> . . . .10 à 20 "		172. — <i>Ghiesbreghtii, fort</i> . . . .200 "	
104. — <i>elegans</i> (FLORE, XIII, 133) 5 à 40 "		416. — <i>gracilis</i> . . . .5 à 25 "	
105. — <i>Ernesti-Augusti</i> (FLORE, XIII, 123) . . .10 à 50 "		Palmier très-élégant, d'un beau port.	
Palmier d'une grande élégance, dont la tige cylindrique, verte, est entrecoupée de nœuds comme un Bambou.		476. — — <i>major</i> . . . .15 à 25 "	
108. — <i>fragrans</i> . . . .50 "		178. — <i>Pohlina</i> . . . .10 "	
343. — <i>geonomæformis</i> . . . .10 à 20 "		451. — <i>princeps</i> . . . .10 à 25 "	
358. — <i>gracilis</i> . . . .15 "		180. — <i>pumila, fort</i> . . . .200 "	
311. — <i>graminifolia</i> . . . .15 "		181. — <i>Schottiana</i> . . . .10 à 40 "	
112. † — <i>lunata</i> . . . .10 à 75 "		462. — <i>Seemannii</i> . . . .20 "	
364. — <i>Martiana</i> . . . .10 à 40 "		Magnifique Palmier à feuilles solides, dont les jeunes frondes sont rouges.	
115. — <i>pygmæa</i> . . . .15 "		378. — <i>Spixiana</i> . . . .15 à 30 "	
116. — <i>Sartori</i> . . . .5 à 35 "		396. <i>Glaziova insignis</i> . . . .6 à 15 "	
117. — <i>Schiedeana</i> . . . .10 à 25 "		189. <i>Hyophorbe amaricaulis (Areca speciosa)</i> (FLORE, XVI, 177). 5 à 100 "	
444. — <i>Wallis</i> . . . .10 à 25 "		456. — <i>borbonica</i> . . . .40 "	
		190. — <i>indica</i> (FLORE, XVI, 105), <i>fort</i> . 40 "	



## Fr. C.

191. *Hyophorbe Verschaffelti* (Areca)  
(FLORE, XVI, 171), *forts* 5 à 500 "  
    *les douze* . . . 40 "  
447. *Iriartea* Van Houttei . . . 40 "  
227. † *Jubæa spectabilis* . . . 5 à 40 "  
    *très-fort* . . . 500 "  
368. † *Kentia australis* . . . 15 à 200 "  
365. † — *Balmoreana* . . . 15 à 200 "  
366. — *Canterburyana* . . . 15 "  
367. † — *Forsteriana* . . . 15 à 500 "  
452. † — *gracilis* . . . 50 à 100 "  
453. † — *Lindenii* . . . 125 "  
473. — *Macarthurii* . . . 25 "  
Très-élégant Palmier à feuilles sub-érigées, mi-retombantes, d'un beau vert gai, d'un charme inexprimable.  
194. † — *sapida* (Areca) . . . 3 à 50 "  
    *spécimen très-fort* . 1000 "  
461. — *Van Houttei* . . . 150 à 500 "  
460. — *Wendlandii* . . . 60 "  
195. *Korthalsia debilis* . . . 15 "  
198. *Latania aurea* (Verschaffelti) . . . 8 "  
    *les douze* . . . 50 "  
213. † — *borbonica* (*Livistona sinensis*) . . . 1 à 75 "  
    *forts* . . . 300 à 500 "  
487. — *Commersonii* . . . 15 "  
199. — *Loddigesi* (*glaucochylla*) 15 à 200 "  
203. *Licuala elegans, forts* . . . 10 à 200 "  
492. — *grandis* (*Pritchardia*) . . . 125 "  
Palmier nouveau de tout premier ordre, d'un port superbe, d'une élégance de feuillage sans pareille.  
204. — *peltata* . . . 10 à 25 "  
205. — *spinosa* . . . 10 "  
206. *Livistona altissima* (FLORE, XVII, 51). . . 10 à 500 "  
207. † — *australis* (*Corypha*) . . . 1 à 50 "  
    *très-forts* . 100 à 150 "  
208. † — *Hoogendorpi* . . . 3 à 25 "  
    *les douze* . 30 à 50 "  
209. † — *humilis* . . . 2 à 5 "  
210. — *Jenkinsii, fort* . . . 500 "  
380. — *mauritiana* . . . 2 à 25 "  
213. † — *sinensis* (*Latania borbonica*) 1 à 75 "  
    *forts* . . . 300 à 500 "  
214. — *subglobosa* . . . 15 "  
216. *Malortiea simplex* (*Geonoma fenestrata*) . . . 20 "  
219. *Martinezia caryotaefolia* . 10 à 200 "  
225. *Maximiliana regia* . . . 30 "  
227. † *Micrococos chilensis* . . . 5 à 40 "  
    *spécimen très-fort* . . 500 "  
228. † *Morenia corallina* . . . 10 à 20 "  
443. — *Van Houttei, très-forts* 15 à 30 "  
445. — *Wendlandii, très-forts* . 15 à 30 "  
236. *Oncosperma Van Houtteana* (Areca *nobilis*) (FLORE, XVII, 147) . . 25 "  
241. *Oreodoxa regia* . . . 5 à 150 "  
242. — *Sancona* (*Euterpe*) . . . 25 à 150 "

## Fr. C.

243. *Phœnicophorium Sechellarum* (Stevensonia *grandiflora*) (FLORE, XV, 177) . . . 10 à 25 "  
    *spécimen très-fort* . . . 600 "  
L'un des Palmiers les plus beaux et les plus majestueux par son feuillage grandiose; pétioles courts, d'un jaune chamois, garnis de longues épines droites, aplaties, d'un noir jais; feuilles gigantesques, plissées, tout d'une pièce, cunéiformes-obovales, s'élargissant de la base jusqu'au sommet, qui est obtus et divisé en deux lobes séparés par une longue échancrure.  
336. † *Phœnix acaulis* . . . 4 à 10 "  
246. † — *farinifera* . . . 2 à 5 "  
247. — *humilis* . . . 4 "  
249. † — *leonensis* . . . 10 à 25 "  
397. † — *paludosa* . . . 5 à 10 "  
249. — *pumila* . . . 4 "  
250. † — *reclinata* . . . 2 à 40 "  
    *fort* . . . 100 "  
Excellent Palmier pour appartement.  
470. — *rupicola* . . . 5 à 10 "  
488. — *spinosa* . . . 4 "  
251. † — *sylvestris* . . . 2 à 10 "  
Palmier d'une extrême élégance.  
252. † — *tenuis* . . . 3 à 50 "  
387. *Pinanga Kuhlei alba* . . . 200 "  
256. — *latisecta* . . . 150 "  
463. *Plectocomia elongata* . . . 40 "  
471. — *species* . . . 25 "  
464. *Pritchardia aurea* . . . 50 à 75 "  
441. † — *filifera* . . . 4 à 40 "  
492. — *grandis* (*Licuala*) . . . 125 "  
418. — *macrocarpa* . . . 50 "  
Palmier très-robuste, décoratif au dernier point et l'un des plus beaux de cette magnifique famille.  
211. — *pacifica* (Fl., XXII, 1) 400 à 1000 "  
263. *Ptychosperma Alexandræ* . . 3 à 10 "  
425. — *rupicola* . . . 30 à 50 "  
489. — *Seemanni* . . . 25 "  
469. † *Ravenea Hildebrandtii* . . . 50 "  
Palmier de serre froide, très-nain, introduit récemment de l'île Johanna, à l'est de Madagascar.  
267. *Rhapis flabelliformis* . . . 5 à 300 "  
268. † — *foliis variegatis* . . . 150 "  
270. † *Sabal Adansonii* . . . 2 "  
465. † — *havanensis* . . . 2 à 5 "  
415. † — *longipedunculata* . . . 10 "  
274. † — *Mocini* . . . 2 "  
275. † — *princeps* . . . 2 "  
325. † — *umbraculifera* . . . 5 "  
225. † *Scheelia regia* . . . 30 "  
276. † *Seaforthia elegans* . . . 2 à 25 "  
277. † — *robusta* (Areca *Baueri*) 3 à 1000 "  
Les *Seaforthia* sont de superbes Palmiers de serre froide, à grandes frondes pinnées.  
Stevensonia, voir *Phœnicophorium*.  
279. *Thrinax argentea* . . . 250 "  
280. — *elegans, forts* . . . 5 à 500 "  
401. — *elegantissima* . . . 50 à 150 "  
284. — *grandis* . . . 30 à 250 "  
287. — *parviflora* . . . 2 à 50 "

	Fr. C.		Fr. C.
289. <i>Thrinax</i> Robini . . . . .	.300 "	299. <i>Wallichia</i> oblongifolia . . .	40 à 150 "
293. † <i>Trithrinax</i> mauritiæformis .	.5 à 10 "	300. — Orani . . . . .	10 à 25 "
366. † <i>Veitchia</i> Canterburyana . .	.15 "	301. — porphyrocarpa . . .	20 à 100 "
295. <i>Verschaffeltia</i> melanochaetes .	25 à 40 "	Palmier à stipes et à pétioles couverts de forts aiguillons.	
296. — splendida (FLORE, XV, 181)	15 à 40 "	331. <i>Zalacca</i> edulis . . . . .	35 à 50 "

## PANDANÉES.

Plantes très-ornementales, d'un port pittoresque, à tige forte, rameuse au sommet, à nombreuses longues feuilles, ordinairement rapprochées au point de s'imbriquer, quelquefois pennées ou palmatifides.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Pandanus</i> amaryllidifolius . . .	.5 à 15 "	10. <i>Pandanus</i> Pancheri . . . . .	15 à 200 "
4. — cuspidatus, très-forts . . .	.5 à 50 "	17. — pygmæus . . . . .	.5 "
7. — furcatus . . . . .	.50 à 100 "	18. — reflexus . . . . .	20 à 75 "
9. — graminifolius . . . . .	4 "	25. — utilis . . . . .	1 à 100 "
11. — javanicus foliis variegatis . .	5 "	26. — Van der Meersch. . . . .	5 "
15. — ornatus . . . . .	6 "	les douze . . . . .	
les douze . . . . .	.60 "	29. — Van Houttei . . . . .	50 à 150 "
spécimen très-fort . . . . .	.300 "	27. — Veitchi . . . . .	5 à 100 "

## PASSIFLORÉES.

Plantes grimpantes pourvues de vrilles qui leur permettent de s'attacher aux murs, colonnettes, treillis, etc., à fleurs charmantes et du plus gracieux effet.

	Fr. C.		Fr. C.
4. <i>Passiflora</i> alata . . . . .	2 "	77. <i>Passiflora</i> hybrida Arc-en-ciel . .	2 "
6. — amabilis . . . . .	2 "	30. — — <i>Impératrice Eugénie</i> . . .	2 "
80. — annularis . . . . .	3 "	54. — ignea ( <i>Tacsonia</i> ) . . . . .	2 "
11. — Bonapartei . . . . .	2 "	75. — insignis ( <i>Tacsonia</i> ) . . . . .	3 "
53. — Buchanani ( <i>Tacsonia</i> ). . . .	2 "	69. — Junesi . . . . .	2 "
79. — — foliis aureo-maculatis . .	5 "	31. — kermesina . . . . .	2 "
71. — cœrulea . . . . .	2 "	65. — Loudoni . . . . .	2 "
13. — cardinalis . . . . .	2 "	39. — Neumanni . . . . .	2 "
15. — cœlestina . . . . .	2 "	42. — princeps . . . . .	2 "
20. — Decaisneana . . . . .	2 "	72. — quadrangularis aucubæfolia .	3 "
22. — edulis . . . . .	2 "	47. — sanguinea ( <i>Tacsonia</i> ). . . .	2 "
60. — eriantha ( <i>Tacsonia</i> ) (FLORE, XVIII, 159) . . . . .	2 "	74. — splendens ( <i>Tacsonia</i> ) . . . .	3 "
78. — filamentosa . . . . .	2 "	58. — trifasciata . . . . .	2 "
27. — Gontieri . . . . .	2 "	59. — Van Volxemi ( <i>Tacsonia</i> ). . .	2 "

## SARRACÉNIÉES, PLANTES CARNIVORES, ETC.

Les *Sarracenia* sont des plantes singulières par leurs feuilles ou ascidies, creusées en tube ou entonnoir, avec un petit limbe simulant un couvercle; elles se plaisent dans la serre froide, et demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation; on peut les hiverner sous châssis froid. Leurs grandes fleurs solitaires sont aussi originales que belles.

	Fr. C.		Fr. C.
1. <i>Darlingtonia</i> californica (FLORE, XIV, 125) . . . . .	10 "	<i>Drosera</i> capensis . . . . .	" "
Ascidies en forme de S, vertes, avec des taches et des stries brunes sur la partie supérieure, opercule bilobé.		— dichotoma . . . . .	8 "
<i>Dionæa</i> muscipula . . . . .	5 "	— spathulata . . . . .	" "
Une des plus curieuses plantes qu'on connaisse; ses feuilles radicales en rosette ont de larges bords ciliés qui se referment brusquement, emprisonnant l'insecte qui vient se poser sur elles.		Les <i>Drosera</i> sont des plantes vivaces de marais, très-curieuses, dont les feuilles sont couvertes de cils glanduleux exsudant un suc gommeux, qui, ramassé en petits points brillants, fait paraître la plante comme chargée de rosée; les insectes qui se reposent sur ces feuilles sont retenus par la matière gluante.	



## Fr. C.

7. *Sarracenia Drummondii* alba (FLORE, VI, 81 et X, 239). . . . . 5 "  
 Grandes ascidies vertes, parsemées de taches blanches, bordées de rose sur la partie supérieure et sur l'opercule, fleurs d'un pourpre noirâtre; c'est incontestablement la plus belle espèce du genre.  
 2. — *flava* . . . . . 5 "  
 Ascidies vertes, fleurs jaunes.  
 3. — *psittacina* . . . . . 6 à 10 "  
 Ascidies d'un violet foncé sur fond blanchâtre, fleurs pourpres.

## Fr. C.

4. *Sarracenia purpurea* (FLORE, X, 247). . . . . 3 "  
 Grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé, fleurs rouges.  
 5. — *rubra* (FLORE, X, 243). . . . . 5 "  
 Longues ascidies à opercules striolés de brun acajou, fleurs rouge sang.  
 6. — *variolaris*. . . . . 8 "  
 Ascidies vertes, lavées de violet sur la partie supérieure, parsemées, sur le dos, de taches arrondies, blanches, presque transparentes, opercule violet, fleurs d'un vert jaunâtre.

## SCITAMINÉES.

Les *Scitaminées* sont de charmantes plantes décoratives, à superbes feuillages, quelques-unes, comme les *Strelitzia*, à fleurs étranges, très-grandes, d'une splendide beauté.

## Fr. C.

125. *Alpinia Bangka*. . . . . 2 "  
 126. — *calcarata*. . . . . 2 "  
 2. — *nutans* (*Globba*) . . . . . 4 "  
 3. — *sanguinolenta* . . . . . 3 "  
 116. — *vittata*. . . . . 3 à 100 "  
 Superbe plante très-décorative, à feuilles d'un beau vert, ornées de larges bandes blanches.  
 5. *Amomum Granum Paradisi*. . . . . " "  
 130. — *gracile*. . . . . 3 "  
 156. *Burbridgea nitida*. . . . . 10 à 50 "  
 7. *Costus discolor*. . . . . 3 "  
 8. — *Malortianus* (*elegans*) . . . . . 2 "  
 11. *Curcuma elata*. . . . . 1 "  
 12. — *leucorrhiza*. . . . . 1 "  
 13. — *longa*. . . . . 1 "  
 14. — *Roscoeana*. . . . . 3 "  
 Épi dressé de fleurs ornées de magnifiques bractées oranges.  
 15. — *rubricaulis*. . . . . 1 "  
 16. — *Zedoaria* (*aromatica, officinalis, Zerumbet*). . . . . 1 "  
 18. *Globba Rœzlii*. . . . . 2 "  
 17. — *saltatoria* (*Mantisia*) (FL., XX, 41) 5 "  
 Curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont blanches, et le labelle d'un beau jaune. Son nom spécifique dérive de ce que ses charmantes fleurs simulent des danseurs, qu'on fit tenu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante.  
 128. *Hedychium album*. . . . . 4 "  
 21. — *Gardnerianum*. . . . . 4 "  
 129. — *luteum*. . . . . 4 "  
 23. *Heliconia angustifolia*. . . . . 5 "  
 24. — *aurantiaca*. . . . . 2 "  
 26. — *metallica*. . . . . 5 "  
 27. — *psittacorum*. . . . . 4 "  
 28. — *pulverulenta* (*farinosa*). . . . . 3 "  
 101. — *vinosa*. . . . . 3 à 50 "  
 31. *Kämpferia Roscoeana* (FL., XIX, 117) 2 "  
 113. *Maranta amabilis*. . . . . 2 "  
 32. — *argyrea*. . . . . 3 à 100 "  
 135. — *Bachemiana*. . . . . 3 "  
 33. — *Baraquiniana*. . . . . 2 "  
 109. — *bellula*. . . . . 2 "

## Fr. C.

36. *Maranta bicolor*. . . . . 2 "  
 151. — *Binoti*. . . . . 10 "  
 34. — *chimboracensis*. . . . . 2 "  
 93. — *cinerea*. . . . . 2 "  
 35. — *coriifolia*. . . . . 3 "  
 37. — *densa*. . . . . 2 "  
 139. — *eburnea*. . . . . 3 "  
 38. — *eximia*. . . . . 3 "  
 39. — *fasciata*. . . . . 3 "  
 42. — *illustris* (FLORE, XVI, 157) 3 à 150 "  
 43. — *Jagoriana*. . . . . 2 "  
 146. — *Kegeljani*. . . . . 3 "  
 152. — *Kerchoveana*. . . . . 5 à 20 "  
 141. — *Kummeriana*. . . . . 3 à 300 "  
 44. — *Legrelleana*. . . . . 3 "  
 131. — *leopardina*. . . . . 5 "  
 136. — *Lietzei*. . . . . 5 "  
 45. — *Lindeniana*. . . . . 4 à 20 "  
 110. — *Luciana*. . . . . 3 "  
 46. — *majestica*. . . . . 5 à 10 "  
 114. — *Makoyana* (FL., XX, 15) 3 à 200 "  
 Espèce naine, très-ornementale.  
 148. — *Massangeana* (FLORE, XXII, 301) . . . . . 3 à 75 "  
 124. — *Mazeli*. . . . . 4 à 50 "  
 149. — *medio picta*. . . . . 3 à 75 "  
 119. — *micans longifolia*. . . . . 2 "  
 120. — *nigro-costata*. . . . . 4 à 25 "  
 137. — *Oppenheimiana*. . . . . 4 à 200 "  
 50. — *ornata picta* (*Van Houttei*) 4 à 50 "  
 104. — *pacifica*. . . . . 4 "  
 132. — *pinnato-picta*. . . . . 5 "  
 133. — *porphyrocaulis*. . . . . 4 "  
 52. — *Porteana*. . . . . 2 à 100 "  
 134. — *prasina*. . . . . 5 "  
 94. — *princeps*. . . . . 3 "  
 53. — *regalis* (FLORE, X, 231) . . . . . 5 "  
 54. — *roseo-picta* (FL., XVI, 127), 5 à 50 "  
 55. — *rufibarba*. . . . . 2 "  
 56. — *sanguinea*. . . . . 2 "

	Fr. C.
95. <i>Maranta setosa</i> . . . . .	2 "
96. — <i>smaragdina</i> . . . . .	6 "
57. — <i>spicata</i> . . . . .	2 "
140. — <i>tæniosa</i> . . . . .	15 "
97. — <i>truncata</i> . . . . .	3 "
59. — <i>tubispatha</i> . . . . .	5 "
118. — <i>undulata</i> . . . . .	2 "
60. — <i>Van den Hecke</i> . . . . .	.2 à 25 "
61. — <i>variegata</i> . . . . .	.2 à 50 "
62. — <i>Veitchiana</i> . . . . .	5 à 100 "
63. — <i>virginalis</i> . . . . .	.4 à 50 "
123. — <i>major</i> . . . . .	.8 à 75 "
64. — <i>vittata</i> . . . . .	5 "
98. — <i>Wagneri</i> . . . . .	3 à 175 "
65. — <i>Wallisi</i> . . . . .	2 à 200 "
111. — <i>discolor</i> . . . . .	.4 à 30 "
66. — <i>Warscewicz</i> (FL., IX, 209) .	4 à 75 "
138. — <i>Wioti</i> . . . . .	6 "
67. — <i>zebrina</i> . . . . .	3 à 300 "
12 <i>Maranta</i> en 12 sortes, à notre choix.	18 "
25 — — — — —	40 "

Les *Maranta* sont de vraies plantes d'amateur; leurs nombreuses et superbes espèces sont un des principaux ornements des serres où elles brillent par l'éclat des coloris et la diversité des formes de leur feuillage.

68. *Musa Cavendishi (sinensis)* . . . . . 8 à 25 "  
Le *Banani* de Chine.

69. — *coccinea* (FLORE, VII, 213) . . . . . 10 "  
70. — *discolor, forts* . . . . . 10 à 20 "  
71. — *Ensete* (FLORE, XVI, 65) . . . . . 5 à 25 "

Le grand *Banani*er d'Abyssinie, très-rustique, de serre tempérée ordinaire, atteint des proportions gigantesques;

ses feuilles sont d'un beau vert, avec la côte médiane d'un rouge foncé. Cette magnifique plante produit un effet très-pittoresque et très-ornemental, quand on la met l'été en plein air. Il va de soi qu'on doit la rentrer en serre, à l'approche de la mauvaise saison.

	Fr. C.
154. <i>Musa Livingstonei</i> . . . . .	25 "
<i>Banani</i> er très-rustique, excellent pour pleine terre en été.	
72. — <i>ornata</i> . . . . .	15 "
73. — <i>paradisica, forts</i> . . . . .	10 à 25 "
Le <i>Banani</i> er ordinaire.	
74. — <i>roseacea</i> . . . . .	.5 à 10 "
105. — <i>rubra</i> . . . . .	10 à 20 "
155. — <i>sanguinea</i> . . . . .	25 "
106. — <i>superba</i> . . . . .	15 à 25 "
99. — <i>violacea</i> . . . . .	10 à 20 "
77. — <i>vittata</i> (FLORE, XV, 25) . . . . .	60 "
78. — <i>zebrina</i> (FLORE, X, 223) . . . . .	15 "
81. <i>Ravenala madagascariensis</i> (FLORE, XIII, 117 et XXI, 161) .	.5 à 15 "

L'Arbre du *Voyage* dont les feuilles distiques, longuement pétioles, peuvent atteindre 3 mètres de longueur et se déploient en éventail au sommet de la tige, où elles produisent un magique effet.

84. *Strelitzia Nicolai* (FL., XIII, 121) . . . . . 50 "  
85. — *Reginæ* . . . . . 10 à 25 "

Fleurs très-belles et très-curieuses, ressemblant à quelque oiseau fantastique, renfermées dans la spathe au nombre de 8 ou 10, à sépales d'un beau jaune orangé, à pétales d'un bleu violacé.

86. — — *humilis* . . . . . 10 "  
122. — — *lancifolia* . . . . . 10 à 20 "  
56. *Stromanthe sanguinea* (FLORE, VIII, 97) . . . . . 2 "

89. *Thalia dealbata* . . . . . 2 "

## PLANTES UTILES, OFFICINALES, ETC.

	Fr. C.
or <i>Alibertia edulis</i> . . . . .	10 "
La <i>Goyave</i> noire de la Guiane.	
" <i>Anamyrta Cocculus</i> . . . . .	10 "
Son bois donne une couleur jaune; ses fruits sont très-vénéneux; séchés et réduits en poudre, ils sont insecticides.	
" <i>Anchietea salutaris</i> . . . . .	10 "
Produit un purgatif très-violent.	
† <i>Anona antioquensis</i> . . . . .	4 "
" — <i>Cherimolia</i> . . . . .	5 "
Ses fruits sont très-estimés au Péron et employés contre la dysenterie.	
" — <i>muricata</i> . . . . .	5 "
Les fleurs, les bourgeons et les fruits sont usités, aux Antilles, comme adoucissants; les fruits sont, en outre, mangés par les naturels de pays, quand ils sont bien mûrs.	
" — <i>squamosa</i> . . . . .	5 "
Le <i>Pommier-Cannelle</i> dont les fruits sont fort appréciés aux Antilles; la pulpe fournit une liqueur fermentée, assez analogue au cidre.	
or <i>Antiaris toxicaria</i> . . . . .	20 "
L' <i>Upas</i> de Java, d'où découle un suc très-vénéneux.	
† <i>Aralia papyrifera (Tetrapanax)</i> (FLORE, VII, 153) . . . . .	1 à 4 "
Arbuste dont les tiges renferment dans leur intérieur une moelle abondante, dont les Chinois fabriquent un papier très-renommé pour les gravures.	

	Fr. C.
20. <i>Arenga saccharifera</i> . . . . .	3 à 300 "
Beau Palmier à très-longues frondes allées, d'un effet original, de la sève duquel on extrait du sucre.	
or <i>Argania Sideroxylon</i> . . . . .	10 "
" <i>Artocarpus incisa</i> . . . . .	" "
Le célèbre Arbre à pain des îles de la mer du Sud.	
" — <i>rigida</i> . . . . .	" "
" <i>Ataccia pinnatifida (Tacca)</i> . . . . .	10 "
" <i>Barringtonia racemosa</i> . . . . .	10 "
" — <i>speciosa</i> . . . . .	40 "
" <i>Bixa Orellana</i> . . . . .	15 "
Plante tinctoriale produisant le <i>Rocou</i> , couleur rouge dont les indiens se peignent le corps.	
or <i>Blighia sapida</i> . . . . .	25 "
† <i>Boehmeria macrophylla</i> . . . . .	2 "
" — <i>tenacissima</i> . . . . .	2 "
" <i>Bombax Ceiba</i> . . . . .	10 "
L'Arbre à soie, dont le duvet sert à faire des chapeaux.	
" <i>Brosimum Alicastrum</i> . . . . .	10 "
or <i>Calophyllum Madruno</i> . . . . .	.5 à 25 "
" <i>Campomanesia hypoleuca</i> . . . . .	5 "
" <i>Carapa guianensis</i> . . . . .	10 "
On retire de ses graines une huile bonne à brûler, dont les naturels de la Guiane se frottent le corps et les cheveux.	



	Fr. C.
or <i>Carissa grandiflora</i> . . . . .	5 "
79. <i>Carludovica palmata</i> . . . . .	.8 à 25 "
Ses feuilles plissées en éventail, partagées en 3-5 lobes palmés, fournissent la matière des chapeaux de Panama, si remarquables par la finesse et la souplesse de leur tissu.	
" <i>Cavanillea philippensis</i> . . . . .	15 à 25 "
" <i>Cephaelis Ipecacuanha</i> . . . . .	3 "
Plante médicinale herbacée du Brésil, dont les racines jouissent de propriétés anti-dysentériques et émétiques.	
t <i>Chavica officinarum</i> . . . . .	5 "
or <i>Chlorocodon Whitei</i> . . . . .	5 "
" <i>Chrysophyllum albidum</i> . . . . .	10 "
" — <i>Cainito</i> . . . . .	10 "
" — <i>macrophyllum</i> . . . . .	20 à 300 "
Magnifiques feuilles aux revers tissés de jaune d'or.	
t <i>Cicca disticha</i> . . . . .	10 "
" 6. <i>Cinchona Calysaya</i> . . . . .	10 "
L'écorce du <i>Quinquina</i> est le fébrifuge le plus puissant que l'on connaisse.	
or <i>Cinnamomum aromaticum</i> . . . . .	.5 à 10 "
" — <i>Canella</i> . . . . .	.3 à 10 "
Ces deux espèces produisent la cannelle du commerce.	
" — <i>Kiamis</i> . . . . .	3 "
" — <i>laurifolium</i> . . . . .	.3 à 8 "
" — <i>pedunculatum</i> . . . . .	5 "
t — <i>sericeum</i> . . . . .	3 "
Le Cannelier soyeux du Japon.	
or <i>Coccoloba pubescens</i> . . . . .	20 à 75 "
L'arbre aux parasols, d'un aspect tout exotique.	
" <i>Cocculus Chondodendron</i> . . . . .	10 "
t — <i>laurifolius</i> . . . . .	.3 à 8 "
" — <i>Pluckenetii</i> . . . . .	10 "
" <i>Coffea arabica</i> . . . . .	.3 à 25 "
Le <i>Caféier</i> ordinaire à feuillage luisant, d'un vert foncé, à folioles fleurs blanches légèrement odorantes, auxquelles succèdent des baies rougeâtres.	
" — <i>angustifolia</i> . . . . .	4 "
" — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	.5 à 10 "
" — <i>liberica</i> . . . . .	2 "
le cent . . . . .	.150 "
Feuillage plus grand, plus vigoureux que celui des autres espèces; fruits plus gros, et d'un arôme plus prononcé quand ils sont torréfiés. — L'Établissement traite par correspondance pour les fortes parties de <i>Coffea liberica</i> destinées aux colonies, où il en a déjà énormément importé.	
" — <i>Moka</i> . . . . .	4 "
" — <i>myrtifolia</i> . . . . .	8 "
14. <i>Colocasia esculenta</i> . . . . .	2 "
or <i>Coniza grandiflora</i> . . . . .	5 "
" <i>Cookia punctata</i> . . . . .	15 à 25 "
Produit un fruit comestible, acide comme la groseille et dont on se sert aux Indes en guise de citron.	
" <i>Copaifera officinalis</i> . . . . .	30 "
Arbre brésilien à feuilles pennées, à fleurs blanches, donnant un produit médicinal bien connu.	
" <i>Cratæva species</i> . . . . .	10 "
Arbrisseau à foli feuillage trifoliolé, à fleurs blanches.	
t <i>Crescentaria Cujete</i> . . . . .	10 "
Le <i>Calebassier</i> dont les habitants de l'Amérique équinoxiale tirent leur vaiselle.	
" <i>Cyrtosyphonia spectabilis</i> . . . . .	10 "
" <i>Dipterix odorata</i> . . . . .	15 "
Cette espèce produit la fève odorante, dite <i>Tonka</i> ; feuilles ailées, fleurs pourpres en panicule.	

	Fr. C.
or <i>Donacodes alliacea</i> . . . . .	5 "
" <i>Dorstenia Contrayerva</i> var. <i>Riedeliana</i> . . . . .	5 "
" <i>Durio zibethinus</i> . . . . .	10 "
Le <i>Dourian</i> , l'un des meilleurs fruits des Moluques.	
t <i>Erythroxylon Coca</i> . . . . .	3 "
Plante officinale à fleurs blanches, très-recherchée des Indiens pour ses propriétés excitantes, et très-employée en médecine.	
" <i>Eugenia littoralis</i> . . . . .	3 "
" — <i>Pitanga</i> . . . . .	.2 à 10 "
" — <i>pseudocaryophylloides</i> . . . . .	.5 à 10 "
Ses feuilles ont l'odeur des clous de Girofle.	
e <i>Eupatorium Ayapana</i> . . . . .	5 "
164. <i>Euterpe edulis</i> . . . . .	.2 à 75 "
Palmier à très-grandes feuilles pennées-pectinées, produisant des fruits globuleux, d'un violet noirâtre, luisant, renfermant un liquide épais et crémeux ayant un goût de noix, et dont les naturels du Brésil font un grand usage.	
pt 8. <i>Ficus elastica</i> . . . . .	.2 à 10 "
L'une des plus belles plantes de la serre tempérée, passant l'été en pleine terre, en plein air; feuilles grandes, luisantes, d'un vert sombre; son suc laiteux produit le <i>Caoutchouc</i> .	
or <i>Garcinia Mangostana</i> (FLORE, XXII, 191). . . . .	.75 à 200 "
Le <i>Mangostan</i> dont le fruit rouge violacé est un des plus exquis des régions tropicales.	
" — <i>Livingstonei</i> . . . . .	.5 à 10 "
" <i>Geoffroya superba</i> . . . . .	10 "
" <i>Guaiacum officinale</i> . . . . .	15 "
Plante officinale, autrement dite <i>Gaiac</i> , très-employée en médecine comme sudorifique; feuilles ailées, fleurs bleues en éti.	
" <i>Guilandina Bonducella</i> . . . . .	10 "
Légumineuse vulgairement nommée <i>Bonduc</i> .	
" <i>Heritiera littoralis</i> . . . . .	5 "
Feuilles ovales, blanchâtres en-dessous; fleurs petites, rouges, en panicule axillaire.	
" <i>Hevea brasiliensis</i> . . . . .	15 "
" <i>Hippobromus alatus</i> . . . . .	3 "
" <i>Hippomane ilicifolia</i> . . . . .	.5 à 25 "
Le <i>Mancenillier</i> , dont on a fabuleusement exagéré les propriétés vénéneuses pour ceux qui se reposent sous son ombrage; ce qui est vrai, c'est que le suc laiteux qu'il distille est un poison des plus actifs.	
t <i>Hymenæa Courbaril</i> . . . . .	.5 à 10 "
Les naturels de la Guiane mangent la pulpe farineuse du fruit; par fermentation, on en fait une sorte de bière; la résine que cet arbre produit sert pour la préparation des vernis; le bois est très-recherché pour la charpente.	
or <i>Isonandra Gutta</i> . . . . .	" "
Produit la <i>Gutta-Percha</i> , si usitée dans l'industrie.	
" <i>Jambosa densiflora</i> . . . . .	5 "
" — <i>Korthalsi</i> . . . . .	2 "
" — <i>purpurascens</i> . . . . .	15 "
Le <i>Jambosier</i> produit des fruits dont la médecine a tiré parti et qui servent aussi à des usages culinaires.	
" <i>Jatropha Manihot</i> . . . . .	3 "
Le <i>Manioc</i> ou le <i>Médecinier</i> dont les racines donnent une farine qui sert dans la pâtisserie et dans les potages qu'elle prend le nom de <i>Tapioca</i> .	
or <i>Kopsia fruticosa</i> . . . . .	5 "
" <i>Lagetta linearia</i> . . . . .	6 "
Sa racine écorcée, battue et préparée, s'étend en réseau qui simule la dentelle par sa finesse; on en fait des cocardes, des manchettes, des nattes, etc.	
t <i>Lasiolipsis Bennetti</i> multijuga. . . . .	3 "



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Laurus Camphora, foris</b> . . . . .	5 à 10 "	<b>or 15. Piper excelsum aureo-pictum.</b> . . . .	5 "
Le <i>Camphrier</i> , en belles tiges de près d'un mètre de hauteur, à magnifique feuillage. A cultiver à la manière des Lauriers.		<b>e 14. — Futokadsura</b> . . . . .	2 "
<b>t Lucuma deliciosa</b> . . . . .	6 "	<i>Poirier du Japon.</i>	
Arbre ornamental donnant des fleurs vertes, auxquelles succèdent des fruits exquis.		<b>t 12. — incanum.</b> . . . .	1 "
<b>n Machærium firmum.</b> . . . .	3 "	<b>or 13. — nigrum</b> . . . . .	4 "
D'un port très-distinct; produit une sorte de Palissandre.		Produit le poivre commun, condiment ordinaire de tous nos mets.	
<b>n Mammea americana.</b> . . . .	10 "	<b>pt Plectranthus fruticosus</b> . . . . .	2 "
<b>or Mangifera indica</b> . . . . .	20 "	Genre de <i>Coleus</i> à feuillage charnu, à senteur de citron.	
Bel arbre produisant un fruit ornamental, comestible, de premier mérite aux Indes.		<b>e Pogostemon Patchouli</b> . . . . .	2 "
<b>t Manihot Glaziova</b> . . . . .	5 "	Plante bien connue pour le parfum aromatique qu'on en tire; feuillage velu, fleurs blanchâtres.	
<b>n Melicocca bijuga</b> . . . . .	4 "	<b>or Quassia amara</b> . . . . .	15 "
Produit un fruit excellent.		Plante officinale à feuilles ailées, à fleurs d'un beau rouge vif, en grappe terminale.	
<b>n Memecylon ramiflorum</b> . . . . .	3 à 6 "	<b>81. Ravenala madagascariensis (FLORE,</b>	
<b>g. or Mikania speciosa</b> . . . . .	2 "	XIII, 117 et XXI, 161) . . . . .	5 à 15 "
<b>or Mimusops Elengi</b> . . . . .	10 "	L'Arbre du <i>Voyageur</i> dont les feuilles distiques, longuement pétioles, peuvent atteindre 3 mètres de longueur et se déploient en éventail au sommet de la tige, où elles produisent un magique effet.	
<b>n Monodora Myristica grandiflora</b> . . . . .	5 à 10 "	<b>e Rubus roseifolius flore simplici (FLORE,</b>	
Le <i>Muscadier</i> de Guinée.		XVII, 3) . . . . .	3 "
<b>t Morinda Rojoc</b> . . . . .	6 "	Framboisier des Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, des fruits comestibles de forme charmante.	
<b>68. Musa Cavendishi (sinensis)</b> . . . . .	8 à 25 "	<b>t Salvadora persica</b> . . . . .	3 "
Le <i>Bananiér</i> de Chine.		<b>n Sansevieria angolensis (cylindrica)</b> . . . . .	10 "
<b>69. — coccinea (FLORE, VII, 213).</b> . . . .	10 "	Ses longues feuilles tétréiformes sont des plus bizarres, et d'une grande souplesse unie à une solidité à toute épreuve.	
<b>70. — discolor, foris.</b> . . . .	10 à 20 "	<b>n — — ruficincta</b> . . . . .	2 "
<b>71. — Ensete (FLORE, XIV, 65)</b> . . . . .	5 à 25 "	<b>n Sapindus Saponaria.</b> . . . .	10 "
Le grand <i>Bananiér</i> d'Abyssinie, très-rustique, de serre tempérée ordinaire, atteint des proportions gigantesques; ses feuilles sont d'un beau vert, avec la côte médiane d'un rouge foncé. Cette magnifique plante produit un effet très-pittoresque et très-ornemental, quand on la met l'été en plein air. Il va de soi qu'on doit la rentrer en serre à l'approche de la mauvaise saison.		L'Arbre à savon; fleurs blanches.	
<b>154. — Livingstonei</b> . . . . .	25 "	<b>n Sapota Achras</b> . . . . .	10 "
<i>Bananiér</i> très-rustique, excellent pour pleine terre en été.		Le <i>Sapotillier</i> dont les fruits sont comestibles.	
<b>72. — ornata</b> . . . . .	15 "	<b>or Sideroxylon Mastichodendron</b> . . . . .	10 "
<b>73. — paradisiaca, foris.</b> . . . .	10 à 25 "	<b>t Simaruba excelsa</b> . . . . .	6 "
Le <i>Bananiér</i> ordinaire.		Plante officinale à feuillage ornemental.	
<b>74. — rosacea</b> . . . . .	5 à 10 "	<b>or Spondias cytherea</b> . . . . .	15 "
<b>105. — rubra</b> . . . . .	10 à 20 "	Arbre à fruit des tropiques.	
<b>155. — sanguinea</b> . . . . .	25 "	<b>e Stadmannia australis</b> . . . . .	5 à 15 "
<b>106. — superba</b> . . . . .	15 à 25 "	Le <i>Bois de fer</i> de la Nouvelle-Hollande. Fleurs blanchâtres auxquelles succèdent des fruits rouges orangés renfermés dans une enveloppe jaune citron, d'un très-bel effet et d'un goût très-acidulé, mais agréable.	
<b>99. — violacea</b> . . . . .	10 à 20 "	<b>n — sorbifolia.</b> . . . .	15 à 25 "
<b>77. — vittata (FLORE, XV, 25).</b> . . . .	60 "	Feuillage très-ornemental.	
<b>78. — zebrina (FLORE, X, 223).</b> . . . .	15 "	<b>t Swietenia chloroxylon.</b> . . . .	2 "
<b>or Myristica moschata.</b> . . . .	" "	<b>n — Mahagoni</b> . . . . .	10 "
Le <i>Muscadier</i> des Moluques, à beau feuillage et à jolies fleurs jaunes, auxquelles succèdent les noix si connues.		Cette espèce fournit l' <i>Acajou</i> vrai.	
<b>n Myroxylon balsamiferum</b> . . . . .	10 "	<b>or Tamarindus indica</b> . . . . .	5 "
Produit le <i>Baume du Pérou</i> .		Le <i>Tamarin</i> , employé en médecine; feuilles pennées, fleurs jaunes.	
<b>e Myrtus Pimenta.</b> . . . .	4 à 6 "	<b>pt Tetrapanax papyrifera (Aralia)</b>	
Son fruit ou coque est excitant et aromatique; on s'en sert dans l'art culinaire et dans la parfumerie.		(FLORE, VIII, 153) . . . . .	1 à 4 "
<b>n Oldfieldia africana</b> . . . . .	8 "	Arbuste dont les tiges renferment dans leur intérieur une moelle abondante, dont les Chinois fabriquent un papier très-renommé pour les gravures.	
<b>25. Pandanus utilis</b> . . . . .	1 à 100 "	<b>Thea Bohea</b> . . . . .	2 "
<b>22. Passiflora edulis</b> . . . . .	1 "	— japonica foliis argenteo-marginatis . . . . .	2 "
<b>or Paulinia oceanica</b> . . . . .	5 "	— viridis . . . . .	2 "
<b>n Persea gratissima</b> . . . . .	4 "	Les feuilles des <i>Thea</i> constituent le thé du commerce.	
L' <i>Avocatier</i> , très-estimé pour son fruit; grandes feuilles coriaces, fleurs blanchâtres.		<b>or Theobroma Cacao</b> . . . . .	10 à 50 "
<b>n Pilocarpus pinnatifidus</b> . . . . .	10 "	Ses graines forment la base du <i>Chocolat</i> .	
<b>e Pinckneya pubens (FLORE, XIX, 13).</b> . . . .	5 "	<b>n Urvillea ferruginea.</b> . . . .	5 "
Cinchonacée à fleurs blanches mouchetées de rose; l'une des divisions du calice représente une expansion foliacée très-curieuse, de couleur blanc crème bordé de rose.		<b>n Vanilla aromatica</b> . . . . .	10 à 25 "
<b>or 10. Piper Cubeba</b> . . . . .	3 "	Orchidée grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres quand on en féconde artificiellement les fleurs. Ses fruits constituent la <i>Vanille</i> du commerce.	
Produit le poivre de <i>Cubèbe</i> , très-usité en médecine.			
<b>n 11. — excelsum</b> . . . . .	2 "		



## SERRE FROIDE.

	Fr. C.
<i>Abelia rupestris</i> . . . . .	2 "
— — <i>grandiflora</i> . . . . .	2 "
— — <i>uniflora</i> (FLORE, VIII, 203) . . . . .	2 "
22. <i>Abutilon Darwini</i> . . . . .	2 "
25. — — <i>majus</i> . . . . .	2 "
26. — — <i>robustum</i> . . . . .	2 "
27. — — <i>roseum floribundum</i> . . . . .	2 "
23. — — <i>tessellatum</i> . . . . .	2 "
16. — — <i>hybridum Alphonse Karr.</i> . . . .	1 "
17. — — <i>Béranger</i> . . . . .	1 "
13. — — <i>Boule de neige</i> . . . . .	1 "
20. — — <i>Montgolfier</i> . . . . .	1 "
29. — — <i>Prince d'Orange jaune</i> . . . . .	5 "
30. — — — — <i>rose saumoné</i> . . . . .	5 "
28. — — <i>rosædorum</i> . . . . .	2 "
21. — — <i>Souvenir de Couchy.</i> . . . .	1 "
10. — — <i>Souvenir de Maximilien</i> . . . . .	1 "
4. — — <i>megapotamicum</i> . . . . .	1 "
11. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
2. — — <i>rubrum multiflorum</i> . . . . .	1 "
15. — — <i>Sellowianum variegatum.</i> . . . .	2 à 10 "
6. — — <i>striatum foliis variegatis.</i> . . . .	1 "

Les *Abutilons* sont des arbustes très-florifères, à grandes feuilles cordées, à gracieuses fleurs pendantes, blanches, roses, jaunes, etc., parfois veinées ou réticulées.

<i>Acacia albicans</i> . . . . .	2 "
— — <i>angustifolia</i> . . . . .	2 "
— — <i>argyrophylla</i> . . . . .	2 "
— — <i>cordata</i> . . . . .	2 "
— — <i>Drummondii</i> . . . . .	2 à 60 "
— — <i>exsudata</i> . . . . .	2 "
— — <i>grandis</i> . . . . .	2 à 4 "
— — <i>Latrobei</i> . . . . .	2 "
— — <i>lineata</i> . . . . .	2 "
— — <i>longifolia</i> . . . . .	2 "
— — <i>lophantha</i> . . . . .	1 "
— — <i>Neumannii</i> . . . . .	2 "
— — <i>ornata</i> . . . . .	1 "
— — <i>paradoxa</i> . . . . .	1 à 5 "
— — <i>pendula</i> . . . . .	2 "
— — <i>platyptera</i> . . . . .	2 à 5 "
— — <i>pulchella</i> . . . . .	2 "
— — <i>pycnantha</i> . . . . .	2 "
— — <i>Riceana</i> . . . . .	2 "
— — <i>verticillata, fort</i> . . . . .	4 "
— — <i>vestita</i> . . . . .	4 "

Les *Acacia* sont de charmants abrisseaux à feuillages très-diversifiés, à fleurs en boules ou goupillons, formées des filets stamineaux, fort légères et d'un effet très-agréable, variant du jaune très-pâle au jaune foncé.

<i>Achyrocline Saundersoni</i> . . . . .	1 "
<i>Adenandra fragrans.</i> . . . .	2 à 10 "
<i>Adromistus clavatus</i> . . . . .	1 "
— — <i>Desmetianus</i> . . . . .	1 "

3204. <i>Agapanthus minor Mooreanus.</i> . . . .	5 "
— — — — <i>les douze</i> . . . . .	5 "

3205. — — <i>Saundersonianus</i> . . . . .	5 "
--	-----

Grande plante à feuilles gladiées, distiques, à fleurs en fortes ombelles, d'un beau bleu.

	Fr. C.
3208. <i>Agapanthus umbellatus.</i> . . . .	1 "
— — — — <i>les douze</i> . . . . .	10 "
3209. — — <i>flore albo.</i> . . . .	1 50
3210. — — — — <i>monstrosus</i> . . . . .	75
— — — — <i>les douze</i> . . . . .	7 50
3211. — — — — <i>bicolori</i> . . . . .	2 "
3212. — — — — <i>foliis albo-vittatis</i> . . . . .	2 "

*Agapanthe* à beau feuillage nettement rubané de blanc, propre à la décoration des appartements.

3213. — — — — <i>aureo-vittatis.</i> . . . .	15 "
3214. — — — — <i>maximus.</i> . . . .	2 50
— — — — <i>les douze</i> . . . . .	25 "

Fleurs bleues, plus grandes que celles du type.

3215. — — — — <i>flore albo.</i> . . . .	5 "
--	-----

<i>Agathæa cœlestis foliis variegatis.</i> . . . .	50
--	----

<i>Agave americana, forts.</i> . . . .	2 à 5 "
— — — — <i>foliis medio-pictis.</i> . . . .	5 "
— — — — <i>striatis, forts</i> . . . . .	2 à 5 "
— — — — <i>variegatis</i> . . . . .	2 à 10 "
— — — — <i>applanata</i> . . . . .	3 à 10 "
— — — — <i>les douze</i> . . . . .	20 "

— — — — <i>attenuata</i> . . . . .	5 à 15 "
— — — — <i>Bessereriana</i> . . . . .	8 "
— — — — <i>candida</i> . . . . .	15 "
— — — — <i>longifolia</i> . . . . .	15 "
— — — — <i>Celsiana</i> . . . . .	25 "
— — — — <i>coccinea.</i> . . . .	5 à 10 "
— — — — <i>dealbata.</i> . . . .	15 à 50 "
— — — — <i>densiflora</i> . . . . .	10 "
— — — — <i>filifera</i> . . . . .	5 à 10 "
— — — — <i>major, forts</i> . . . . .	10 à 50 "
— — — — <i>Ortgiesi.</i> . . . .	15 "
— — — — <i>geminiflora.</i> . . . .	3 "
— — — — <i>heteracantha Toneliana</i> . . . . .	5 "
— — — — <i>Kerchovei</i> . . . . .	10 "
— — — — <i>macrodonta</i> . . . . .	15 "
— — — — <i>mexicana</i> . . . . .	2 à 10 "
— — — — <i>micracantha</i> . . . . .	10 à 25 "
— — — — <i>Milleri picta</i> . . . . .	5 à 10 "
— — — — <i>mitræformis</i> . . . . .	5 "
— — — — <i>Parryi</i> . . . . .	5 "
— — — — <i>Rozlii</i> . . . . .	10 "
— — — — <i>Salmiana</i> . . . . .	10 à 50 "
— — — — <i>Sartori latifolia</i> . . . . .	5 "
— — — — <i>univittata, fort</i> . . . . .	25 "
— — — — <i>variegata</i> . . . . .	5 à 25 "
— — — — <i>Vandervini.</i> . . . .	5 "
— — — — <i>Verschaffelti</i> . . . . .	5 à 25 "
— — — — <i>Victoria Regina</i> . . . . .	25 à 100 "
— — — — <i>xalapensis, forts</i> . . . . .	5 à 25 "
— — — — <i>Yxtli.</i> . . . .	5 à 25 "

Les *Agaves* sont des plantes qui font un bel effet dans les jardins, sur les perrons ou sur les murs bas; leurs feuilles, en touffes régulières, sont très-charnues, épineuses la plupart. Les fleurs, en girandole étagée, rarement en grappe, très-hautes, sont remarquables dans leur ensemble.

<i>Ageratum cœlestinum,</i> . . . . .	50 "
---------------------------------------	------

	Fr. C.
<b>Ageratum coelestinum</b> <i>Cannell dwarf</i> . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	4 n
<i>le cent</i> . . . . .	35 n

Admirable plante très-naine, excellente pour bordure de massif, ne s'élevant jamais à plus de 15 centimètres de hauteur, formant de nombreux bouquets de fleurs d'un bleu lavande.

— <i>mexicanum aureum</i> . . . . .	n 50
<b>Agnostus sinuatus</b> ( <i>Stenocarpus Cunnin-</i> <i>ghamii</i> ) (FLORE, III, 189). 4 à 25 n	
— <i>integrifolius</i> . . . . .	3 à 15 n
<b>Aloe albo-cincta</b> . . . . .	5 n
— <i>depressa</i> . . . . .	2 n
— <i>ferox</i> . . . . .	8 à 40 n
— <i>retusa</i> . . . . .	2 n
— <i>tessellata</i> . . . . .	2 n
— <i>variegata</i> . . . . .	2 n

Les *Aloe* sont de petites plantes presque sans tiges, à feuilles distiques ou en rosettes, très-charnues et d'un aspect original; les fleurs blanchâtres, verdâtres, rouge brique, etc., sont réunies en longs épis. On peut les ranger, parmi les plantes d'ornement, à côté des *Agaves*.

<b>Ampelopsis striata</b> . . . . .	4 n
Vigne-vierge de récente introduction, très-ornementale, à feuilles vertes persistantes, se colorant, à l'automne, d'une teinte rougeâtre, propre à couvrir les murs, treillis, tonnelles, etc.	
<b>Amphicome arguta</b> . . . . .	1 n
<b>Andromeda angusta</b> . . . . .	2 n
<b>Angelonia grandiflora</b> . . . . .	1 n
<b>Anigosanthus coccineus</b> . . . . .	2 n
— <i>pulcher</i> . . . . .	3 n
<b>Anopterus glandulosa</b> . . . . .	4 n
<b>Anthericum variegatum</b> ( <i>Phalangium</i> ) . . . . .	1 n
<b>Antirrhinum sulphureum plenum</b> . . . . .	1 n
<b>Aotus gracillima</b> . . . . .	2 n
<b>Aponogeton distachyon</b> (FL., XVII, 125) 2 à 4 n	

Plante aquatique à jolies fleurs blanches, odorantes.

<b>Aralia crassifolia</b> . . . . .	3 à 15 n
— <i>picta</i> . . . . .	6 à 15 n
— <i>spathulata</i> . . . . .	6 à 15 n
— <i>papyrifera</i> . . . . .	1 à 4 n
— <i>quinquefolia</i> . . . . .	3 à 10 n
— <i>Sieboldi</i> . . . . .	1 à 5 n
— <i>aureo-reticulata</i> . . . . .	6 n
— <i>foliis albo-marginatis</i> . . . . .	3 à 10 n
— <i>aureo-marginatis</i> . . . . .	3 à 6 n
— <i>trifoliata</i> . . . . .	2 à 10 n
— <i>Baueri</i> . . . . .	3 à 10 n
— <i>Cooki</i> . . . . .	5 n
— <i>Cunninghami</i> . . . . .	3 à 10 n
— <i>Enkei</i> . . . . .	3 à 10 n
— <i>heteromorpha</i> . . . . .	3 à 10 n
— <i>latifolia</i> . . . . .	3 à 10 n

Les *Aralia* sont des arbrisseaux d'un port distingué, à feuillages amples, ordinairement digités, palmés, etc., à grandes panicules de fleurs blanchâtres.

<b>Araucaria Bidwilli</b> (FL., XXI, 119) 20 à 400 n	
— <i>Cooki</i> . . . . .	25 à 75 n
— <i>Cunninghami</i> . . . . .	15 à 400 n
— <i>glauca</i> . . . . .	40 à 100 n
— <i>elegans</i> . . . . .	50 n
— <i>excelsa</i> . . . . .	10 à 75 n

	Fr. C.
<b>Araucaria excelsa albo-spica</b> . . . . .	25 n
— <i>glauca</i> . . . . .	35 à 60 n
— <i>hyb. Jos. Nap. Baumann</i> 75 à 150 n	
— <i>multiceps</i> . . . . .	25 n
— <i>Goldieana</i> . . . . .	40 à 75 n

Très-belle espèce à superbe feuillage, d'un port majestueux. Ses feuilles en verticilles sont pendantes et d'un vert foncé.

— <i>imbricata</i> (FL., XV, 147 et 150) 8 à 10 n	
— <i>Rulei, de semis</i> . . . . .	25 n

Port pleureur des plus élégants.

Les *Araucaria* sont des Conifères des plus élégants et qui sont un des principaux ornements des serres froides et des jardins d'hiver.

<b>Ardisia japonica</b> . . . . .	1 50
Fleurs en panicule, d'un blanc rosé, fort jolies, auxquelles succèdent des fruits rouges.	

— <i>japonica foliis variegatis</i> . . . . .	2 n
<b>Artemisia argentea</b> . . . . .	n 50
<b>Arthropodium cirrhatum</b> . . . . .	1 n
<b>Arthrotaxis alpina</b> ( <i>selaginoides</i> ) . . . . .	4 à 10 n
— <i>Doniana</i> . . . . .	5 n
— <i>Gunneana</i> . . . . .	10 n
— <i>taxifolia</i> . . . . .	8 n

Conifère d'un aspect ornemental.

143. <b>Arundo conspicua</b> . . . . .	1 50
Graminée ornementale d'un bel effet.	

<b>Asparagus ramosus</b> . . . . .	10 n
Charmanne nouveauté à feuillage d'une légèreté extrême et d'une grande élégance.	

<b>Astelia Banksi</b> . . . . .	1 à 3 n
<b>Astelma eximium</b> . . . . .	3 n
<b>Azolla caroliniana</b> . . . . .	n 50

*les douze* . . . . . 4 n

Minuscule Fougère aquatique, introduite de son pays natal en février 1878; elle flotte sur l'eau et convient pour petits aquariums de serre froide ou de plein air.

211. <b>Bambusa aureo-striata</b> . . . . .	1 n
212. — <b>Fortunei foliis niveo-vittatis</b> (FLORE, XV, 69) . . . . .	n 50
<i>les douze</i> . . . . .	5 n

Charmant petit Bambou à feuillage tout rubané de blanc, dont on fait de très-jolies bordures.

215. — <b>Simoni</b> . . . . .	5 n
<b>Banksia collina</b> . . . . .	3 n
— <i>integrifolia</i> . . . . .	3 n
— <i>verticillata</i> . . . . .	5 à 30 n

Les *Banksia* sont des arbrisseaux touffus, à feuillage d'un vert cendré au-dessus, cotonneux ou roussâtre en dessous, de formes diverses, et d'un grand effet ornemental. Ses fleurs, en têtes terminales sous forme de gros châtons, presque toujours d'une jaune ferrugineux ou verdâtres, sont fort originales.

<b>Beaucarnea</b> ( <i>Pincenectilia</i> ) <i>glauca</i> . . . . .	4 n
— <i>tuberculata</i> ( <i>recurvata</i> ) (FLORE, XVIII, 26) . . . . .	2 à 6 n

Plante très-élégante, à tige très-renflée à la base, couronnée par des feuilles étroites, planes, régulièrement recourbées, très-ornementales.

<b>Berberidopsis corallina</b> (FLORE, XX, 141) 3 n	
<b>Berberis Darwini</b> (FLORE, VII, 47) . . . . .	1 n
— <i>Jamesoni</i> . . . . .	2 n
— <i>macrophylla</i> . . . . .	2 n
<b>Beschorneria yuccoides</b> . . . . .	2 n
<b>Bignonia capreolata</b> . . . . .	2 n



	Fr. C.
<i>Blandfordia aurea</i> . . . . .	10 "
— <i>Cunninghami</i> . . . . .	10 à 25 "
— <i>flammea</i> . . . . .	25 "
— — <i>princeps</i> (FLORE, XXII, 87). . . . .	40 "
— — <i>hybrida</i> . . . . .	40 "
— <i>nobilis</i> . . . . .	10 à 15 "
— — <i>grandiflora</i> . . . . .	10 "

Les *Blandfordia* sont de charmantes petites plantes à feuilles linéaires, à tige florale droite, portant une petite ombelle de fleurs assez grandes, pendantes, d'un rouge pâle lavé de jaune ou de vert.

<i>Bonapartea ensiformis stricta</i> . . . . .	20 "
— <i>glauca</i> . . . . .	.2 à 15 "
— <i>gracilis</i> . . . . .	.2 à 15 "
— <i>Hystrix</i> . . . . .	20 "
— <i>stricta</i> . . . . .	20 "

Les *Bonapartea* ont des souches globuleuses ou des tiges courtes, garnies en tous sens de feuilles étroites, raides, épineuses, terminées par une houppie.

<i>Boronia elatior</i> . . . . .	.3 à 30 "
— <i>megastigma</i> . . . . .	.2 à 15 "
— <i>polygalæfolia</i> . . . . .	1 "
— <i>viminea major</i> . . . . .	2 "

Les *Boronia* sont des arbrustes mignons, à très-petit feuillage, simple ou ailé, à charmantes fleurs très-abondantes, de coloris variés, dans les tons rose vif ou carné.

28. <i>Bouvardia candidissima</i> . . . . .	1 "
25. — <i>Davidsoni</i> . . . . .	2 "
21. — <i>elegans</i> . . . . .	2 "
37. — <i>Humboldtii corymbiflora</i> . . . . .	2 "
12. — — <i>splendens</i> . . . . .	1 "
13. — <i>hybrida Brillant</i> . . . . .	1 "
18. — — <i>Linda</i> . . . . .	1 "
43. — — <i>Maiden Blush</i> . . . . .	2 "
45. — — <i>Oriflamme</i> . . . . .	2 "
39. — <i>jasminiflora</i> . . . . .	2 "
33. — — <i>compacta</i> . . . . .	2 "
35. — — <i>flavescens</i> . . . . .	1 "
36. — — <i>robusta</i> . . . . .	2 "
22. — <i>jasminoides</i> . . . . .	1 "
29. — — <i>longipetala</i> . . . . .	2 "
14. — <i>Oriana lutea</i> . . . . .	1 "
32. — <i>umbellata carnea</i> . . . . .	3 "

Les *Bouvardia* sont des plantes de culture très-facile, qui passent l'été dehors, en pleine terre, où elles fleurissent parfaitement. Fleurs tubuleuses, réunies en cimes, très-variées de couleurs : blanches, roses, rouges dans tous les tons, etc.

<i>Brachysema acuminatum</i> . . . . .	2 "
— <i>hybridum</i> . . . . .	2 "
— <i>melanopetalum</i> . . . . .	2 "
<i>Bromelia Joinvillei</i> . . . . .	.2 à 10 "
<i>Brugmansia arborea alba</i> . . . . .	5 "
— — <i>flore pleno</i> . . . . .	4 "
— <i>sanguinea</i> (FLORE, XVIII, 101). . . . .	4 "

Fleurs pendantes, longues de 20 centimètres, d'abord jaunâtres, puis se colorant en rouge sang à la gorge.

<i>Buxus citrifolia</i> . . . . .	5 "
<i>Cacalia Kleinia</i> . . . . .	1 "
37. <i>Calceolaria Pavoni (lignea)</i> . . . . .	1 "
38. — — <i>violacea (Jovellana)</i> (FLORE, VIII, 85) . . . . .	.2 à 4 "

Calcéolaire ligneuse à fleurs d'un bleu violacé maculé de jaune d'or et aspergé de gouttelettes brunes.

**Calcéolaires herbacées, graines, le paquet : 5 fr.**

Chaque *paquet* est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

" Je garantis que les graines contenues dans ce *paquet* font partie intégrante de celles que j'ai récoltées l'été dernier sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. "

(Signé) L. VAN HOUTTE.

**Soins à donner au semis de Calcéolaires.**

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage en petits pots, lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine; elles passeront ainsi l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Les *Calcéolaires herbacées*, en jeunes plantes, sont disponibles d'octobre en avril, à 20 francs le cent.

	Fr. C.
<i>Camptosema rubicundum</i> . . . . .	2 "
<i>Cantua bicolor</i> (FLORE, IV, 343) . . . . .	4 "
— <i>dependens</i> (FLORE, VII, 11) . . . . .	2 "
Arbustes à grandes et belles fleurs nées, jaunes, à limbe rouge.	
<i>Cardwellia sublimis</i> . . . . .	.5 à 15 "
<i>Cassia Blumenavia</i> . . . . .	2 "
— <i>corymbosa</i> . . . . .	2 "
— <i>grandiflora</i> . . . . .	2 "
— <i>lævigata</i> . . . . .	2 "

Espèce naine de Californie, à feuilles persistantes, d'un jaune d'or en dessous.

<i>Centaurea candidissima</i> . . . . .	n 75
Espèce à feuillage tout blanc, propre à être alternée avec d'autres plantes de massifs à feuillage diversement coloré, telles que <i>Coleus</i> , <i>Iresine</i> , etc., avec lesquelles elle fera un bel effet de contraste.	
— <i>rutifolia</i> . . . . .	1 "

<i>Cephalotus follicularis</i> (FLORE, III, 280) . . . . .	6 "
La petite plante aux petites capettes, qu'on doit cultiver sous cloche, en serre tempérée.	

<i>Ceratonia Siliqua</i> . . . . .	2 "
<i>Ceratopetalum gummiferum</i> . . . . .	2 "
<i>Cestrum aurantiacum</i> . . . . .	2 "
<i>Cheiranthus odoratissimus</i> . . . . .	2 "
<i>Choisya ternata</i> . . . . .	.2 à 25 "

Charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête; supporte aussi la pleine terre.

	Fr. C.
<b>Chorizema Lawrenceanum.</b> . . . .	2 "
— <i>macrophyllum.</i> . . . .	2 "
— <i>splendens.</i> . . . .	2 "
— <i>rotundifolium.</i> . . . .	2 "
— <i>varium ilicifolium.</i> . . . .	2 "

Les *Chorizema* sont des arbustes de la Nouvelle-Hollande, fort jolis de feuillage et de fleurs.

<b>Cineraria maritima.</b> . . . .	" 50
Feuillage blanc.	
— <i>candidissima.</i> . . . .	" 50

Feuillage bien plus blanc que celui de la précédente espèce; plante de grand effet dans les massifs ou couchée, à l'instar des Verveines, en bordures.

<b>Cinnamomum brevifolium.</b> . . . .	2 "
— <i>pedunculatum foliis variegatis.</i> . . . .	6 "

20. <b>Citrus Aurantium foliis variegatis</b> 3 à 10 "	
15. — <i>nobilis (Mandarin).</i> . . . .	3 "
2. — <i>taitensis.</i> . . . .	1 à 3 "

Oranger nain de Taïti, se couvrant, chaque année, de fleurs et de petits fruits, et ne demandant, pour ainsi dire, aucun soin. Mignonne plante d'ornement pour la serre froide.

13. — <i>trifoliata.</i> . . . .	2 "
Espèce rustique.	
— <i>semis de 2 ans pour greffer, le cent.</i>	25 "

#### **Citronniers et Orangers, belles têtes,** *pièce.* . . . . 25 à 40 "

L'élégance des Orangers, la suavité de leurs fleurs, la beauté et l'excellence de leurs fruits parfumés, en font un des plus précieux ornements des jardins.

<b>Clematis Pitcheri.</b> . . . .	4 "
<b>Clethra arborea.</b> . . . .	40 à 75 "

Plantes fortes, en hautes tiges avec belles têtes bien garnies. Jolies fleurs blanches, en grappes, odorantes.

— <i>foliis variegatis.</i> . . . .	3 "
<b>Cleyera japonica.</b> . . . .	5 "
— <i>foliis roseo-marginatis.</i> . . . .	35 "

<b>Clianthus puniceus.</b> . . . .	1 "
— <i>magnificus.</i> . . . .	2 "

Arbustes semi-ligneux, à joli feuillage penné, à grappes pendantes de belles et grandes fleurs d'un rouge vif.

<b>Cobæa scandens.</b> . . . .	" 50
Arbrisseau grimpant, à fleurs pourprées, longues de 6 à 8 centimètres.	
— <i>foliis albo-marginatis (FLORE,</i>	

XIV, 199)	1 "
<b>Coleonema rubrum.</b> . . . .	2 "

<b>Colletia biconiensis (FLORE, XIV, 157).</b>	2 "
— <i>horrida.</i> . . . .	2 "

<b>Convolvulus mauritanicus (FL., XXI, 61)</b>	" 50
Espèce très-florifère à cultiver en corbeille, se garnissant de charmantes fleurs bleues.	

<b>Coprosma Baueriana foliis albo-margi-</b>	
<b>natis.</b> . . . .	1 à 3 "

Très-joli feuillage, ondulé dans le milieu, largement bordé de blanc, très-ornemental.

— <i>Stocki.</i> . . . .	2 à 5 "
<b>Correa cardinalis (FLORE, XI, 143)</b>	2 "

La fleur a le tube d'un rouge vif, le limbe, découpé en quatre lobes, d'un jaune verdâtre, et le calyce d'un roux ferrugineux.

<b>Corynocarpus latifolia.</b> . . . .	2 "
<b>Cosbæa coccinea.</b> . . . .	2 à 5 "
<b>Cotyledon orbicularis.</b> . . . .	1 "
— <i>punctatissima.</i> . . . .	1 "
— <i>teretifolia.</i> . . . .	1 "

	Fr. C.
16. <b>Crassula coccinea Dr Naudin.</b> . . . .	1 "
17. — <i>Dr E. Regel.</i> . . . .	1 "
26. — <i>Fr. Desbois.</i> . . . .	1 "
29. — <i>Mad. Desbordes-Valmore.</i> . . . .	1 "
30. — <i>Mad. Céleste Wynans.</i> . . . .	1 "
13. — <i>Otto Deines.</i> . . . .	1 "
15. — <i>Sultan Achmet.</i> . . . .	1 "
— <i>lactea.</i> . . . .	1 "
— <i>lycopodioides.</i> . . . .	1 "
— <i>perfoliata.</i> . . . .	1 "
— <i>repens.</i> . . . .	" 50

Les *Crassula* sont des plantes grasses, à tiges feuillées portant des ombelles de très-belles fleurs roses ou rouges, nuancées, odorantes.

<b>Crowea elliptica.</b> . . . .	2 "
— <i>macrantha latifolia.</i> . . . .	3 "
— <i>saligna.</i> . . . .	2 "
— <i>stricta.</i> . . . .	3 "

Flours assez grandes, très-jolies, dans les tons roses.

<b>Cunninghamia lanceolata.</b> . . . .	2 "
<b>Cuphea platycentra.</b> . . . .	" 50

3620. <b>Cyclamen coum (FLORE, XXII, 169)</b>	" 75
3621. — <i>vernum.</i> . . . .	1 "
3623. — <i>europæum.</i> . . . .	" 25

<i>les douze.</i> . . . .	2 50
3629. — <i>hederæfolium album.</i> . . . .	1 50
3630. — <i>rubrum.</i> . . . .	" 50

3633. — <i>hyb. Atkinsi (ibericum album)</i>	
(FLORE, XXII, 169) . . . .	1 "

3634. — <i>carneum.</i> . . . .	1 50
3636. — <i>ibericum roseum.</i> . . . .	" 50
3637. — <i>rubrum.</i> . . . .	1 "

3640. — <i>macrophyllum (africanum),</i>	
(FLORE, VIII, 249) . . . .	2 "
3642. — <i>nobile.</i> . . . .	1 50

3644. — <i>persicum album (FLORE, XXII,</i>	
169) . . . .	" 75
3645. — <i>candidissimum (aleppicum)</i>	

(FLORE, XXII, 169) . . . .	2 "
3646. — <i>flore roseo (FL., XXII, 169)</i>	2 "
3647. — <i>giganteum.</i> . . . .	5 "

3650. — <i>repandum.</i> . . . .	1 "
3651. — <i>album.</i> . . . .	1 50

Ces délicieuses Primulacées seront toujours recherchées pour leurs jolies fleurs blanches, roses, rouges, violacées, parfois odorantes.

<b>Cytisus Atleeanus.</b> . . . .	2 "
— <i>Everestianus.</i> . . . .	3 "
— <i>racemosus.</i> . . . .	2 "
— <i>elegans.</i> . . . .	2 "
— <i>superbus.</i> . . . .	2 "

Les *Cytisus racemosus* sont de jolis arbrisseaux à feuillage trifolié et à épis de fleurs jaunes suavement odorantes.

<b>Dacrydium cupressinum.</b> . . . .	5 "
— <i>elatum.</i> . . . .	.6 à 25 "

<b>Dammara Browni (ovata).</b> . . . .	.100 "
— <i>hypoleuca, fort.</i> . . . .	.150 "
— <i>obtusata (FLORE, VII, 274).</i> . . . .	.50 "

<b>Daphne Delphini.</b> . . . .	2 "
— <i>intus rubra.</i> . . . .	3 "



	Fr. C.
<i>Daphne japonica elegantissima</i> . . . . .	4 "
— — <i>marginata</i> . . . . .	3 "
— — <i>Mazeli</i> . . . . .	3 "
— <i>oleoides foliis variegatis</i> . . . . .	3 "
— <i>Van Houttei</i> . . . . .	4 "

Qui ne connaît les *Daphne*, ces arbustes semi-rustiques à feuilles persistantes, dont les fleurs blanches, roses, lilas, pourpres, etc., sont si délicieusement odorantes? Le *D. Van Houttei* a le feuillage d'un pourpre noirâtre.

<i>Dasyliirion glaucophyllum</i> . . . . .	3 "
— <i>Hartwegianum</i> . . . . .	3 "
— <i>juncifolium, très-fort</i> . . . . .	125 "
— <i>longifolium</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>species</i> . . . . .	10 "

Les *Dasyliirion* sont des plantes à tige globuleuse ou très-courte, d'où rayonnent en tous sens des feuilles minces, longues et serrées, d'un aspect très-élégant et très-ornemental.

<i>Desfontainea Hookeri</i> (FL., IV, 207) 2 à 15 "	
<i>Dianella latifolia</i> . . . . .	1 "
<i>Dietes bicolor (Moræa)</i> (FLORE, VII, 273) 2 "	

Belle Iridée à grandes fleurs jaunes, ornées de trois fortes macules d'un noir jais.

<i>Dillwynia glaberrima</i> . . . . .	2 "
— <i>Henchmanni</i> . . . . .	3 "
<i>Diosma ciliata</i> . . . . .	2 "
— <i>Eckloniana</i> . . . . .	2 "
— <i>fragrans</i> . . . . .	2 "
— <i>purpurea</i> . . . . .	2 "

Les *Diosma* sont des arbustes touffus, gracieux, à mignon feuillage aromatique, d'un charmant effet.

2557. <i>Doryanthes Palmeri</i> (FLORE, XX, 77) . . . . .	5 à 10 "
1. <i>Dracæna australis</i> . . . . .	2 à 25 "
6. — <i>congesta</i> . . . . .	1 "
14. — <i>indivisa</i> . . . . .	2 à 5 "
15. — <i>lineata</i> . . . . .	2 à 50 "
124. — — <i>Veitchi</i> . . . . .	2 à 5 "
26. — <i>rubra</i> . . . . .	2 "
130. — <i>salicifolia</i> . . . . .	2 "

<i>Dracophyllum gracile, très-fort</i> . . . . .	40 "
<i>Drimys Winteri</i> . . . . .	2 à 5 "
<i>Duranta brachypoda</i> . . . . .	2 "
<i>Dyckia remotiflora</i> . . . . .	5 "

2. <i>Echeveria agavoides</i> . . . . .	1 à 6 "
les douze . . . . .	10 "

67. — <i>atropurpurea</i> . . . . .	1 "
19. — <i>californica</i> . . . . .	1 à 3 "
20. — — <i>viridis</i> . . . . .	1 à 2 "
21. — <i>carinata</i> . . . . .	2 "
52. — <i>clavifolia</i> . . . . .	4 "
68. — — <i>cristata</i> . . . . .	2 à 3 "
69. — <i>dasyphylla</i> . . . . .	2 "
40. — <i>Desmetiana</i> . . . . .	2 à 4 "
17. — <i>farinosa</i> . . . . .	1 à 2 "
56. — <i>ferrea</i> . . . . .	1 "
54. — <i>Fancki</i> . . . . .	3 "
64. — <i>fusifera</i> . . . . .	1 à 3 "
4. — <i>glaucæ</i> . . . . .	50 "
les douze . . . . .	5 "

Cette espèce est très-convenable et très-recherchée pour former des bordures en pleine terre, l'été.

	Fr. C.
14. <i>Echeveria globosa (rosacea)</i> 50 c. à 1 "	
58. — <i>grandisepala</i> . . . . .	1 à 3 "
24. — <i>hybrida</i> . . . . .	1 à 2 "
55. — <i>imbricatissima</i> . . . . .	1 50 "
66. — <i>lancifolia</i> . . . . .	1 "
6. — <i>metallica</i> . . . . .	1 à 3 "
7. — — <i>glaucæ</i> . . . . .	50 "
les douze . . . . .	5 "
16. — — <i>grandis</i> . . . . .	5 "
46. — — <i>sanguinea</i> . . . . .	2 "
57. — <i>mirabilis</i> . . . . .	1 "
25. — <i>navicularis</i> . . . . .	50 "
les douze . . . . .	5 "
50. — <i>pachyphyloides</i> . . . . .	1 à 3 "
26. — <i>peruviana</i> . . . . .	1 "
27. — <i>Pfersdorffi</i> . . . . .	50 "
28. — <i>pubescens (coccinea)</i> . . . . .	1 "
3. — <i>pulverulenta</i> (FL., XIX, 1) 1 à 10 "	

Magnifique espèce s'étalant en une élégante rosace d'une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement couverte d'une pulvéulence blanche comme la neige. On doit la préserver de tout arrosage en hiver.

73. — — <i>angustifolia</i> . . . . .	5 "
72. — <i>rubescens</i> . . . . .	6 "
15. — <i>sanguinea</i> . . . . .	1 "
11. — <i>scaphiphylla</i> . . . . .	1 à 5 "
13. — <i>Scheeri</i> . . . . .	2 "
61. — <i>Scheideckeri</i> . . . . .	1 à 3 "
29. — <i>secunda</i> . . . . .	50 "
les douze . . . . .	5 "
36. — — <i>glaucæ</i> . . . . .	1 "
37. — <i>spatulata</i> . . . . .	3 "
63. — <i>spiralis</i> . . . . .	50 "
18. — <i>Van Celsi</i> . . . . .	1 à 2 "

*Echeveria* : 12 belles variétés distinctes . 15 "

Les *Echeveria* sont de belles plantes grasses, à tiges courtes ou nulles, à feuilles en rosette; du centre surgit un épi de jolies fleurs, ordinairement jaunes ou rouges. On en fait des corbeilles et des bordures pendant l'été, en plein air.

<i>Echinum fastuosum</i> . . . . .	1 "
<i>Elæagnus macrophylla</i> . . . . .	5 "

Chalef doré du Japon, presque rustique, dont les grandes feuilles persistantes ont le revers blanc argenté.

<i>Elæodendron croceum</i> . . . . .	2 "
--------------------------------------	-----

<i>Epacris</i> . . . . .	pièce 3 "
— 12 belles variétés en bonnes plantes . 30 "	

Charmantes plantes de l'Australie, dans le genre des *Erica* du Cap, et possédant les mêmes qualités de grâce et de diversité dans les coloris.

<i>Erica du Cap</i> . . . . .	pièce 4 "
— 12 belles variétés en bonnes plantes . 40 "	

Tout le monde connaît les *Bruyères du Cap* de Bonne-Espérance, ces délicieuses plantes qui devraient embellir toutes les serres froides, et dont les fleurs mignonnes brillent par leurs charmants coloris, depuis le blanc pur jusqu'au cramoisi.

<i>Eriostemon buxifolium</i> . . . . .	.6 à 10 "
— <i>cuspidatum</i> . . . . .	4 "
— — <i>rubrum</i> . . . . .	3 "
— <i>densiflorum</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>floribundum</i> . . . . .	4 "
— <i>linifolium</i> . . . . .	4 "
— <i>myoporoides</i> . . . . .	4 "

Fr. C.

<i>Eriostemon neriifolium</i> . . . . .	4 à 100 "
— <i>ovatum</i> . . . . .	4 "
— <i>pulchellum</i> . . . . .	5 "
— <i>scabrum</i> . . . . .	4 à 6 "

Les *Eriostemon* sont des plantes de premier ordre, peu élevées, d'un bon port, à petit feuillage et à gracieuses fleurs blanches ou rosées.

<i>Escallonia caracasana</i> . . . . .	2 "
— <i>macrantha</i> . . . . .	2 "
<i>Eucalyptus floribunda</i> . . . . .	2 "
— <i>Globulus</i> . . . . .	1 à 3 "
— <i>obliqua</i> . . . . .	2 "
— <i>patens</i> . . . . .	2 "
— <i>pilularis</i> . . . . .	2 "
— <i>rostrata</i> . . . . .	2 "
— <i>sessilis</i> . . . . .	2 "

Les *Eucalyptus* sont les arbres géants des forêts de l'Australie; feuillage original, ordinairement blanc et pulvéulent; petites fleurs blanches l'été. Le suc des feuilles de l'*E. Globulus* guérit parfaitement les rhumes de cerveau, d'après le Dr Rudolfi.

<i>Eugenia apiculata</i> . . . . .	2 "
— <i>Ugni</i> . . . . .	2 "

Arbuste produisant de petites prunes comestibles, d'un rouge corail.

458. <i>Eulalia japonica foliis albo-lineatis</i> (FLORE, XXI, 109) . . . . .	2 à 4 "
--	---------

Nouveauté japonaise de premier ordre, charmante, ornementale, à longues feuilles étroites, élégamment rubanées de blanc longitudinalement.

459. — — <i>zebrina</i> . . . . .	5 "
-----------------------------------	-----

Graminée introduite récemment du Japon, formant de fortes touffes de longues feuilles étroites, alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette nouveauté est excessivement recommandable; à part qu'elle est un ornement pour la serre froide, elle apporte, pendant l'été, son contingent d'ornementation aux parterres en plein air.

<i>Eupatorium odoratissimum</i> . . . . .	2 à 10 "
<i>Eurya angustifolia foliis variegatis</i> . . . . .	6 à 15 "
— <i>latifolia foliis aureo-marginatis</i> . . . . .	2 à 25 "
<i>Eurybia alpina</i> . . . . .	2 "
<i>Eutaxia myrtifolia</i> . . . . .	2 "
<i>Fagelia bituminosa</i> . . . . .	2 "

Papilionacée à grandes fleurs jaunes.

<i>Ficus minima</i> . . . . .	2 "
<i>Fitz-Roya patagonica</i> (FLORE, VII, 139) . . . . .	3 "
<i>Garrya Mac Fadyeni</i> . . . . .	2 "
<i>Gasteria nigricans</i> . . . . .	3 "
— <i>variegata</i> . . . . .	2 "
— <i>verrucosa</i> . . . . .	1 "

Feuilles distiques, régulièrement superposées, épaisses, d'un vert noirâtre, couvertes de nombreuses papilles blanches, rugueuses.

<i>Gazania splendens</i> . . . . .	" 50
— <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	" 50

Grandes et belles fleurs à rayons orangés et à disque noir, s'élevant au soleil.

<i>Gelsemium sempervirens</i> . . . . .	2 "
<i>Genethyllis tulipifera</i> (FLORE, X, 227) . . . . .	5 "

Arbuste à petit feuillage semblable à celui du Buis, se décorant de très-grandes fleurs d'un blanc crème striolé et rubané de rouge; requiert de l'air et des arrosements intelligents.

<i>Gnaphalium eximium</i> . . . . .	3 "
— <i>lanatum</i> . . . . .	" 50

Fr. C.

<i>Gnaphalium lanatum foliis sulphureo-marginatis</i> . . . . .	" 50
<i>Gnidia pinifolia</i> . . . . .	4 "

Jolie fleur blanche, à délicieuse odeur de Vanille le soir.

<i>Grevillea alpestris</i> (FLORE, XIV, 149) . . . . .	2 à 5 "
— <i>Drummondii</i> . . . . .	2 "
— <i>flexuosa</i> . . . . .	4 "
— <i>Hilli</i> . . . . .	5 "
— <i>longifolia</i> . . . . .	3 à 6 "
— <i>Manglesi</i> . . . . .	2 "
— <i>Preissii</i> . . . . .	3 à 5 "
— <i>robusta</i> . . . . .	2 "

Les *Grevillea* ont des fleurs originales, gracieuses, dans les tons blancs, roses, rouges, jaunes, etc., parfois en longues grappes brillantes.

<i>Greyia Sutherlandii</i> (FLORE, XVII, 45) . . . . .	3 "
--	-----

Magnifique arbuste à beau feuillage, se couvrant de racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.

<i>Griselinia littoralis</i> . . . . .	" 50
— <i>macrophylla</i> . . . . .	2 "

<i>Hakea cristata</i> . . . . .	6 "
— <i>Victoria</i> . . . . .	6 "

<i>Hardenbergia macrophylla</i> . . . . .	2 "
— <i>monophylla foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
— <i>ovata</i> . . . . .	2 "
— <i>alba</i> . . . . .	2 "

Les *Hardenbergia* sont des Papilionacées sarmenteuses, grimpantes, à très-jolies fleurs blanches, roses, ou bleues.

<i>Haworthia albicans</i> . . . . .	1 "
— <i>attenuata</i> . . . . .	1 "
— <i>cymbiformis</i> . . . . .	1 "
— <i>radula</i> . . . . .	1 "
— <i>Reinwardti</i> . . . . .	1 "

Petites plantes grasses acanules, à feuilles lisses ou garnies de papilles ou de cils non épineux; fleurs blanches, bilabées ou à divisions peu régulières.

<i>Helichrysum argenteum</i> . . . . .	2 "
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	2 à 25 "
— <i>humile</i> . . . . .	2 "
— <i>purpureum</i> . . . . .	2 à 25 "
— <i>roseum</i> . . . . .	2 à 25 "
— <i>speciosissimum</i> . . . . .	2 à 30 "
— <i>spectabile</i> . . . . .	2 à 15 "
— <i>splendens</i> . . . . .	2 à 10 "

Les *Helichrysum* sont de brillantes *Immortelles* donnant de nombreuses fleurs dans les coloris rouges, de très-longue durée.

<i>Hibbertia volubilis foliis purpureis</i> . . . . .	2 "
---	-----

Plante volubile à grande fleur jaune, à feuillage pourpre.

<i>Hymenocallis adnata princeps</i> (FLORE, XXII, 15) . . . . .	5 "
---	-----

Amaryllidées à très-grandes fleurs blanches, d'une grande élégance de forme, à odeur suave.

— <i>caribaea</i> . . . . .	4 "
— <i>mexicana</i> . . . . .	5 "

<i>Ilex cornuta</i> (FLORE, IX, 99) . . . . .	2 "
---	-----

— <i>crenata</i> . . . . .	1 "
— <i>Dahoon</i> . . . . .	1 "
— <i>diphyrena</i> . . . . .	1 "
— <i>furcata</i> . . . . .	2 "
— <i>grandis</i> . . . . .	2 "
— <i>japonica, fort.</i> . . . .	3 "



	Fr. C.
<b>Ilex Perado</b> . . . . .	1 "
<i>Houx d'orangerie à feuillages très-divers.</i>	
<b>Illicium anisatum</b> . . . . .	2 "
— <b>floridanum</b> . . . . .	2 "
— <b>religiosum</b> . . . . .	2 "
Les <i>Illicium</i> sont des arbrisseaux à grandes feuilles coriaces, à fleurs jaunâtres chez l' <i>anisatum</i> et le <i>floridanum</i> , et rougeâtres chez le <i>religiosum</i> .	
<b>Indigofera Roylei</b> . . . . .	1 "
<b>Iochroma coccineum</b> . . . . .	2 "
— <b>Tonelianum</b> . . . . .	4 "
Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.	
<b>Iresine acuminata</b> . . . . .	50 "
— <b>aureo-variegata</b> . . . . .	50 "
— <b>Lindenii</b> . . . . .	50 "
— <b>Verschaffeltii</b> . . . . .	50 "
— <b>aureo-variegata</b> . . . . .	50 "
— <b>Wallisi</b> . . . . .	50 "
Les <i>Iresine</i> sont des plantes basses, rameuses, à joli feuillage dans les tons rouges.	
<b>Jasminum grandiflorum</b> . . . . .	1 "
<i>Jasmin à fleurs blanches, très-odorantes.</i>	
— <b>flore pleno</b> . . . . .	3 "
— <b>odoratissimum</b> . . . . .	1 "
<i>Jasmin à fleurs jaunes, très-odorantes.</i>	
— <b>Poiteau</b> . . . . .	1 50 "
— <b>Reevesii</b> . . . . .	1 "
Fleurit tout l'hiver.	
<b>38. Jovellana violacea (Calceolaria)</b>	
(FLORE, VIII, 85), <i>forts.</i> 2 à 4 "	
Calcéolaire ligneuse très-robuste et très-florifère, à fleur d'un bleu violacé maculé de jaune d'or et aspergé de gouttelettes brunes.	
<b>Kadsura japonica</b> . . . . .	2 "
— <b>foliis variegatis</b> . . . . .	3 "
<b>Kennedyia bimaculata</b> . . . . .	2 "
— <b>coccinea</b> . . . . .	4 "
— <b>eximia</b> . . . . .	3 "
— <b>Fredwoodii</b> . . . . .	3 "
— <b>Licheriana</b> . . . . .	1 "
— <b>Lindleyana</b> . . . . .	2 "
— <b>longiracemosa</b> . . . . .	3 "
— <b>monophylla rosea</b> . . . . .	2 "
— <b>nigricans</b> . . . . .	4 "
— <b>ovata</b> . . . . .	2 "
— <b>alba</b> . . . . .	2 "
— <b>rosea</b> . . . . .	2 "
— <b>rotundifolia</b> . . . . .	2 "
— <b>rubicunda major</b> . . . . .	4 "
— <b>Sieboldii</b> . . . . .	1 "
Les <i>Kennedyia</i> sont de petits arbustes grêles, sarmenteux, à feuilles trifoliolées, à très-jolies fleurs blanches, roses, rouges, violettes, etc.	
<b>Kleinia cana</b> . . . . .	1 "
— <b>ficoides</b> . . . . .	1 "
— <b>repens</b> . . . . .	1 "
— <b>spinulosa</b> . . . . .	1 "
Les <i>Kleinia</i> sont des plantes charnues, à fleurs blanches en corymbe.	
<b>Knightia excelsa, fort</b> . . . . .	25 "

	Fr. C.
<b>3860. Lachenalia fragrans</b> . . . . .	1 50 "
<b>3864. — pendula tricolor (FL., XVII, 161)</b> . . . . .	1 "
<b>3866. — quadricolor</b> . . . . .	1 "
<b>3868. — tigrina</b> . . . . .	3 "
<b>3869. — tricolor</b> . . . . .	1 50 "
<b>3872. — versicolor</b> . . . . .	1 50 "
Les <i>Lachenalia</i> sont de petites plantes bulbeuses à jolies fleurs tubuleuses, variées de rouge, de jaune et de vert.	
<b>Lachnæa purpurea</b> . . . . .	3 "
<b>Lalage tenuifolia</b> . . . . .	2 "
<b>Lapageria alba (FLORE, XX, 29)</b> . . . . .	40 à 200 "
Charmante espèce encore très-rare, à fleurs blanches.	
— <b>rosea (FLORE, V, 491 et XX, 29)</b> . . . . .	4 à 40 "
<i>spécimen unique, extra fort</i> . . . . .	
Ce noble arbuste grimpat à beau feuillage persistant, à nombreuses et grandes fleurs en clochettes, d'un cramoisi vif moucheté de blanchâtre, passe parfaitement l'été à l'ombre, en plein air, et orne luxueusement les serres froides.	
— <b>superba</b> . . . . .	5 "
<b>Laurelia aromatica</b> . . . . .	2 "
Arbre du Chili dont l'écorce est aromatique.	
<b>Laurus Camphora, forts</b> . . . . .	.5 à 10 "
Le <i>Camphrier</i> . Belles tiges de près d'un mètre de hauteur, magnifique feuillage. A cultiver à la manière des Lauriers.	
— <b>nobilis</b> . . . . .	1 à 100 "
<b>Lauriers en pyramide, ou à tige avec couronne, de toutes dimensions et accouplés.</b>	
<i>Prix et force par correspondance.</i>	
<b>Leonotis Leonurus</b> . . . . .	2 "
<b>Leucopogon Cunninghamii</b> . . . . .	15 "
Arbrisseau très-élégant, à gracieuses fleurs blanches, tubuleuses, de longue durée.	
<b>Libertia ixioides</b> . . . . .	1 "
— <b>pulchella</b> . . . . .	2 "
— <b>tricolor</b> . . . . .	2 "
Les <i>Libertia</i> ont des feuilles radicales gladiées, distiques, et d'agréables fleurs blanches.	
<b>Libocedrus chilensis</b> . . . . .	2 à 5 "
— <b>viridis</b> . . . . .	1 50 "
— <b>Doniana</b> . . . . .	5 "
Les <i>Libocedrus</i> sont de charmants Conifères de serre froide.	
<b>Libonia floribunda</b> . . . . .	1 "
— <b>penrhosiensis</b> . . . . .	1 "
— <b>rutilans</b> . . . . .	1 "
Le <i>Libonia</i> sont de jolis arbustes fleurissant abondamment à la fin de l'hiver; des fleurs rouges et jaunes, en clochettes, les garnissent de haut en bas.	
<b>751. Ligularia Kämpferi foliis albo-var.</b> . . . . .	2 "
<i>les douze</i> . . . . .	
Plante vivace du Japon, à grand feuillage panaché de blanc, de toute beauté.	
— <b>japonica</b> . . . . .	1 "
<b>Ligustrum japonicum foliis aureo-varieg.</b> . . . . .	1 "
— <b>lucidum foliis argenteo-marginatis</b> . . . . .	2 "
— <b>aureo-variegatis</b> . . . . .	2 "
<b>Lithospermum fruticosum</b> . . . . .	1 à 3 "
Cette espèce, cultivée en petite tête bien taillée, est un vrai bijou qui se couvre de fleurs du plus beau bleu.	
<b>Lobelia erinoides lutea</b> . . . . .	1 "
Superbe variété nouvelle, à fleurs jaunes, propre pour bordure.	
— <b>True blue</b> . . . . .	50 "
Belle variété à fleurs bleues, excellente pour bordures.	

Fr. C.

**Lobelia rustiques :**

3183. <i>Bleu céleste</i> . . . . .	" 50
3188. <i>M. Saul</i> . . . . .	" 50
3184. <i>Mulberry</i> . . . . .	" 50
3185. <i>purpurea regia</i> . . . . .	" 50
3186. <i>Queen Victoria</i> . . . . .	" 50
775. <i>syphilitica</i> . . . . .	" 50
3190. <i>violacea</i> . . . . .	" 50
<i>Lomatia Bidwilli</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>elegantissima</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>heterophylla</i> . . . . .	.4 à 10 "
— <i>ilicifolia</i> . . . . .	3 "

Les *Lomatia* de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.

<b>Lophospermum coccineum</b> . . . . .	1 "
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	1 50
— <i>Hendersoni</i> . . . . .	1 50
— <i>scandens</i> . . . . .	1 50

Les *Lophospermum* sont des plantes herbacées grimpantes, à grandes fleurs roses, rouges, etc.

<b>Macadamia ternifolia</b> . . . . .	.3 à 10 "
---------------------------------------	-----------

Arbre fruitier du Queensland, en Australie.

<b>Magnolia Campbelli</b> (FLORE, XII, 189) . . . . .	6 à 15 "
— <i>fuscata</i> . . . . .	.3 à 6 "

Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.

— <i>grandiflora, jeunes semis</i> . . . . .	.1 à 6 "
--	----------

Cette espèce requiert la serre froide dans nos contrées. Beau feuillage très-décoratif, à revers brun ferrugineux.

— <i>Gallisonière</i> . . . . .	.6 à 10 "
---------------------------------	-----------

<b>Mahonia gracilis</b> . . . . .	3 "
-----------------------------------	-----

— <i>japonica</i> . . . . .	50 c. à 1 50
-----------------------------	--------------

— <i>nepalensis</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

— <i>pallida</i> . . . . .	2 "
----------------------------	-----

Les *Mahonia* sont de plein air au sud de Paris; leur feuillage persistant, très-ample dans quelques espèces, les rend propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

<b>Mandevilla suaveolens</b> (FLORE, XI, 133) . . . . .	2 "
---	-----

Le *Jasmin du Chili*, arbrisseau grimpant à grandes fleurs en grappes, d'un blanc pur, d'un arôme doux et pénétrant.

<b>Marica cœrulea</b> . . . . .	2 "
---------------------------------	-----

Iridée à majestueuses fleurs blanches.

<b>Melanthus major</b> . . . . .	2 "
----------------------------------	-----

48. <b>Mesembryanthemum albicaule</b> . . . . .	" 50
---	------

1. — <i>albinotum</i> . . . . .	1 "
---------------------------------	-----

49. — <i>aureum</i> . . . . .	" 50
-------------------------------	------

3. — <i>bulbosum</i> . . . . .	1 "
--------------------------------	-----

52. — <i>candens</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

5. — <i>caulescens</i> . . . . .	1 "
----------------------------------	-----

6. — <i>cordifolium</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

7. — <i>variegatum</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

54. — <i>corniculatum</i> . . . . .	1 "
-------------------------------------	-----

8. — <i>crassifolium</i> . . . . .	1 "
------------------------------------	-----

11. — <i>echinatum</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

12. — <i>Eckloni</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

13. — <i>edule</i> . . . . .	1 "
------------------------------	-----

15. — <i>falcatum</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

57. — <i>falciforme</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

19. — <i>glaucum</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

62. — <i>imbricatum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

20. — <i>includens</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

21. — <i>inflatum</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

Fr. C.

63. <b>Mesembryanthemum intonsum</b> . . . . .	" 50
--	------

22. — <i>Lehmanni</i> . . . . .	" 50
---------------------------------	------

65. — <i>lepidum</i> . . . . .	" 50
--------------------------------	------

27. — <i>muricatum</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

31. — <i>rhomboideum</i> . . . . .	1 "
------------------------------------	-----

75. — <i>serrulatum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

33. — <i>simplex</i> . . . . .	1 "
--------------------------------	-----

34. — <i>spectabile</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

77. — <i>subincanum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

35. — <i>tigrinum</i> . . . . .	1 "
---------------------------------	-----

80. — <i>umbellatum</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

36. — <i>uncinellum</i> . . . . .	" 60
-----------------------------------	------

82. — <i>unitum</i> . . . . .	1 "
-------------------------------	-----

83. — <i>verruculatum</i> . . . . .	1 "
-------------------------------------	-----

86. — <i>virgatum hamatum</i> . . . . .	" 50
---	------

12 espèces de <b>Mesembryanth.</b> , à notre choix . . . . .	5 "
--	-----

25 — — — — —	10 "
--------------	------

Les *Mesembryanthemum*, ou *Ficoïdes*, sont des plantes grasses, petites, affectant les formes les plus bizarres, les plus disparates qui se puissent voir; leurs fleurs radiées, sont abondantes et de coloris blancs, roses, rouges, jaunes, etc.

<b>Metrosideros angustifolia flore albo</b> . . . . .	3 "
---	-----

— <i>florida foliis variegatis</i> . . . . .	.2 à 5 "
--	----------

— <i>robusta</i> . . . . .	.3 à 6 "
----------------------------	----------

— <i>rubrifolia</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

— <i>semperflorens</i> . . . . .	1 "
----------------------------------	-----

Les *Metrosideros* sont des arbrisseaux de l'Australie, à feuillage coriace, à fleurs terminales à longs filaments staminaux, ordinairement d'un rouge vif et distinguées.

<b>Mitriaria coccinea</b> (FLORE, IV, 385) . . . . .	.2 à 20 "
--	-----------

Gesnériacée ligneuse grimpante, à nombreuses fleurs écarlates, en clochettes.

<b>Monochætum ensiferum</b> . . . . .	2 "
---------------------------------------	-----

— <i>sericeum multiflorum</i> . . . . .	2 "
---	-----

Les *Monochætum* sont un bel ornement de serre froide; ce sont des arbustes à joli petit feuillage, à grandes belles fleurs pourpres dont les anthères sont jaunes.

<b>Moræa bicolor</b> ( <i>Diets</i> ) (FLORE, VII, 273) . . . . .	2 "
---	-----

Iridée à feuilles ensiformes, très-longues, à fleurs d'un beau jaune, maculées, à la base de chaque sépale, d'une tache brune noirâtre auréolée de jaune orangé.

— <i>viridifolia</i> . . . . .	1 "
--------------------------------	-----

<b>Myrtus communis, tige avec tête</b> . . . . .	.5 à 10 "
--	-----------

— <i>flore pleno, tige avec tête</i> . . . . .	.3 à 15 "
--	-----------

— <i>Franklini</i> . . . . .	2 "
------------------------------	-----

Les *Myrtus* sont des plantes d'orangerie par excellence, à jolies fleurs blanches, simples ou doubles.

<b>Nandina domestica purpurea</b> . . . . .	5 "
---	-----

Grande panicule de petites fleurs blanchâtres, auxquelles succèdent des fruits rouges.

1. <b>Nerium album maximum</b> . . . . .	2 "
--	-----

15. — — — <i>simplex</i> . . . . .	2 "
------------------------------------	-----

6. — <i>atropurpureum flore pleno</i> . . . . .	2 "
---	-----

16. — <i>duplex</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

7. — <i>cardinale</i> . . . . .	2 "
---------------------------------	-----

5. — <i>carneum</i> . . . . .	2 "
-------------------------------	-----

17. — — <i>semiduplex</i> . . . . .	2 "
-------------------------------------	-----

8. — <i>Columbianum album plenum</i> . . . . .	2 "
--	-----

12. — <i>flavum duplex</i> . . . . .	2 "
--------------------------------------	-----

19. — <i>Fonscolumbianum</i> . . . . .	2 "
--	-----

9. — <i>luteum novum</i> . . . . .	2 "
------------------------------------	-----

13. — <i>Madoni grandiflorum duplex</i> . . . . .	2 "
---	-----

20. — <i>Oleander</i> . . . . .	2 "
---------------------------------	-----



	Fr. C.
24. <i>Nerium pictum argenteum</i> . . . . .	3 "
14. — <i>purpureum duplex</i> . . . . .	2 "
10. — — <i>simplex</i> . . . . .	2 "
18. — — — <i>superbum</i> . . . . .	2 "
22. — <i>Ragonoti</i> . . . . .	2 "
4. — <i>roseum ardens</i> . . . . .	3 "
3. — — <i>duplex</i> . . . . .	2 "
11. — <i>splendens foliis aureo-varieg.</i> . . . .	2 "
21. — — <i>roseum plenum</i> . . . . .	2 "
Les <i>Nerium</i> , vulgairement nommés <i>Lauriers roses</i> ou <i>Oléandres</i> , sont des plantes populaires par excellence; leurs fleurs sont simples ou doubles, grandes, belles, abondantes et dans les coloris variant du blanc au rose, au pourpre foncé et au jaune.	
<i>Nertera depressa</i> (FLORE, XXI, 39) . . . . .	50
les douze . . . . .	5 "
Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, à menu feuillage d'un beau vert, se couvrant de nombreux petits fruits oranges, très-propre à garnir les rocailles.	
<i>Nierembergia frutescens</i> . . . . .	50
— <i>gracilis</i> . . . . .	50
— <i>rivularis</i> . . . . .	50
863. <i>Ophiopogon Jaburan foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	3 "
865. — <i>Sieboldi</i> . . . . .	1 "
<i>Oreopanax dactylifolium</i> . . . . .	6 à 10 "
<i>Oxalis arborea lutea</i> . . . . .	1 "
— <i>Ortgiesi</i> . . . . .	1 "
Très-belle espèce à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.	
<i>Pachyphytum bracteosum</i> . . . . .	1 "
— <i>Hookeri</i> . . . . .	50
les douze . . . . .	5 "
Plantes grasses à physionomie des plus bizarres.	
<i>Parochetus communis</i> (FLORE, XV, 143). . . . .	1 "
Exquise petite plante pour corbeille, à charmant feuillage trifolié, zoné et piqué de brun, à divines fleurs du plus beau bleu de cobalt qu'on puisse voir.	
71. <i>Passiflora cærulea</i> . . . . .	2 "
26. — <i>fulgens</i> . . . . .	2 "
39. — <i>Neumannii</i> . . . . .	2 "
<i>Perymenium discolor</i> . . . . .	1 "
<i>Philageria Veitchi</i> . . . . .	15 "
Hybride remarquable issu du <i>Lapageria rosea</i> et du <i>Philesia buxifolia</i> , participant des caractères de ses deux parents; les fleurs sont d'un beau rouge.	
<i>Philesia buxifolia</i> (FLORE, IX, 41). . . . .	5 "
Charmantes fleurs rouges, pendantes.	
<i>Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	4 à 150 "
— <i>Cooki foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	5 à 25 "
— <i>nigro-marginatum (Saundersi)</i> . . . . .	2 à 6 "
— <i>tenax</i> . . . . .	1 à 2 "
le cent . . . . .	75 "
très-fort . . . . .	50 "
— — <i>atropurpureum</i> . . . . .	15 à 50 "
— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	40 à 200 "
— <i>Veitchi</i> . . . . .	3 à 150 "
Les <i>Phormium</i> , ou Lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles engainantes gladiiformes, constituent le plus luxueux ornement dont on puisse décorer les pelouses en été.	
4014. <i>Phycella corusca</i> (FLORE, IV, 419). . . . .	5 "
Amaryllidée mignonne d'un rouge étincelant.	
<i>Phygellus capensis</i> (FLORE, XI, 73). . . . .	1 "
Longues fleurs pendantes, d'un rouge vif, à gorge jaune.	

	Fr. C.
<i>Phyllica capensis</i> . . . . .	2 "
<i>Physianthus albens</i> . . . . .	2 "
Ses fleurs blanches retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Cet arbuste passe l'été en plein air.	
<i>Pimelea decussata</i> . . . . .	1 "
— <i>ligustrina</i> . . . . .	2 à 40 "
— <i>spectabilis</i> . . . . .	3 "
Les <i>Pimelea</i> sont des arbrisseaux élégants, à feuillage mignon, à très-jolies fleurs blanches ou rosées, en têtes terminales.	
<i>Pinus longifolia</i> . . . . .	2 "
— <i>palustris</i> . . . . .	2 "
<i>Pittosporum crassifolium</i> (FLORE, XXI, 13) . . . . .	4 à 10 "
— <i>floribundum</i> . . . . .	2 "
— <i>macrophyllum foliis variegatis</i> . . . . .	2 à 3 "
— <i>Mayi</i> . . . . .	2 "
— <i>sinense foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
Les <i>Pittosporum</i> sont de charmants arbrisseaux à feuilles coriaces, à fleurs blanches ou jaunâtres, odorantes.	
<i>Pleroma elegans</i> (FLORE, XV, 61) . . . . .	4 à 25 "
Très-belle plante extrêmement florifère, à joli feuillage et à grandes fleurs d'un pourpre violacé.	
— <i>macrantha</i> . . . . .	2 "
— — <i>floribunda</i> . . . . .	4 "
<i>Podocarpus Blumei</i> . . . . .	15 à 25 "
<i>Podolobium heterophyllum</i> . . . . .	3 "
<i>Poinciana Gilliesi</i> (FLORE, I, 55) . . . . .	2 "
Grappes terminales de grandes fleurs jaunes, ornées de longs filaments staminaux du plus riche pourpre cocciné.	
4019. <i>Polianthes tuberosa foliis varieg.</i> . . . .	2 "
La Tubéreuse à feuillage panaché, à fleurs blanches d'une odeur exquise.	
<i>Polygala Dalmaisiana</i> . . . . .	1 à 100 "
<i>Portulacaria afra</i> . . . . .	1 "
2803. <i>Primula capitata cærulea, pièce</i> . . . . .	1 "
les douze . . . . .	10 "
2807. — <i>Charlieriana</i> . . . . .	2 "
2808. — <i>cortusoides alba lilacina fimbriata (Lemoine)</i> . . . . .	1 "
Fleur blanche à revers lilas, fimbriée, légèrement ponctuée sur les bords de la corolle.	
2814. — — <i>amœna grandiflora</i> (FLORE, XVIII, 163) . . . . .	50
Très-grande fleur d'un pourpre magenta très-brillant.	
2815. — — — <i>lilacina (FL., XIX, 35)</i> . . . . .	50
2809. — — <i>Amélie (D'huyvetter)</i> . . . . .	2 "
Fleur d'un rose vif.	
2810. — — <i>Caroline (D'huyvetter)</i> . . . . .	2 "
Fleur d'un carmin pâle lilacé.	
2811. — — <i>clarkiflora (Lemoine)</i> . . . . .	1 "
Fleur d'un rouge magenta, lobes découpés et fimbriés.	
2812. — — <i>Eugénie (D'huyvetter)</i> . . . . .	2 "
Fleur d'un rose très-tendre, lobes dentelés.	
2813. — — <i>fimbriata oculata (Lemoine)</i> . . . . .	1 "
Fleur très-large, bien faite, fimbriée, d'un violet clair à centre blanc s'irradiant jusqu'aux bords de la corolle.	
2817. — — <i>Joséphine (D'huyvetter)</i> . . . . .	2 "
Fleur incarnate au-dessus, lilacée en dessous.	
2818. — — <i>lilacina marginata (Lemoine)</i> . . . . .	1 "
Fleur de forme parfaite, d'un blanc pur finement bordé d'un feston lilas tendre.	

Fr. C.

2819. *Primula cortusoides* Louise (D'huyvetter). . . . . 2 "

Fleur de couleur mauve.

2821. — — *Régine* (D'huyvetter) . . . . . 2 "

Fleur blanche, légèrement teintée de violet.

2822. — — *vincæflora* (Lemoine). . . . . 1 "

Fleur large, de forme parfaite, imbriquée et arrondie, bleu de ciel avec un grand œil blanc au centre.

2823. — — *violacea* (Lemoine) . . . . . 1 "

Fleur moyenne, de belle forme, d'un violet foncé.

2833. — *denticulata* . . . . . 1 "

2842. — *japonica* (FLORE, XIX, 31). . . . . 1 "

*Pronaya elegans*. . . . . 4 "

Élégant arbuste à fleurs d'un bleu clair.

*Prostanthera Lasianthus*. . . . . 2 "

— *nivea* . . . . . 2 "

Arbustes aromatiques à petites feuilles et à grandes et belles fleurs blanches, mouchetées de lilas chez le *Lasianthus* et de blanc pur chez le *nivea*.

*Pultenæa flava* . . . . . 2 "

— *stricta* . . . . . 2 "

Nombreuses et folies fleurs jaunes, striées de rouge.

*Punica Granatum* . . . . . n 50

— *Comte de Taverna* . . . . . 2 "

— *flore albo pleno* . . . . . 1 "

— — — *prolifera* . . . . . 1 "

— — — *à fruit aigre* . . . . . 1 "

— — — *à gros fruit, de Malte* . . . . . 1 "

— — — *à gros grains blancs*. . . . . 1 "

— — *Legrellei flore pleno* (FLORE,

XIII, 175). . . . . 1 "

Superbe Grenadier à fleurs très-belles, très-doubles, d'un rouge saumon bordé de blanc.

— — *monstrueux d'Espagne* . . . . . 1 "

— — *de Provence* . . . . . 1 "

— — *sans pepins*. . . . . 1 "

Les Grenadiers sont un magnifique ornement pour les avenues, les terrasses, les perrons, etc., où on peut les associer avantageusement avec les *Orangers* et les *Myrtes*.

*Pyrethrum hybridum Golden Feather* . . . . . n 50

Variété naine à feuillage jaune, propre pour bordures de corbeilles.

— — *laciniatum*. . . . . n 50

Variété remarquable par ses feuilles gracieusement laciniées, d'un jaune orangé, plus naine et plus élégante, pour bordures, que la variété précédente.

*Quercus glabra* . . . . . 2 à 5 "

Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles; elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (littoral sud et ouest).

— *Ilex Fordii, en pots* . . . . . 3 "

— *ilicifolia*. . . . . 2 "

— *striata, en pots*. . . . . 5 à 10 "

*Raphiolepis ovata* . . . . . 1 50

les douze . . . . . 15 "

— *salicifolia* . . . . . 2 "

Arbustes à feuilles persistantes, à fleurs blanches ou roses, en grappes.

1019. *Reineckia carnea foliis albo-vittatis* 1 "

Charmant plante japonaise à feuilles rubanées de blanc.

*Rhipidodendron distichum majus* . 5 à 50 "

*Aloe* d'une grande rareté.

*Rhynchospermum jasminoides* . . . . . 2 "

— — *foliis albo-variegatis*. . . . . 2 "

— — *aureo-variegatis* . . . . . 2 "

Fr. C.

*Rhynchospermum pulchrum* . . . . . 2 "

Les *Rhynchospermum* sont des arbrisseaux sarmenteux à feuilles coriaces, à charmantes petites fleurs blanches, odorantes.

*Richardia africana* (*Calla æthiopica*) . . . . . 1 "

les douze . . . . . 9 "

Feuilles d'un vert brillant, grande spathe d'un blanc pur, odorante.

— *albo-maculata* ( ) (FLORE, XXI,

165), *en pots* . . . . . n "

Plante d'appartement à feuillage d'un vert foncé, vernissé, tout moucheté de blanc de neige, surmonté d'un cornet blanc, d'un charmant effet.

*Rochea falcata* . . . . . 1 "

Très-beau corymbe terminal de fleurs écarlates.

*Rœzlia regia* . . . . . 5 "

1061. *Rohdea crinita* . . . . . 10 "

1062. — *japonica foliis albo-variegatis* 2 "

1064. — — *macrophylla foliis aureo-*

*marginatis*. . . 3 à 25 "

*Rondeletia anomala* . . . . . 2 "

*Rubus australis* . . . . . 2 "

Très-curieuse espèce à feuilles dissectées.

*Saxifraga filamentosæ*. . . . . n 50

— *Fortunei* . . . . . 1 "

— *sarmentosa*. . . . . n 50

— *tricolor* (FLORE, XXI, 125) . . . . . 1 "

les douze . . . . . 10 "

Charmant *Saxifrage* propre pour corbeilles et rocailles, à feuillage vert foncé maculé de vert pâle, de carmin, de jaune et de blanc, d'un très-gracieux effet. Elle donne de longs filaments, à l'extrémité desquels naissent de jeunes plantes.

— — — *elegans*. . . . . 3 "

*Scutellaria pulchella purpurea* . . . . . 2 "

*Sedum aizoides variegatum* . . . . . n 50

— *carneum foliis variegatis* . . . . . n 50

*Sempervivum Bolli*. . . . . n 50

— *chlorochrysum* . . . . . 1 "

— *ciliatum*. . . . . 1 "

— *velutinum* . . . . . 1 "

*Senecio macroglossus* (FLORE, XXI, 67). 1 "

*Senecio* grimpant à feuille de Lierre, d'un vert gai, à grandes fleurs d'un jaune clair, propre à orner les colonnettes, treillis, etc.

— *pulcher* . . . . . 2 "

*Sibthorpia europæa*. . . . . 1 "

Excellentes plante rampante pour corbeilles, à joli feuillage minuscule, orbiculaire, retombant.

— — *foliis variegatis* . . . . . 3 "

*Skimmia fragrans* . . . . . 1 "

— *japonica*. . . . . 1 "

les douze . . . . . 10 "

Charmant arbuste à fleurs blanchâtres, à belles baies d'un rouge corail en panicle. Ne gèle pas à l'exposition du nord.

— — *femina*. . . . . 1 "

— — *mascula*. . . . . 1 "

— — *oblata* . . . . . 1 "

les douze . . . . . 10 "

— — — *foliis variegatis* . . . . . 3 "

*Solanum Capsicastrum*. . . . . 1 "

Très-joli arbuste se couvrant de fleurs blanches, auxquelles succèdent de petits fruits du plus bel orange.

— — *foliis variegatis, tête greffée* . 1 à 3 "

— *hybridum Hendersoni* . . . . . 2 "



	Fr. C.
<i>Solanum hybridum Ivory</i> . . . . .	1 "
— — <i>Weatherhillii foliis variegatis</i> . . . . .	2 "
<i>Sollya Drummondii</i> . . . . .	2 "
— <i>heterophylla</i> . . . . .	1 "

Arbustes grêles, volubiles, à nombreuses fleurs en clochettes, d'un beau bleu.

<i>Sparmannia africana</i> . . . . .	.2 à 50 "
--------------------------------------	-----------

Arbuste du Cap à feuillage cotonneux, à nombreuses fleurs en grappes, très-jolies, blanches à anthères jaunes, et se renouvelant constamment.

5. <i>Stapelia deflexa</i> . . . . .	2 "
7. — <i>europæa</i> . . . . .	2 "
8. — <i>furcata</i> . . . . .	2 "
40. — <i>hirsuta</i> . . . . .	2 "
13. — <i>Munbyana</i> . . . . .	2 "
30. — <i>mutabilis</i> . . . . .	2 "
14. — <i>Nasserini</i> . . . . .	2 "
15. — <i>picta</i> . . . . .	2 "
34. — <i>Planti</i> . . . . .	2 "
23. — <i>tubata</i> . . . . .	2 "
31. — <i>variegata</i> . . . . .	2 "
32. — <i>Woodfordi</i> . . . . .	2 "

Les *Stapelia* sont des plantes grasses sans feuilles, à tiges prismatiques, dentées, à grandes fleurs très-étranges de forme et de coloris; ce sont plutôt des plantes de serre chaude, mais ne requérant, en hiver, d'autre précaution que de les préserver de tout arrosement; nous pouvons néanmoins les caser ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie pour voir s'épanouir leurs fleurs bizarres.

<i>Statice arborea</i> . . . . .	2 "
— <i>Holfordi</i> . . . . .	3 à 6 "
— <i>imbricata</i> . . . . .	3 "
— <i>macrophylla</i> . . . . .	2 "

<i>Stauntonia hexaphylla</i> . . . . .	.5 à 10 "
— <i>latifolia</i> . . . . .	.5 à 10 "

<i>Stenocarpus Cunninghami</i> ( <i>Agnostus sinuatus</i> ) (FLORE, III, 189) . . . . .	.4 à 25 "
— <i>integrifolius</i> . . . . .	.3 à 15 "

Arbrisseaux d'un aspect ornemental, à larges feuilles luisantes, à fleurs ou élégantes ombelles axillaires, d'un beau rouge à styles jaunes.

<i>Stylidium adnatum</i> . . . . .	3 "
— <i>suffruticosum</i> . . . . .	3 "

Fleurs curieuses et jolies, petites, ordinairement roses ou blanches.

<i>Styphelia tubiflora</i> . . . . .	3 "
--------------------------------------	-----

Fleurs de premier ordre, à tube renflé, d'un rouge ponceau vif.

<i>Swainsonia alba</i> . . . . .	2 "
— <i>Ferrandi atropurpurea</i> . . . . .	2 "
— <i>Grayi</i> . . . . .	2 "
— <i>Osbornei</i> . . . . .	2 "
— <i>Rollissoni</i> . . . . .	2 "

Les *Swainsonia* sont ligneux et prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs.

53. <i>Tacsonia Buchanani</i> . . . . .	2 "
79. — — <i>foliis aureo-maculatis</i> . . . . .	5 "
60. — <i>eriantha</i> (FLORE, XVIII, 159) . . . . .	2 "
54. — <i>igneae</i> . . . . .	2 "
75. — <i>insignis</i> . . . . .	5 "
47. — <i>sanguinea</i> . . . . .	2 "
74. — <i>splendens</i> . . . . .	3 "

	Fr. C.
59. <i>Tacsonia Van Volxemi</i> . . . . .	2 "

Précieuses *Passiflores* de serre froide, fleurissant abondamment pourvu qu'on leur donne des vases progressivement plus grands et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas ménagés.

<i>Tecoma australis</i> . . . . .	1 "
— <i>capensis</i> . . . . .	1 "
— <i>jasminoides</i> . . . . .	1 "
— — <i>alba magna</i> . . . . .	2 "
— — — <i>splendida</i> . . . . .	2 "
— <i>mirabilis</i> . . . . .	2 "

Arbustes à tiges droites, ou grimpants, à feuilles ailées, à fleurs en grappes, assez grandes, fort belles, diversement colorées.

<i>Templetonia retusa</i> . . . . .	2 "
-------------------------------------	-----

Arbrisseau à joli feuillage spathulé, à grandes et belles fleurs d'un rouge vif.

<i>Testudinaria elephantipes</i> ( <i>Tamus</i> ), très-fort. . . . .	10 à 100 "
--	------------

Plante curieuse et remarquable par sa souche qui ressemble à une carapace de tortue; les tiges annuelles, qui sortent du sommet de cette masse, sont grêles et portent des feuilles cordiformes à nervures réticulées, et des fleurs en grappes axillaires pendantes, ressemblant à des chatons jaunes verdâtres.

<i>Teucrium aureum</i> . . . . .	1 "
<i>Thea Bohea</i> . . . . .	2 "
— <i>japonica</i> . . . . .	2 "
— — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	2 "
— <i>viridis</i> . . . . .	2 "

Les feuilles des *Thea* constituent le thé du commerce.

<i>Thibaudia acuminata</i> . . . . .	6 "
— <i>macrophylla</i> . . . . .	10 "
— <i>vacciniifolia</i> . . . . .	3 "

<i>Torreya bogotensis</i> . . . . .	.5 à 10 "
— <i>Humboldtiana</i> . . . . .	.3 à 8 "

<i>Tremalia</i> ?? <i>villosa</i> . . . . .	2 "
---	-----

<i>Trichinium Manglesii</i> (FLORE, XXIII, 61) . . . . .	2 "
--	-----

1244. <i>Tricyrtis spec. foliis eleganter striatis</i> (FLORE, XVIII, I) . . . . .	50
les douze . . . . .	5 "

Panachure très-belle.

4210. <i>Tropæolum azureum grandiflorum</i> (FLORE, II, 1846, mai, pl. VII) . . . . .	3 "
---	-----

Capucine à fleurs bleues.

4215. — <i>bachyceras</i> (FLORE, IV, 369) . . . . .	3 "
4227. — <i>tricolorum grandiflorum</i> . . . . .	75
les douze . . . . .	7 50

<i>Uhdea pyramidata</i> . . . . .	1 "
-----------------------------------	-----

<i>Vaccinium erythrinum</i> (FLORE, XI, 81) . . . . .	5 "
---	-----

Charmantes fleurs rouges en grelot.

3324. <i>Vallota purpurea</i> ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	2 50
3325. — — <i>major</i> ( " ) . . . . .	5 "
42. <i>Veronica</i> <i>hyb. Claudine</i> (Willermoz) . . . . .	50
47. — — <i>Diogène</i> (Lemoine) . . . . .	50
48. — — <i>Erasme</i> (Lemoine) . . . . .	50
35. — — <i>Gloire de Lorraine</i> (Lemoine) . . . . .	50
4. — — <i>Hendersoni alba</i> ( <i>Lejeune</i> ) . . . . .	50
39. — — <i>Lindleyana humilis</i> . . . . .	50
31. — — <i>Mad. Henry-Jacotot</i> . . . . .	50
29. — — <i>Mad. Marie Boucharlat</i> . . . . .	50
41. — — <i>Mad. Trezel</i> . . . . .	50
33. — — <i>multiflora</i> . . . . .	50

	Fr. C.
46. <i>Veronica hybrida</i> Murillo (Lemoine) "	50
30. — — <i>rubra splendida</i> (Boucharlat) "	50
45. — — <i>Socrate</i> (Lemoine) . . . "	50
38. — — <i>speciosa imperialis</i> (Boucharlat)	
(FLORE, XXII, 97) . . . "	50

Les *Veronica* sont des plantes sous-ligneuses donnant des grappes de fleurs violettes, bleu clair, roses, rouges, blanches, etc.

<b>Viburnum Tinus</b> ( <i>Laurus Tinus</i> ) . . .	1 à 5 "
— — en pyramide, ou à tige avec belle couronne. Les dimensions et prix seront donnés par correspondance.	

Bel arbrisseau donnant de nombreuses ombelles de fleurs blanches.

<b>Witensia corymbosa</b> . . . . .	4 à 8 "
-------------------------------------	---------

Iridée ligneuse à feuillage élégant, en éventail, à petites fleurs d'un bleu vif, garnies d'étamines jaunes, formant un charmant corymbe.

<b>Yucca albo-spica</b> (FLORE, XVII, 110)	5 à 25 "
--	----------

	Fr. C.
<b>Yucca aloifolia</b> . . . . .	2 à 4 "
— — <i>foliis variegatis, forts</i> . . . . .	.5 à 50 "
— <i>baccata</i> . . . . .	50 "
— <i>canaliculata</i> . . . . .	10 à 30 "
— <i>Draconis</i> . . . . .	.5 à 15 "
— <i>filamentosa foliis variegatis</i> . . . . .	15 à 75 "
— <i>gloriosa medio stricta</i> (FLORE, XXIII, 53). . . . .	200 "
— <i>lutescens</i> . . . . .	.15 "
— <i>quadricolor, forts</i> . . . . .	15 à 100 "
— <i>recurvata</i> . . . . .	1 à 5 "
— <i>stricta (angustifolia)</i> . . . . .	5 à 100 "
— <i>Treculiana</i> . . . . .	10 à 75 "
— <i>Whipplei</i> . . . . .	.5 à 10 "

Les *Yucca* sont des plantes de beaucoup d'effet, à feuillage lancéolé ou ensiforme, à tige florale formant une jolie pyramide de fleurs pendantes, blanchâtres, de la forme d'une petite Tulipe.

## SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

### AZALEA INDICA,

disponibles d'août en mars-avril.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

### CACTÉES.

Les *Cactées* sont des plantes grasses à tiges très-charnues, de formes très-bizarres, très-étranges et très-diverses, ordinairement sans feuilles, à fleurs généralement très-belles, d'une ampleur insolite, à coloris diversifiés, riches et éclatants : le blanc, l'orangé, le jaune, le rouge vif, etc., y étalent leurs nombreuses nuances ; un grand nombre d'entre elles exhalent de suaves odeurs. Elles sont d'une culture facile et exigent peu de soins. Les amateurs les collectionnent avec passion.

	Fr. C.		Fr. C.
82. <i>Astrophytum myriostigma</i> . . . . .	30 "	24. <i>Cereus nycitalus</i> . . . . .	2 "
3. <i>Cereus Bonplandi</i> . . . . .	2 "	561. — <i>obtusius</i> . . . . .	3 "
560. — <i>Bridgesii</i> . . . . .	6 "	26. — <i>Ocamponis</i> . . . . .	3 "
4. — <i>cærulescens</i> . . . . .	6 "	240. — <i>peruvianus monstrosus</i> . . . . .	3 à 5 "
504. — <i>chalibæus</i> . . . . .	4 "	369. — <i>Pitajaya</i> . . . . .	2 "
6. — <i>colubrinus</i> . . . . .	2 "	486. — <i>rostratus</i> . . . . .	2 "
8. — <i>Donkelaari</i> . . . . .	3 "	509. — <i>rotatus</i> . . . . .	10 "
11. — <i>flagelliformis</i> . . . . .	2 "	500. — <i>serpentinus albispinus</i> . . . . .	5 "
12. — <i>flagriformis</i> . . . . .	2 "	506. — <i>Spachianus</i> . . . . .	5 à 8 "
493. — <i>formosus monstrosus</i> . . . . .	4 "	28. — <i>speciosissimus</i> . . . . .	2 "
14. — <i>geometrizans</i> . . . . .	2 à 8 "	30. — <i>tuberosus</i> . . . . .	3 "
16. — <i>grandiflorus</i> . . . . .	2 "	31. — <i>Tweediei</i> . . . . .	3 "
494. — <i>Jamacaru</i> . . . . .	5 "	394. <i>Echinocactus bicolor</i> . . . . .	12 "
495. — — <i>cyaneus</i> . . . . .	6 "	41. — <i>castanoides</i> . . . . .	2 à 4 "
599. — <i>lanopleatus</i> . . . . .	8 "	42. — <i>concinus</i> . . . . .	2 "
203. — <i>leptophis</i> . . . . .	2 "	47. — <i>denudatus</i> . . . . .	6 "
18. — <i>Macdonaldi</i> . . . . .	2 "	49. — <i>electracanthus, fort.</i> . . . .	100 "
507. — <i>macrogonus</i> . . . . .	10 "	56. — <i>gibbosus leucodictus</i> . . . . .	4 à 8 "
572. — <i>Maletianus</i> . . . . .	2 "	259. — <i>grandicornis</i> . . . . .	.6 à 12 "
22. — <i>Martianus</i> . . . . .	2 "	66. — <i>hyptiacanthus</i> . . . . .	.5 à 10 "



	Fr. C.		Fr. C.
521. <i>Echinocactus</i> Labouretianus. . . . .	12 n	287. <i>Echinopsis</i> Rohlandii. . . . .	2 n
446. — lamellosus. . . . .	10 n	527. — Scheerii . . . . .	3 à 6 n
72. — lancifer . . . . .	10 n	288. — Schelhasii . . . . .	2 à 5 n
331. — Linkii . . . . .	1 à 2 n	342. — tricolor. . . . .	3 n
444. — lophothele. . . . .	20 n	140. — turbinata . . . . .	2 à 5 n
459. — spinosior . . . . .	20 n	290. — Verschaffelti . . . . .	5 n
76. — mamillosus . . . . .	1 à 10 n	141. — Zuccariniana . . . . .	2 à 4 n
les douze . . . . .	10 n	142. — — cristata. . . . .	3 n
553. — — rubescens . . . . .	2 n	45. <i>Malacocarpus</i> corynodes. . . . .	1 n
77. — minax . . . . .	5 à 10 n	les douze . . . . .	10 n
78. — Mirbelii . . . . .	10 n	345. <i>Mamillaria</i> albicans . . . . .	1 à 6 n
80. — Monvillei . . . . .	4 à 30 n	les douze. . . . .	10 n
447. — Odieri . . . . .	6 à 12 n	293. — angularis . . . . .	2 à 3 n
85. — Ottonis . . . . .	1 à 5 n	295. — bicolor. . . . .	2 n
454. — — tortuosus . . . . .	3 n	177. — Bocasana . . . . .	2 à 3 n
86. — Ourselianus . . . . .	5 à 8 n	427. — castanoides . . . . .	4 n
525. — platyceras . . . . .	15 n	428. — — cristata. . . . .	8 n
91. — porrectus . . . . .	4 à 6 n	154. — centricirrha longispina . . . . .	8 n
450. — pumilus . . . . .	3 n	551. — cirrhifera . . . . .	4 n
538. — recurvus . . . . .	10 n	416. — — spinis rufis. . . . .	5 n
93. — robustus . . . . .	15 n	160. — — varietas . . . . .	3 à 5 n
95. — Scopa . . . . .	4 n	376. — conopsea . . . . .	2 à 8 n
448. — — cristatus . . . . .	10 n	346. — crassispina. . . . .	2 à 5 n
564. — Seegeri . . . . .	10 n	les douze . . . . .	20 n
99. — sinuatus . . . . .	25 n	163. — crocidata . . . . .	4 n
382. — species . . . . .	6 n	372. — crucigera . . . . .	3 n
379. — — . . . . .	6 n	164. — decipiens . . . . .	1 à 6 n
443. — — nova ( <i>Engelmann</i> ). . . . .	6 n	les douze. . . . .	10 n
102. — tabularis . . . . .	2 à 5 n	166. — densa . . . . .	1 n
105. — Treculianus . . . . .	15 n	168. — — echinata . . . . .	2 à 3 n
399. — undulatus . . . . .	25 n	171. — discolor . . . . .	2 n
2. <i>Echinocereus</i> Blankii. . . . .	3 n	174. — elephantidens. . . . .	2 n
5. — candicans . . . . .	2 à 10 n	555. — elongata intertexta . . . . .	2 n
532. — — Dumenilianus. . . . .	8 n	245. — Emundtsiana . . . . .	3 à 8 n
531. — — robustior . . . . .	2 à 5 n	305. — erecta . . . . .	3 à 6 n
114. — cinerascens . . . . .	2 à 4 n	573. — flavescens . . . . .	4 n
115. — cirrhiferus . . . . .	3 n	601. — gigantothele . . . . .	2 n
480. — gladiatus . . . . .	5 n	178. — — Scheidweileriana. . . . .	1 à 5 n
273. — glycimorphus . . . . .	6 n	179. — gracilis . . . . .	1 à 2 n
118. — pentalophus . . . . .	2 n	307. — — pulchella . . . . .	1 n
471. — — leptacanthus . . . . .	2 n	183. — Lehmanni . . . . .	2 à 6 n
279. — pleiogonus . . . . .	5 n	184. — longimamma . . . . .	3 n
119. — stramineus . . . . .	3 à 10 n	185. — magnimamma. . . . .	15 n
281. — trichacanthus . . . . .	4 n	438. — micans . . . . .	10 n
464. <i>Echinopsis</i> cristata . . . . .	3 à 5 n	186. — nivea . . . . .	2 à 10 n
283. — Decaisniana . . . . .	3 n	436. — nobilis . . . . .	15 n
337. — erythrina . . . . .	20 n	411. — Odieriana rubra . . . . .	5 n
123. — Eyriesii . . . . .	1 à 5 n	192. — pentacantha . . . . .	1 à 5 n
51. — Fauveli . . . . .	1 à 8 n	194. — polyedra . . . . .	2 à 8 n
285. — Huottii . . . . .	4 n	316. — Praelii . . . . .	2 à 4 n
565. — Maximiliana . . . . .	3 n	317. — pretiosa . . . . .	2 n
125. — multiplex . . . . .	1 à 8 n	356. — pulchella . . . . .	1 à 2 n
les douze . . . . .	10 n	357. — pyramidalis . . . . .	2 n
127. — oxygona . . . . .	1 à 8 n	198. — quadrispina . . . . .	2 à 5 n
133. — Pentlandii . . . . .	2 à 4 n	les douze. . . . .	20 n
les douze. . . . .	20 n	320. — raphidacantha . . . . .	5 n
598. — — ferox . . . . .	2 n	358. — rhodantha . . . . .	2 à 5 n
597. — pulchella . . . . .	4 n	575. — ruberrima . . . . .	5 n

	Fr. C.		Fr. C.
202. <i>Mamillaria Schiedeana</i> . . . . .	2 "	592. <i>Opuntia floccosa</i> . . . . .	3 "
414. — <i>Schogiana</i> . . . . .	6 "	393. — <i>humilis</i> . . . . .	3 "
360. — <i>Seegeri</i> . . . . .	.5 à 10 "	227. — <i>monacantha variegata</i> . . .	1 à 3 "
203. — <i>senilis</i> (FLORE, XXI, 27). .	.5 à 10 "	228. — <i>Pentlandii</i> . . . . .	2 à 4 "
361. — <i>setispina</i> . . . . .	2 "	591. — <i>pulverulenta</i> . . . . .	3 "
380. — <i>species</i> . . . . .	4 "	594. — <i>Salmiana</i> . . . . .	1 à 2 "
378. — — . . . . .	3 "	230. — <i>senilis</i> . . . . .	2 "
364. — <i>sphacelata</i> . . . . .	3 "	401. — <i>tunicata</i> . . . . .	2 à 5 "
205. — <i>sphaerotricha</i> . . . . .	2 "	593. — <i>Turpini</i> . . . . .	2 "
374. — <i>stellaris</i> . . . . .	3 "	595. <i>Phyllocactus anguliger</i> . . . .	2 "
211. — <i>sulcolanata</i> . . . . .	3 "	231. — <i>Edwardsi</i> . . . . .	2 "
435. — <i>sulphurea</i> . . . . .	8 "	397. <i>Pilocereus Dautwitzii</i> (FLORE,	
323. — <i>uberiformis</i> . . . . .	3 à 6 "	XXI, 33) . . . . .	.50 à 75 "
214. — <i>uncinata</i> . . . . .	2 "	327. — <i>Hoppenstedti</i> . . . . .	.150 "
215. — <i>vetula</i> . . . . .	2 "	236. — <i>senilis</i> . . . . .	.15 à 50 "
217. — <i>Wildiana</i> . . . . .	2 à 5 "		
424. — — <i>plerostigma</i> . . . . .	4 "	605. <i>Euphorbia havanensis</i> . . . .	5 "
224. <i>Opuntia clavarioides</i> . . . . .	2 "	606. — — <i>cristata</i> . . . . .	5 à 25 "
590. — <i>cylindrica</i> . . . . .	2 "	603. — <i>meloformis</i> . . . . .	2 à 5 "
589. — <i>dejecta</i> . . . . .	2 "	607. — <i>neriifolia</i> . . . . .	5 "
226. — <i>diademata</i> . . . . .	3 "	604. — <i>polygona</i> . . . . .	1 à 5 "

## CAMELLIAS, disponibles d'août en mars.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

## CANNA (BALISIER D'INDE).

Les *Canna* ou *Balisiers d'Inde* se développent luxueusement en pleine terre, en plein air, pendant l'été, et y étalent leurs amples feuilles diversement colorées, surmontées de superbes épis de fleurs de teintes variées, allant du jaune pâle au jaune foncé, à l'orange, au saumon et aux rouges des divers tons. On les plante quand les gelées ne sont plus à craindre; on les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette garnie de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau, le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau dans les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation.

100 CANNA en plusieurs variétés distinctes, à notre choix : 20 francs.

Pièce : 50 centimes. — Douze variétés : 5 francs.

N <sup>os</sup>	Hauteur.	N <sup>os</sup>	Hauteur.
105. <i>Discolor</i> . Feuillage pourpre . . .	2 <sup>m</sup> 00	299. <i>Marmorata</i> . Vert marbré de pourpre	1 <sup>m</sup> 00
178. <i>Annei</i> . Vert glauque . . . . .	2 <sup>m</sup> 50	300. <i>Brenningsi</i> . Vert strié de jaune .	1 <sup>m</sup> 10
248. <i>Caledoniensis</i> . Vert . . . . .	2 <sup>m</sup> 20	301. <i>Admiration</i> . Vert à nervures pourpres	2 <sup>m</sup> 00
256. <i>Involventifolia</i> . Vert. . . . .	1 <sup>m</sup> 50	302. <i>Coquet</i> . Vert à nervures pourpres.	1 <sup>m</sup> 40
272. <i>Zebrina nana</i> . Pourpre . . . . .	1 <sup>m</sup> 40	303. <i>Majestueux</i> . Pourpre noirâtre . .	1 <sup>m</sup> 60
274. <i>Peruviana</i> . Vert . . . . .	1 <sup>m</sup> 70	304. <i>Surprise</i> . Vert. . . . .	2 <sup>m</sup> 00
282. <i>Louis Gullino</i> . Vert à nervures pour-		306. <i>Ernst Benary</i> ( <i>C. Huber</i> ). Vert. .	1 <sup>m</sup> 00
pres . . . . .	2 <sup>m</sup> 00	309. <i>Président Faivre</i> ( <i>n</i> ). Pourpre noir	1 <sup>m</sup> 00
285. <i>Maréchal Vaillant</i> ( <i>Sisley</i> ). Pourpre	2 <sup>m</sup> 30	311. <i>Victor Lemoine</i> ( <i>n</i> ). Vert . . .	1 <sup>m</sup> 20
286. <i>Député Hénon</i> ( <i>n</i> ). Vert. . . .	2 <sup>m</sup> 20	312. <i>Antoine Garin</i> ( <i>n</i> ). Vert . . .	1 <sup>m</sup> 20
293. <i>Jean Van Dael</i> ( <i>n</i> ). Vert . . . .	2 <sup>m</sup> 00	313. <i>Liseré d'or</i> ( <i>n</i> ). Vert . . . . .	1 <sup>m</sup> 30
296. <i>Daniel Hooibrenk</i> ( <i>n</i> ). Vert . .	1 <sup>m</sup> 50	316. <i>L'or de Toulouse</i> ( <i>F. Brassac</i> ). Vert	1 <sup>m</sup> 10
297. <i>Prémices de Nice</i> . Vert . . . . .	2 <sup>m</sup> 50	317. <i>Pierre Dupont</i> ( <i>Crozy</i> ). Vert. . .	1 <sup>m</sup> 10



N <sup>os</sup>	Hauteur.	N <sup>os</sup>	Hauteur.
318. Alégatière ( <i>Crozy</i> ). Pourpre noirâtre. . . . .	1m20	321. Souvenir de Barillet-Deschamps ( <i>Crozy</i> ). Pourpre noirâtre . . .	1m70
319. Bonneti excelsa ( <i>n</i> ). Vert à nervures pourpres . . . . .	1m30	329. Zebrina superba ( <i>n</i> ). Pourpre . .	1m40
320. Original ( <i>n</i> ). Vert . . . . .	1m10	331. Secrétaire Rohner ( <i>n</i> ). Vert . .	1m10
		333. François Gaulain ( <i>n</i> ). Vert . .	1m20

## CHRYSANTHÈMES

### A grandes fleurs, pompons et japonais.

Voir notre Catalogue de plantes vivaces, arbustes, etc., N<sup>o</sup> 190, page 259.

## COLEUS.

Les *Coleus* sont particulièrement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre, de juin à novembre. On en fait de superbes corbeilles qui se distinguent par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert pâle jusqu'au noir jais. Ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées, striées diversement; elles sont entières, ou déchiquetées, ou laciniées, ou crénelées, etc. Cultivés en grands pots, les *Coleus* constituent aussi un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

Notre collection d'anciennes variétés se compose d'environ 50 sortes, dont on trouvera l'énumération dans nos précédents Catalogues; nous les offrons, avec noms, aux prix suivants :

Pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs. — Les vingt-cinq : 10 francs. — Les cinquante : 20 francs.

### NOUVEAUTÉS DE 1880.

Les *Coleus* désignés ci-après sont la quintessence de toutes les variétés le plus récemment gagnées en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en France. On y rencontre les formes les plus étranges et les plus inattendues, les coloris les plus bizarres et les plus riches. Nous les recommandons tout particulièrement aux nombreux amateurs de ce beau genre.

Pièce : 2 francs. — Douze variétés : 18 francs.

- |   |   |
|---|---|
| <p>256. <b>Acquisition.</b> Petites feuilles jaunes marbrées de vert clair, passant au pourpre dans les nervures.</p> <p>257. <b>Adelina Pattl.</b> Variété hors ligne. Les premières feuilles des jeunes plantes sont d'un blanc pur rayé de rouge, et deviennent rouge foncé.</p> <p>258. <b>Alarm.</b> Variété distincte, à larges feuilles marbrées de jaune ombré de vert, saupoudrées et parfois fortement tachetées de marron velouté.</p> <p>259. <b>Amazement.</b> Feuilles découpées en lanières jusque près du centre, à lobes quinquelobés, la partie centrale d'un vert pâle nuancé de marron, le restant diversement coloré de jaune, de blanc, de rouge et de marron.</p> <p>260. <b>Archiduc Rodolphe.</b> Grandes feuilles ondulées, carmin foncé velouté sur les bords, rouge carminé vers le centre, passant au rouge brique dans diverses parties. Une des plus brillantes variétés obtenues récemment.</p> | <p>261. <b>Beethoven.</b> Feuilles d'un blanc jaunâtre marbré de vert foncé et de jaune paille, passant au rouge le plus foncé à leur extrémité.</p> <p>262. <b>Brillant.</b> Très-grandes feuilles profondément dentelées, milieu d'un brillant laque cramoisi, ombré et lavé de cramoisi marron, bords diversement ombrés de jaune et de pourpre et bordés de rose, de vert foncé et de vert pâle.</p> <p>263. <b>Captivation.</b> Grandes feuilles profondément dentées, d'un vert luisant, flammées, au centre et sur les nervures, de jaune soufre, éclairées çà et là de rose pourpre et de blanc sur les bords.</p> <p>264. <b>Chameleon.</b> Variété très-curieuse, à feuilles longues, très-bizarres, ponctuées de blanc jaunâtre, de jaune pur, de vert rosé et de carmin.</p> <p>265. <b>Chelsea Beauty.</b> Grandes feuilles profondément dentées, le milieu et les principales veines d'un brillant laque cramoisi, entremêlé de taches marron</p> |
|---|---|

- foncé velouté, s'étendant jusqu'à la moitié des dents, qui sont ornées de cramoiis et bordées de marron passant au vert.
266. **Cherub.** Feuilles moyennes, profondément dentées, lobe terminal plus large, marron passant au rouge carminé, milieu plus foncé bordé de jaune passant au vert.
267. **Colibri.** Variété des plus méritantes, de forme trapue, à feuilles grandes, jaune paille strié et tacheté du rouge le plus intense.
268. **Elegantissimus.** Variété très-originale, à belles larges feuilles d'un jaune orangé passant au blanc pur, extrémité tachetée de rouge foncé.
269. **Flambeau.** Magnifique marron velouté, orné de dessins d'un brillant cramoiis magenta, étroitement bordé de vert olivâtre.
270. **Frau Anna Alexander.** Belles feuilles très-régulières, dont le milieu est d'un rose lilacé passant au jaune d'or, devenant vert clair vers les bords.
271. **Gaity.** Nouveauté hors ligne, d'un brillant jaune de chrome irrégulièrement tacheté de flocons cramoiis vif, se confondant dans le vert et le marron.
272. **Mirabilis.** L'une des plus belles variétés, bizarre par ses feuilles pourpres passant au jaune de soufre vers les bords.
273. **M<sup>r</sup> George Simpson.** Variété entièrement rouge, dont le milieu est plus éclatant.
274. **Nobilis.** Variété très-originale, à belles feuilles d'un jaune orangé passant au blanc pur.
275. **Non pareil.** Variété très-distincte, à feuilles fortement découpées, d'un rouge brunâtre, passant au vert foncé vers les bords.
276. **Phœbus.** Feuilles profondément dentées, milieu d'un riche cramoiis écarlate ombré plus foncé, parfois rose pâle.
277. **Princesse Clémentine.** Variété de grand mérite, très-grandes feuilles profondément dentées et gaufrées sur les bords, finement bordées de vert jaunâtre, ombrées de rouge violet au milieu.
278. **Salamander.** Pétiole rouge foncé se prolongeant jusqu'à la moitié de la feuille, devenant jaune paille et se terminant en vert, bords pourpres.
279. **Talisman.** Variété de forme trapue, à feuilles pourpres marbrées irrégulièrement de rouge cerise, coloris rare et très-distinct.
280. **Turban.** Cramoiis foncé ombré de marron pourpré, finement bordé de vert luisant.
281. **Victory.** Centre cramoiis magenta.
282. **Yellow Gem.** Variété de forme distincte, à feuilles d'un jaune clair veiné de blanc d'ivoire, fortement bullées entre les côtes, d'un vert brillant.

## DAHLIAS D'ÉLITE.

Inutile de faire ressortir ici le rôle prépondérant que les Dahlias jouent dans l'aménagement des jardins, soit en massifs, soit en corbeilles, etc. ; les nuances les plus diverses du blanc, du jaune, de l'orangé et du rouge, soit pures, soit mélangées par teintes fondues, soit enfin entremêlées d'une manière heurtée, y sont brillamment représentées.

Collection débarrassée des variétés qui ne sont pas de tout premier ordre.

Livrables en mai-juin, en BOUTURES.

Au choix de l'amateur. — *Pièce* : 1 fr. — 12 *variétés* : 10 fr. — 25 *var.* : 18 fr. — 50 *var.* : 35 francs.  
 A notre choix. — *Pièce* : 75 cent. — 12 *variétés* : 9 fr. — 25 *variétés* : 15 fr. — 50 *variétés* : 25 fr.

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, à notre choix.

*Pièce* : 1 franc. — 12 *variétés* : 10 francs. — 25 *variétés* : 18 francs. — 50 *variétés* : 35 francs.

G. signifie de grande taille. — M. de taille moyenne. — N. de taille naine.

### PREMIÈRE SÉRIE.

N<sup>os</sup>

80. **Latona (Courchat).** Blanc paille. — G.  
 105. **Criterion (Edwards).** Rose lilacé. — M.  
 123. **Bessie (Turner).** Carmin foncé. — M.  
 313. **Mont Vésuve (Demay).** Écarlate vif. — M.

N<sup>os</sup>

673. **La gitana (Miellex).** Fleur grande, rouge sang. — M.  
 777. **Le défi (Miquel).** Jaune nankin ombré et strié de rouge. — G.



- N<sup>os</sup>
815. *Proserpine (Salter)*. Rouge laque. — G.
908. *Conspicua (Guénau)*. Jaune primevère pointé de carmin. — G.
941. *Pauline Mardner (Mardner)*. Rose lilacé pointé de blanc. — G.
1130. *Faust (Poincel)*. Pourpre clair. — G.
1139. *Iphigénie*. Blanc carné strié de carmin et piqué de rouge cerise. — G.
1150. *Madame Ebeline*. Rose vif nuancé. — M.
1183. *Stolze Schneerose (Sieckmann)*. Fleur petite, blanc de neige. — G.
1211. *Victor Duffot (Duffot)*. Fleur grande, violet pourpre. — G.
1220. *Incomparable (Keynes)*. Jaune pointé de violet. — G.
1226. *Netty Buckel (Keynes)*. Rose très-clair ombré de rose plus foncé. — M.
1235. *Flora Wyatt (Keynes)*. Orange strié de rouge. — G.
1269. *Émile Mézard (Hautmulle)*. Rouge foncé pointé de jaune d'or. — G.
1274. *Geita*. Fleur grande, rose clair nuancé et bordé de lilas. — G.
1305. *Madem. Jeanne Freteau de Pény*. Fleur grande, incarnat pointé de violet. — G.
1327. *Président Brongniart*. Jaune mat bordé de jaune d'or. — G.
1343. *Yellow Boy (Fellowes)*. Jaune foncé. — M.
1361. *Caroline Taste*. Fleur grande, pourpre marron foncé. — G.
1369. *Scaramouche*. Fleur grande, cramoisi pointé de blanc. — M.
1372. *M. Martin*. Fleur grande, jaune vif légèrement pointé de rouge. — M.
1374. *Don Juan (V. de Rességuier)*. Fleur grande, orange doré. — M.
1376. *Palma Castellán*. Fleur grande, violet ardoisé. — M.
1386. *Horace*. Fleur grande, rouge sang. — M.
1387. *Mad. Baze*. Pourpre noirâtre. — M.
1388. *Mad. Brossart*. Fleur grande, rose nuancé de pourpre clair. — M.
1390. *Van Dyck*. Fleur grande, rouge laque. — G.
1396. *La perle*. Fleur grande, blanc de lait. — G.
1397. *Maria*. Fleur grande, pourpre fortement bordé de blanc. — M.
1403. *Vaterland Rose*. Fleur grande, rose vif. — M.
1405. *Gloire des Amandiers*. Fleur grande, jaune strié, ligné et marbré de pourpre. — M.
1407. *Iris*. Fleur grande, ocre pointé de jaune. — M.
1410. *Jean Bart*. Fleur moyenne, orange fortement bordé de blanc. — G.
- N<sup>os</sup>
1412. *Charivari*. Fleur grande, pourpre marbré et piqué de jaune. M.
1420. *Isabelle*. Fleur moyenne, jaune pointé de jaune isabelle. — G.
1485. *Eclat (Deegen)*. Fleur grande, lilas violacé pointé de blanc. — G.
1487. *M. Arthur de Warelles (Delesalle)*. Fleur moyenne, brunâtre nuancé de rose, strié et ligné de marron foncé. — G.
1489. *M. Grau-Despature (Grau-Despature)*. Fleur très-grande, rose vif reflété de lilas foncé. — G.
1490. *Triomphe de l'exposition de Tourcoing (A. Holbecque)*. Fleur grande, orange nuancé de brun acajou, revers des pétales violet clair. — G.
1491. *Vice-Président J. Grolez (A. Holbecque)*. Fleur grande, rose lilacé pointillé et rubané de pourpre. — M.
1496. *Mrs. Dorling Turner*. Blanc crème pointé de pourpre. — G.
1497. *Marie Fuger*. Jaune fortement bordé de pourpre. — G.
1512. *Mathias Claudius (Deegen)*. Lilas à revers bleuâtre. — M.
1526. *Princesse de Ligne*. Blanc strié de violet noirâtre. — M.
1527. *Stanislas Tétard*. Jaune paille. — M.
1528. *Docteur Faucher*. Orange saumoné nuancé de rose. — M.
1532. *Wacht am Rhein (Sieckmann)*. Pourpre foncé nuancé de violet. — M.
1533. *Gem*. Pourpre foncé pointé de jaune. — M.
1535. *Jacquié (Saison)*. Cramoisi velouté. — M.
1536. *L'africaine (Fellowes)*. Marron foncé nuancé de rouge lie de vin. — M.
1538. *Donald Beaton*. Pourpre marron. — M.
1540. *Little Kate*. Jaune chamois nuancé d'orange. — M.
1542. *Edith (Voisenon)*. Blanc pur. — M.
1546. *Bird of Passage (Church)*. Blanc bordé de rose foncé. — M.
1547. *Impératrice Eugénie (Aldebert)*. Fleur moyenne, lilas clair nuancé de blanc. — M.
1548. *Mad. de Saint-Paul (Voisenon)*. Rose violacé. — M.
1549. *M. Graindorge (Graindorge)*. Blanc crème nuancé de jaunâtre et bordé de lilas carminé. — M.
1552. *Triomphe de l'exposition de Tournai*. Écarlate. — M.
1553. *Bauduin (Le Huidoux)*. Blanc bordé de rose carminé. — M.
1554. *Bessie Wyatt (Keynes)*. Blanc bordé d'amarante. — M.
1555. *M. Lecœur (Couvreur)*. Pourpre foncé velouté. — M.

- Nos
1556. **Gloire de Paris**. Fleur moyenne, écarlate vif. — M.
1560. **Franck Tiffin**. Fleur moyenne, jaune strié et ligné de carmin. — M.
1562. **Brunette**. Fleur moyenne, blanc crème fortement bordé de cramoisi. — G.
1563. **Comtesse de Sinety** (*Anceau*). Brun buffle et orange nuancé de lilas. — G.
1565. **Clémence Isaure** (*Anceau*). Fleur énorme, jaune légèrement pointé de lilas. — G.
1568. **Clara** (*Marescq*). Lilas bordé de blanc. — G.
1569. **Harbenger** (*Fellowes*). Écarlate. — M.
1582. **Blanda** (*Deegen*). Blanc pur. — G.
1588. **Pointe de la Chapelle**. Rouge cerise vif rayé et pointé de blanc. — M.
1589. **Mad. Charles Leperdriel**. Jaune tendre lavé de carmin. — M.
1590. **Firefly**. Écarlate orangé. — M.
1592. **Alice** (*Turner*). Rose lilac légèrement strié de carmin et pointé de blanc. — M.
1593. **Louisa Haussmann**. Blanc glacé de lilas. — M.
1597. **Mad. Louis Creuzé** (*Creuzé*). Fleur grande, chamois lamé de rouge, revers des pétales nuancé de jaune isabelle. — M.
1598. **Dr George Creuzé** (*Creuzé*). Fleur grande, jaune canari bordé de blanc pur. — M.
1599. **Sancta Maria** (*Creuzé*). Fleur grande, blanc pur. — M.
1602. **Miss Bateman** (*Turner*). Jaune nuancé de rouge, parfois légèrement piqué. — M.
1604. **Purity** (*Fellowes*). Orange safrané nuancé de cramoisi. — M.
1605. **Jennie** (*Sainsbury*). Blanc pur tatoué et bordé de rose pourpre. — M.
1607. **Lord Hawke** (*Turner*). Jaune d'or piqué de rouge. — M.
1608. **Duke of Edinburgh** (*Fellowes*). Jaune foncé. — M.
1611. **Crimson King** (*Keynes*). Cramoisi. — M.
1614. **John Standish** (*Turner*). Écarlate. — M.
1615. **Mrs. Saunders** (*Turner*). Jaune clair lavé et pointé de blanc. — G.
1616. **Emily Williams** (*Keynes*). Jaune bronzé bordé et piqué de vermillon. — M.
1617. **Mrs. Boston** (*May*). Lilas. — M.
1619. **Nelly** (*Turner*). Lilas foncé bordé et tacheté de pourpre. — M.
1620. **Mrs. Fordham** (*Turner*). Rose lilacé nuancé de bleuâtre et pointé de violet. — M.
1621. **Mrs. Sinclair** (*Keynes*). Rose piqué de pourpre et largement bordé de carmin. — M.
1623. **Ovid** (*Turner*). Pourpre foncé. — G.
1626. **Mr Dix** (*Hobbs*). Écarlate. — M.
1629. **Richard Headley** (*Fellowes*). Violet pourpre bordé de lilas. — M.
- Nos
1630. **King of Primroses** (*Rawlings*). Fleur moyenne, jaune primevère. — M.
1631. **William Pringle Laird** (*Keynes*). Rose vif nuancé de lilas et strié de carmin. — M.
1633. **Jessie Gill** (*Keynes*). Jaune d'or flammé de pourpre. — M.
1639. **Kate Haslam** (*Fellowes*). Lilas lavé de rose tendre. — M.
1640. **Marchioness of Lorne** (*Keynes*). Jaune très-clair fortement bordé de pourpre. — M.
1641. **Cremorne** (*Eckford*). Jaune bordé de cramoisi. — M.
1643. **Duke of Cambridge** (*Fellowes*). Jaune safran nuancé et pointé de carmin. — M.
1645. **Hubert Turner** (*Turner*). Blanc de lait nuancé de lilas. — M.
1653. **Walter Reid** (*Eckford*). Pourpre nuancé de rouge magenta. — M.
1655. **Star of the Morning** (*Keynes*). Orange safrané. — M.
1656. **Rev. Dr Moffat** (*Keynes*). Pourpre marron noirâtre. — M.
1657. **Henry Walton** (*Keynes*). Jaune largement bordé de vermillon. — M.
1658. **Countess of Pembroke** (*Keynes*). Jaune très-clair légèrement bordé de violet pourpre. — M.
1659. **John Mac Pherson** (*Keynes*). Violet pourpre. — M.
1660. **Mrs. Charles Kimberley** (*Keynes*). Lilas vif nuancé de rose. — M.
1661. **Picotee** (*Keynes*). Jaune d'or. — M.
1662. **George Goodhall** (*Keynes*). Écarlate, nuancé d'orange sur le bord des pétales. — M.
1663. **John Cocker** (*Keynes*). Le plus foncé de tous les Dahlias, pourpre noirâtre. — M.
1666. **Rival Harris**. Rose pourpre violacé. — M.
1667. **Queen's Messenger** (*Eckford*). Pourpre vif. — M.
1668. **Julia Davis** (*Keynes*). Jaune. — M.
1669. **Mrs. Stancomb** (*Keynes*). Jaune canari légèrement pointé de carmin. — M.
1671. **Edward Purchase** (*Keynes*). Cramoisi, bord des pétales orange. — M.
1672. **Mrs. Lewington** (*Keynes*). Rose pourpre clair. — M.
1673. **Negro Boy** (*Keynes*). Pourpre noirâtre nuancé de marron. — M.
1680. **Miss Lilly Large** (*Keynes*). Cramoisi strié et tacheté d'orange et de jaune. — M.
1681. **Maria Gerring** (*Eckford*). Blanc fortement strié de pourpre foncé. — M.
1684. **John Lamont** (*Keynes*). Brun marron strié de noirâtre. — M.



- |   |  |
|---|--|
| <p>N<sup>os</sup><br/>1687. <b>Parrot</b> (<i>Keynes</i>). Jaune fortement strié et marbré d'écarlate. — M.<br/>1689. <b>Letty Coles</b> (<i>Keynes</i>). Rose clair strié et marbré de brun marron. — M.</p> | <p>N<sup>os</sup><br/>1695. <b>Rob Roy</b> (<i>Fellowes</i>). Orange pâle nuancé de jaune isabelle. — M.<br/>1697. <b>Empress of Austria</b> (<i>Turner</i>). Jaune strié de cramoisi et pointé de lilas. — M.</p> |
|---|--|

DEUXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1879, à 2 francs pièce.

- |   |   |
|---|---|
| <p>1737. <b>Attraction</b> (<i>Pierre</i>). Blanc fortement strié de pourpre. — G.<br/>1738. <b>Élégant</b> (<i>Pierre</i>). Jaune d'ocre légèrement strié de rouge. — G.<br/>1739. <b>Vicomte de Kermoisin</b> (<i>Pierre</i>). Chamois isabelle pointé de jaune. — G.<br/>1740. <b>Souvenir de M. Alfred Moreau</b> (<i>Delesalle</i>). La plus grande fleur de Dahlia connue, de forme parfaite, d'un rose carminé nuancé de blanc glacé; variété hors ligne. — G.</p> | <p>1741. <b>Madem. Anna</b> (<i>Delesalle</i>). Fleur grande, bien faite, blanche bordée et nuancée de bleuâtre; variété hors ligne. — G.<br/>1751. <b>Augustine Rougier</b> (<i>Parmain</i>). Grande fleur bombée, pourpre très-clair, souvent à moitié blanche. — G.<br/>1754. <b>Perle d'or</b> (<i>Parmain</i>). Grande fleur rouge laque pointée de jaune. — G.<br/>1755. <b>Gloire de Guiscard</b> (<i>Parmain</i>). Grande fleur orange pointée de blanc. — G.</p> |
|---|---|

TROISIÈME SÉRIE.

DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS OU A BOUQUETS.


Livrables en mai-juin, en BOUTURES.

Au choix de l'amateur. — Pièce : 1 franc. — 12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs.

A notre choix. — Pièce : 75 centimes. — 12 variétés : 9 francs. — 25 variétés : 15 francs.

Livrables dès à présent en bons TUBERCULES, à notre choix :

Pièce : 1 franc. — 12 variétés : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs.

 Les variétés dont le nom est précédé d'un astérisque (\*) sont Lilliputiens ou à bouquets.

- |  |  |
|--|--|
| <p>1772. <b>Princess Alice</b> (<i>Turner</i>). Incarnat bordé de rose clair. — N.<br/>1446. *<b>Treulichchen</b> (<i>Deegen</i>). Rose pointé de carmin. — N.<br/>1447. *<b>Julius Hammer</b> (<i>Deegen</i>). Jaune d'or pointé d'écarlate cramoisi. — N.<br/>1448. *<b>Nicolaus Lenau</b> (<i>Deegen</i>). Rose pointé de rose plus foncé. — N.<br/>1451. *<b>Deutscher Zinnoberprinz</b> (<i>Deegen</i>). Rouge laque. — N.<br/>1452. <b>Deutscher Goldmeteor</b> (<i>Deegen</i>). Jaune foncé bordé d'écarlate orangé. — N.<br/>1457. *<b>Prachtröschen</b> (<i>Deegen</i>). Cinabre carminé pointé de blanc. — N.<br/>1459. *<b>Eduard Möricke</b> (<i>Deegen</i>). Jaune d'or pointé d'écarlate, ou saumon clair bordé de jaune d'or et d'écarlate. — N.<br/>1461. <b>Joh. Szepegthy</b> (<i>Deegen</i>). Jaune foncé. — N.<br/>1467. *<b>Georg Röbel</b> (<i>Deegen</i>). Cramoisi foncé. — N.<br/>1477. *<b>Glühwürmchen</b> (<i>Deegen</i>). Écarlate feu. — N.<br/>1478. <b>Citronvogel</b> (<i>Deegen</i>). Jaune citron. — N.</p> | <p>1481. <b>Klein Liebschen mein</b> (<i>Deegen</i>). Blanc bordé de pourpre violacé. — N.<br/>1482. *<b>Kleines Silberröschen</b> (<i>Deegen</i>). Lilas argenté, souvent pointé de blanc. — M.<br/>1483. *<b>Charte d'or</b> (<i>Deegen</i>). Jaune citron vif. — N.<br/>1506. *<b>Zierde von Köstritz</b> (<i>Sieckmann</i>). Jaune canari bordé de carmin. — N.<br/>1507. *<b>Lilliputprinz</b> (<i>Sieckmann</i>). Très-petite fleur d'un rouge grenat foncé. — M.<br/>1509. *<b>Kleinod van Köstritz</b> (<i>Sieckmann</i>). Cramoisi. — N.<br/>1510. *<b>Linda</b> (<i>Henderson</i>). Jaune orangé bordé de capucine rougeâtre. — N.<br/>1513. *<b>Alabasterrose</b> (<i>Deegen</i>). Blanc pur. — N.<br/>1514. *<b>Shadow</b> (<i>Deegen</i>). Très-petite fleur d'un rose foncé. — M.<br/>1518. *<b>Hulda</b> (<i>Deegen</i>). Rouge cerise pourpré foncé pointé de rose et de blanc. — N.<br/>1519. *<b>Deutsches Ranunkelröschen</b> (<i>Sieckmann</i>). Brun marron noirâtre. — M.<br/>1573. *<b>Emotion</b> (<i>Henderson</i>). Petite fleur cramoisi pointée de blanc. — G.</p> |
|--|--|

1574. \*Dr Webb (*Henderson*). Écarlate. — N.  
 1578. \*Sacramento. Petite fleur jaune d'or bordé de jaune paille. — G.  
 1586. \*Xénophon. Cramoisi. — N.  
 1700. \*Décoration. Blanc nuancé et fortement bordé de rose. — N.  
 1703. Hero. Écarlate, centre vert. — N.  
 1705. \*Little Arthur. Amarante cramoi. — N.  
 1706. \*Little Child. Rose fortement bordé de carmin vif. — N.  
 1708. Panorama. Jaune abricoté pointé de carmin. — N.  
 1709. \*Pearl. Blanc de neige. — N.  
 1711. Rising Sun. Écarlate. — N.  
 1713. \*Velvet Gem. Cramoisi marbré de blanc. — N.  
 1714. \*Voltaire. Jaune d'or, parfois avec quelques pétales blancs. — N.  
 1717. \*Fairy Prince. Jaune isabelle pointé de jaune plus clair. — N.  
 1718. \*Hindoo. Rouge orangé, centre écarlate. — N.  
 1719. \*Junon. Blanc pur, pétales coupés. — M.  
 1721. \*Vénus. Cramoisi nuancé et pointé de pourpre. — N.  
 1726. \*Theodor Heymann (*Deegen*). Rouge très-foncé, centre noirâtre. — N.  
 1727. \*Bräutenschmuck (*Deegen*). Très-petite fleur d'un blanc pur. — N.  
 1728. \*August Malke (*Deegen*). Pourpre, parfois avec quelques pétales blancs ou avec le centre blanc. — N.  
 1729. \*Sammetkäppchen (*Deegen*). Pourpre velouté, plus pâle vers le bord. — N.  
 1730. \*Prinzessin Liebreiz (*Deegen*). Blanc légèrement rosé, strié de pourpre. — N.  
 1731. \*J. C. A. Stanze (*Deegen*). Jaune chamois orangé. — N.  
 1732. \*Amalia Härtelt (*Deegen*). Jaune d'or, centre et pointes d'un rouge violacé.  
 1733. \*Blumenfalter (*Deegen*). Rose très-pur. — N.  
 1735. \*Wilhelm Büchner (*Deegen*). Lilas, centre blanc violacé, pétales quadrilobés, légèrement pointés de jaune. — N.  
 1743. \*Tijo Wylle (*Sieckmann*). Très-petite fleur d'un rouge cochenille clair. — N.  
 1745. \*Ida Fischer (*Sieckmann*). Blanc ombré de rose tendre. — N.  
 1746. \*Fräulein Marie Wolf (*Sieckmann*). Jaune soufre bordé de rouge, centre rouge. — N.  
 1749. \*Unermüdliche (*Sieckmann*). Rose vif pointé de pourpre. — N.  
 1750. \*Alma Sonntag (*Sieckmann*). Petite fleur d'un blanc pur. — N.

## DAHLIAS NAINS POUR CORBEILLES.

Pièce : 75 centimes. — 12 plantes : 9 francs. — 25 plantes : 15 francs.

1557. Colibri. Écarlate avec un petit bouton vert au centre.  
 1722. alba nana. Blanc pur, de forme parfaite.  
 1725. Solfatara. Jaune vif.

Les trois variétés ci-dessus conviennent surtout pour corbeilles et massifs ; elles n'atteignent que 50 centimètres de hauteur et n'ont pas besoin de tuteur. Leur floraison est abondante, leurs coloris, nets et tranchés, produisent un charmant effet.

## DAHLIA EN ARBRE.

Pièce : 1 franc. — 12 plantes : 10 francs.

78. imperialis. Espèce mexicaine très-ornementale, atteignant 2 mètres de hauteur, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses.

## AUTRES DAHLIAS.

303. Empereur François-Joseph. — Pièce : fr. 1-50.  
 Beau feuillage panaché de blanc, fleur d'un lilas vif.  
 1595. vert (*Sieckmann*) (FLORE, XIX, 111). — Pièce : 1 franc.  
 Fleur moyenne, pleine, entièrement verte.  
 1724. gracilis. — Pièce : 1 franc.  
 Espèce introduite du Mexique, à fleur simple, d'un écarlate orangé.  
 1760. Elisabeth (*Migalli*). — Pièce : 1 franc.  
 Fleur bizarre, de moyenne grandeur, composée de petits fleurons doubles agrégés les uns à côté des autres, d'un pourpre foncé.





FUCHSIA D'ÉLITE. — 1<sup>re</sup> SÉRIE.

Les FUCHSIA décorent aussi bien la serre froide que les parterres en plein air; ils y étalent leurs jolies fleurs en pendeloques, simples ou doubles, des coloris les plus vifs et les plus variés.

Au choix de l'amateur. — *Pièce* : 75 centimes. — 12 *variétés* : 9 francs. — 25 *variétés* : 15 francs.  
A notre choix. — *Pièce* : 50 centimes. — 12 *variétés* : 5 francs. — 25 *variétés* : 10 francs.

Les variétés dont les noms sont précédés d'un astérisque (\*) sont à fleurs doubles.

- |   |   |
|---|---|
| 476. Don Giovanni ( <i>Banks</i> ).               | 797. *Dr Jaquin ( <i>Twrdy</i> ).             |
| 480. Lucrezia Borgia ( <i>Banks</i> ).            | 801. Jeanne Darc ( <i>Lemoine</i> ).          |
| 497. Lady Heylesbury ( <i>Bull</i> ).             | 807. George Frederick ( <i>Bull</i> ).        |
| 510. Bellone ( <i>H. Demay</i> ).                 | 808. Highland Chief ( <i>Bull</i> ).          |
| 511. Aurora superba ( <i>H. Demay</i> ).          | 811. Admiration ( <i>Bull</i> ).              |
| 516. Erecta ( <i>Williams</i> ).                  | 812. Baroness ( <i>Bull</i> ).                |
| 543. Elegance ( <i>Bull</i> ).                    | 818. *Carpeaux ( <i>Lemoine</i> ).            |
| 545. *Nonpareil ( <i>Bull</i> ).                  | 821. Général Nansouty ( <i>Lemoine</i> ).     |
| 546. *Warrior ( <i>Bull</i> ).                    | 823. *Lieutenant Zubowitz ( <i>Twrdy</i> ).   |
| 551. Harry George Henderson ( <i>Henderson</i> ). | 824. *Voix du peuple ( <i>Lemoine</i> ).      |
| 561. *Globosa multiflora ( <i>Boucharlat</i> ).   | 826. Patriote ( <i>Lemoine</i> ).             |
| 573. *Gigantea ( <i>Twrdy</i> ).                  | 829. Eclat ( <i>Lemoine</i> ).                |
| 584. Duchesse de Gérolstein ( <i>Lemoine</i> ).   | 830. *Ville de Nancy ( <i>Lemoine</i> ).      |
| 593. Mad. J. Menoreau ( <i>Lemoine</i> ).         | 835. Le phare ( <i>Lemoine</i> ).             |
| 603. Phenomenal ( <i>Banks</i> ).                 | 838. *Graf Wilcsek ( <i>Twrdy</i> ).          |
| 609. Lord Derby ( <i>Banks</i> ).                 | 839. *Mandarin ( <i>Rendatler</i> ).          |
| 617. *M. Fillion ( <i>Crousse</i> ).              | 840. Beatrice ( <i>Williams</i> ).            |
| 625. *Troubadour ( <i>Bull</i> ).                 | 841. *Capitaine Nares ( <i>Lemoine</i> ).     |
| 626. *Conqueror ( <i>Felton</i> ).                | 842. Coleridge ( <i>Lemoine</i> ).            |
| 629. Jolly ( <i>Felton</i> ).                     | 848. *Boucharlat aîné ( <i>Delesalle</i> ).   |
| 631. *Lord Calthorpe ( <i>Felton</i> ).           | 849. *Compacta superba ( <i>Boucharlat</i> ). |
| 633. *Misai ( <i>Coene</i> ).                     | 851. *Fr. Desbois ( <i>Boucharlat</i> ).      |
| 634. *Tatlo ( <i>Coene</i> ).                     | 853. *Joseph Smith ( <i>Boucharlat</i> ).     |
| 635. *Remor ( <i>Coene</i> ).                     | 854. *M. Devert ( <i>Boucharlat</i> ).        |
| 638. *Tower of London ( <i>Henderson</i> ).       | 855. *M. Deus ( <i>Boucharlat</i> ).          |
| 640. Weeping Beauty ( <i>Henderson</i> ).         | 856. Paul and Son ( <i>Boucharlat</i> ).      |
| 645. *Dreadnought ( <i>Felton</i> ).              | 857. *Schneewittchen ( <i>Klein</i> ).        |
| 647. *General ( <i>Felton</i> ).                  | 858. Earl of Beaconsfield ( <i>Laing</i> ).   |
| 648. *George Felton ( <i>Felton</i> ).            | 859. Mrs. Gadick Ditton ( <i>Todman</i> ).    |
| 654. *Formosa ( <i>Williams</i> ).                | 860. Mrs. Burroughes ( <i>Will</i> ).         |
| 684. Standard ( <i>Bull</i> ).                    | 861. *Abondance ( <i>Boucharlat</i> ).        |
| 742. *Prince Leopold ( <i>Williams</i> ).         | 862. *Capitaine Boyton ( <i>Lemoine</i> ).    |
| 744. Sunray ( <i>Th. Milner</i> ).                | 863. *Circé ( <i>H. Demay</i> ).              |
| 756. George Brunning ( <i>Henderson</i> ).        | 864. Distinction ( <i>H. Demay</i> ).         |
| 773. *Europa ( <i>Twrdy</i> ).                    | 865. Galatea ( <i>Bull</i> ).                 |
| 777. *Graf Andrassy ( <i>Twrdy</i> ).             | 866. J. Becker ( <i>Becker</i> ).             |
| 783. *Selam ( <i>Crousse</i> ).                   | 867. L'Elysée ( <i>Boucharlat</i> ).          |
| 789. Député Teutsch ( <i>Lemoine</i> ).           | 870. *Norma ( <i>H. Demay</i> ).              |
| 791. *C. Weyprecht ( <i>Twrdy</i> ).              | 871. Triomphant ( <i>Boucharlat</i> ).        |
| 795. *Rosette ( <i>Twrdy</i> ).                   | 872. *Unica ( <i>Twrdy</i> ).                 |

FUCHSIA. — 2<sup>me</sup> SÉRIE. — Nouveautés de 1879.

*Pièce* : fr. 1-50.

- |  |  |
|--|--|
| 873. *Miss Lucy Finnis ( <i>Helling</i> ). Fleur ramassée, excessivement double, tube rouge cocciné, sépales très-courts, corolle blanc pur. | 874. *De Montalivet ( <i>Lemoine</i> ). Fleur double, sépales courts, relevés, rose foncé, corolle violet clair panaché de rose, entourée de pétales rose foncé. |
|--|--|



875. *Electric Light* (*Todman*). Tube et sépales blancs, ces derniers recourbés, corolle rose lavande bordé de rouge.
876. \**Géant des batailles* (*Boucharlat*). Fleur semi-double, très-belle, tube court, sépales rouge vif, corolle violet prune foncé.
877. *Justine Weinrich* (*Weinrich*). Fleur énorme, très-belle, sépales relevés, carminés, corolle violet rubané et nervuré de rose.
878. \**Mad. Galli-Marié* (*Lemoine*). Fleur grande, très-double, sépales relevés, rose rougeâtre, corolle blanc d'albâtre.
879. *Miss Welsh* (*Lye*). Fleur très-jolie, tube et sépales incarnat tendre, corolle carmin orangé teinté de violet.
880. *M. Dufaure* (*Lemoine*). Fleur charmante, sépales relevés, saumon jaunâtre, corolle rose saumoné.
881. \**Monstrosa* (*Trordy*). Fleur colossale, très-double, en rosette, sépales relevés, carmin feu, corolle bleu prune foncé.
882. \**Monstrosa plena* (*Boucharlat*). Fleur énorme, très-belle, double, sépales relevés, rouge foncé, corolle évasée, cramoisi violacé.
883. \**Pierre Joigneaux* (*Lemoine*). Fleur double, sépales blancs jaunâtres à pointes vertes, corolle irrégulière, rose violacée.
884. *Pink Perfection* (*Lye*). Fleur très-belle, tube très-long, sépales blanc crème, corolle rose teintée de violet.
885. *Royal Osborne* (*Todman*). Fleur très-belle, tube et sépales bien proportionnés, blanc de nacre, corolle rose amarantacée.
886. *Simon Delaux* (*Weinrich*). Fleur très-grande et très-belle, sépales relevés, rouge laque, corolle violacée nuancée de rose.

FUCHSIA. — 3<sup>me</sup> SÉRIE. — Nouveautés de 1880.

Pièce : 2 francs.

887. \**Alph. Daudet* (*Lemoine*). Fleur large, double, sépales relevés, rouge vineux, corolle violet bleuâtre.
888. \**M. Lombard* (*Boucharlat*). Fleur très-belle, double, sépales relevés, rouge corail, corolle lilas clair rubané de blanc.
889. \**Paris-Murcie* (*Lemoine*). Fleur très-double, irrégulière, sépales horizontaux, rouge clair, corolle blanche légèrement teintée de rose.
890. \**Reine des fées* (*Reenkönigin*) (*Rosenkränzer*). Fleur très-double, sépales rouge vif, corolle blanc pur.
891. \**Periclès* (*H. Demay*). Fleur longue, très-double, sépales bien relevés, rouge cinabre vif, corolle bleu clair, ongles roses.
892. *Lye's Favourite* (*Bull*). Fleur splendide, grande et de bonne forme, tube et sépales blancs, corolle rouge magenta vif.
893. *Syros* (*Bull*). Fleur très-belle, tube rose, sépales larges, horizontaux, roses, corolle d'un riche bleu pourpré.
894. \**Nouveau Mastodonte* (*Lemoine*). Fleur très-double, globuleuse, pæoniforme, sépales larges, relevés en cercle et recouvrant le tube qui est rouge vif, corolle violet très-foncé nervuré de rouge au pourtour. Le plus volumineux et l'un des meilleurs Fuchsia connus.

## HÉLIOTROPES.

Les HÉLIOTROPES, cultivés depuis longtemps en serre pour leur délicieuse odeur, ont donné, par le semis, des variétés fort jolies, de nuances diverses, et qui font un très-bon effet dans les parterres en plein air, l'été.

Pièce : 75 centimes.

9. Triomphe de Liège.
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*H. Demay*).
60. Souvenir de Léopold (*Crousse*).
71. La favorite (*Crousse*).
72. Bouquet parfumé (*Crousse*).
83. Souvenir de Rendatier (*Crousse*).
93. Fleur d'été (*Crousse*).

## LANTANA.

On forme, avec les variétés de ce petit arbuste, de jolies corbeilles en pleine terre, à exposition chaude, en plein soleil, où elles produisent un charmant effet par la diversité des coloris de leurs fleurs qui s'étalent en petits bouquets au-dessus du feuillage; elles croissent même dans les mauvaises terres et ne demandent presque pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève les plantes en motte et on les hiverne dans une serre bien sèche.

*Pièce* : 50 centimes. — 12 variétés à notre choix : 5 francs.

- |   |   |
|---|---|
| 43. alba violacea ( <i>Rougier</i> ).   | 83. Gloire des marchés ( <i>Nivert</i> ). |
| 75. albo-lutea grandiflora.             | 84. Goeschke.                             |
| 93. Argus ( <i>Lemoine</i> ).           | 126. La neige ( <i>Lemoine</i> ).         |
| 124. Aurore boréale ( <i>Lemoine</i> ). | 87. Mad. Rougier.                         |
| 122. Bouquet blanc ( <i>Lemoine</i> ).  | 88. Mine d'or ( <i>Rendatler</i> ).       |
| 76. Caméléon ( <i>Ferrand</i> ).        | 127. M. Schmidt ( <i>Lemoine</i> ).       |
| 58. Cauvin ( <i>Cauvin</i> ).           | 113. Multiflore ( <i>Lemoine</i> ).       |
| 77. Colibri ( <i>Hans</i> ).            | 53. Nec plus ultra ( <i>Rendatler</i> ).  |
| 60. Dame d'honneur ( <i>Ferrand</i> ).  | 129. Pluie d'or ( <i>Lemoine</i> ).       |
| 3. delicatissima ( <i>Chauvière</i> ).  | 123. Rayon de soleil ( <i>Lemoine</i> ).  |
| 80. Etoile de Provence.                 | 134. Sémillant ( <i>Crousse</i> ).        |
| 51. Fabiola ( <i>Rendatler</i> ).       | 121. Soleil levant.                       |
| 82. Favorite ( <i>Henderson</i> ).      | 128. Toison d'or ( <i>Lemoine</i> ).      |

## GERANIUM ZONALE, DITS SCARLET.

Les *Geranium zonale*, si universellement répandus dans les cultures, voient continuer la vogue dont ils jouissent à juste titre. Ils ont le double privilège d'orner les serres froides et de garnir, pendant six mois de l'année, les corbeilles en plein air, où ils fleurissent sans interruption jusqu'aux gelées, et où ils sont d'un admirable effet par leurs fleurs brillantes et par les belles panachures des feuillages de bon nombre de variétés. Les ombelles sont devenues énormes par suite d'hybridations intelligemment opérées, et les fleurs, dans tous les coloris possibles, ont acquis presque de doubles proportions; ajoutons que les variétés à fleurs doubles ont complètement révolutionné ce beau genre.

Tout ce qui n'est pas supérieur a été supprimé.

## PREMIÈRE SÉRIE.

*Pièce* : 50 centimes. — 12 variétés : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.

- |  |  |
|--|--|
| 408. Dr Ricci ( <i>Plaisance</i> ). Énorme ombelle de fleurs d'un écarlate vermillonné feu, centre blanc.                | 419. Lucius ( <i>Bull</i> ). Orange vermillonné; excellente variété pour massifs.              |
| 409. Surpasse beauté de Suresnes ( <i>Cassier</i> ). Énorme ombelle de très-larges fleurs d'un rose vif maculé de blanc. | 422. Tricolore ( <i>Tête d'or à Lyon</i> ). Blanc crème panaché de rose, de vert et de saumon. |
| 412. Madem. Nilsson ( <i>H. Demay</i> ). Nosegay d'un beau rose lilacé, centre blanc.                                    | 424. Madame L. Courmont ( <i>Calot</i> ). Saumon très-clair, centre blanc.                     |
| 413. Lord Derby ( <i>John Mann</i> ). Écarlate vif, centre blanc; excellente variété pour massifs.                       | 425. M. Macarez ( <i>Calot</i> ). Rose vif, pétales supérieurs maculés de blanc.               |
| 418. Mad. Siesmayer ( <i>Hock</i> ). Vermillon, pétales supérieurs maculés de rose.                                      | 428. Peabody ( <i>Lemoine</i> ). Amarante foncé.   |
|  | 435. Arthur Pearson ( <i>Pearson</i> ). Très-grande fleur violet magenta.                      |
|  | 437. Duke of Devonshire ( <i>Pearson</i> ). Écarlate teinté de violet.                         |



440. Thomas Speed (*Pearson*). Très-grande fleur rouge cerise.
442. François Desbois (*Aidebert*). Écarlate velouté, centre blanc.
443. Marie Aidebert (*Aidebert*). Amarante foncé, maculé de vermillon sur les pétales supérieurs.
447. Mrs. Upton (*Williams*). Forte ombelle de fleurs rose vif; excellent pour massifs.
448. Prometheus (*Shenton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé de vermillon.
449. Président Thiers (*Lemoine*). Grande fleur saumon vif.
452. Richard Wallace (*Lemoine*). Carmin elair, pétales supérieurs maculés de blanc.
453. Comtesse de Conroy (*Boutard*). Nosegay à très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés de blanc.
454. Lina Boutard (*Boutard*). Énorme ombelle de fleurs lilas clair maculé de blanc.
456. Stella (*Rendatler*). Rouge saumon clair strié de blanc.
458. Alcyon (*Boutard*). Belle ombelle serrée de fleurs d'un écarlate très-vif.
459. Artaban (*Boutard*). Belle ombelle de fleurs vermillonnées, pétales supérieurs teints de carmin.
460. Duchesse de Maillé (*Boutard*). Lilas carné, nuancé de blanc sur les pétales supérieurs.
461. Saturne (*Lavertu*). Belle ombelle de fleurs d'un écarlate clair.
462. Albert Grévy (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs rouge saumon vif.
463. Avenir national (*Lemoine*). Grande fleur carmin très-vif.
469. Mad. Germain (*Crousse*). Énorme ombelle et bien serrée de fleurs saumon clair nuancé de rose.
473. Le Maire de Nancy (*Lemoine*). Carmin clair recouvert de veinules carmin vif.
474. White Clipper (*Must*). Blanc pur.
478. Lucretia (*W. Paul*). Belle ombelle de fleurs blanches reflétées d'incarnat.
479. M. J. George (*W. Paul*). Grande fleur écarlate orangé clair.
481. Ulysses (*W. Paul*). Écarlate orangé vif.
482. Virgil (*W. Paul*). Nosegay à énorme ombelle de fleurs rouge clair.
484. Beauté des squares (*F. Brassac*). Rose clair reflété de saumon.
490. Edmond Deroux (*Bruant*). Belle ombelle de fleurs saumon orangé.
491. Mad. Vourion (*Bruant*). Carmin légèrement reflété d'orange.
493. M. Alphonse Bajart (*Delesalle*). Fleur très-grande, écarlate passant à l'orange.
491. M. Laine (*Delesalle*). Grande ombelle de fleurs carmin vif reflété d'orange.
495. M. Léon Willoquaux (*Delesalle*). Belle ombelle de fleurs rouge cerise vif carminé.
496. Triomphant (*Delesalle*). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé de rose.
501. M. Delombaerde (*Delombaerde*). Rose, centre carmin.
503. Berton Seulin (*Delombaerde*). Énorme ombelle de fleurs chamois nuancé de saumon.
504. Perfection (*Delombaerde*). Rouge orangé, centre blanc.
505. Candeur (*Delombaerde*). Forte ombelle de fleurs rose clair nuancé de lilas, grand centre blanc.
506. Gros Papa (*Delombaerde*). Énorme ombelle de fleurs blanches lavées de saumon lilacé.
507. M. Laprévotte (*Bertier-Rendatler*). Fleur très-grande, vermillon vif, centre blanc.
513. Président Mac-Mahon (*Crousse*). Rose aurore saumoné et veiné, bord plus clair, centre blanc.
515. Admiranda (*Bull*). Nosegay d'un incarnat tendre, base des pétales saumon écarlate vif.
516. Algernon (*Bull*). Nosegay carmin vif.
524. Tapos (*Bull*). Nosegay à belle et forte ombelle de fleurs rose cerise.
526. Progrès libéral (*Lemoine*). Rose violacé.
527. Resplendens (*Malet*). Rouge vif.
528. Enfant de Nancy (*Lemoine*). Nosegay d'un brun acajou, marqué de rouge feu sur les pétales supérieurs.
531. Hébé (*Bull*). Blanc pur nuancé et marqué de saumon, centre saumon rosé.
536. La Tour d'Auvergne (*Lemoine*). Grande fleur rouge groseille clair.
537. Lieutenant Bellot (*Lemoine*). Forte ombelle de très-grandes fleurs rouge cinabre foncé.
538. R. Töpfer (*Lemoine*). Très-grande fleur orange pâle marbré de rose.
540. Corsair (*Pearson*). Écarlate vif.
541. Mrs. Turner (*Pearson*). Splendide ombelle de fleurs rose foncé.
544. Lucy Bosworth (*Pearson*). Rose clair.
546. Mrs. T. F. Fenn (*Pearson*). Rose lilacé.
549. Ellen (*Pearson*). Saumon bordé de blanc.
550. Mrs. Vickers (*Pearson*). Amarante.
553. Pirate (*Pearson*). Écarlate carminé.
554. Sir H. S. Stanhope (*Pearson*). Cramoisi très-foncé.
560. John Fellowes (*Pearson*). Rouge cerise vif.
562. Little Carr (*Pearson*). Rouge cerise carminé.

570. **Alcibiade** (*Delesalle*). Forte ombelle de très-grandes fleurs rouge saumoné, nuancé de violet clair au centre.
571. **Henry Delhay** (*Delesalle*). Grosse ombelle de fleurs orange carminé; excellent pour massifs.
572. **M. Gavelle père** (*Delesalle*). Très-forte ombelle de fleurs rouge cerise carminé.
575. **Colonel Fœrvel** (*Lemoine*). Énorme ombelle de fleurs vermillon pourpré velouté.
576. **Alsace** (*Lemoine*). Très-forte ombelle de fleurs pourpre cramoisi.
577. **L. Gauthier** (*Bertier-Rendatler*). Très-forte ombelle de fleurs orange rougeâtre.
578. **F. Roth** (*Bertier-Rendatler*). Très-grande fleur cerise carminé clair, centre blanc.
580. **Halévy** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay saumon foncé sillonné de blanc rosé.
581. **M. Osseume** (*Bertier-Rendatler*). Grande fleur saumon vif refleté de lilas, passant au violacé, centre blanc.
582. **Cyrus** (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle de fleurs rouge garance, centre blanc.
583. **Madem. Wilhelm** (*Bertier-Rendatler*). Grande ombelle de fleurs d'un blanc mat, se teintant de rose à la fin de la floraison.
584. **M. Paul Boselli** (*Boutard*). Rose violacé foncé, éclairé de blanc au centre.
585. **Pierre de Perthuis** (*Boutard*). Enorme ombelle de fleurs rouge orangé à reflet cuivré.
586. **Octavie** (*Boutard*). Incarnat tendre, centre teinté et strié de rose.
587. **Mad. Boselli** (*Boutard*). Très-forte ombelle de fleurs rose saumoné, les deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet.
588. **Madem. Aline de Frilense** (*Boutard*). Très-forte ombelle sphérique de fleurs écarlate orangé.
589. **Jean de Perthuis** (*Boutard*). Pourpre cramoisi foncé.
592. **Jealousy** (*Gadley*). Saumon jaunâtre.
593. **Eldorado** (*H. Demay*). Orange saumoné veiné de vermillon.
595. **D'Audiffret-Pasquier** (*Lemoine*). Nosegay laque carminée, nervuré de rose clair sur les pétales supérieurs.
596. **Sir J. Dyke** (*Cannell*). Forte ombelle de fleurs d'un rose vif, pétales supérieurs blancs.
597. **Général Chanzy** (*Lemoine*). Fleur de la forme des Nosegay, violet clair.
600. **Darwin** (*Lemoine*). Rouge fuchsine, pétales supérieurs rouge feu.
602. **Edmond About** (*Lemoine*). Rose foncé maculé de blanc.
603. **Jeanne Darc** (*Lemoine*). Blanc pur.
604. **Paul-Louis Courier** (*Lemoine*). Gigantesque ombelle de fleurs vermillonnées.
605. **Eugène Liébert** (*Lemoine*). Fleur grande, de la forme des Nosegay, rouge brique orangé.
608. **Distinction** (*Henderson*). Feuille d'un vert gai zoné de noir rougeâtre, à bord dentelé, fleur cramoisie.
611. **Étendard des amateurs** (*Aldebert et Denecker*). Orange cuivré, centre blanc.
612. **New Life** (*Cannell*). Variété hors ligne, à fleur écarlate vif rubané et strié de blanc pur.
619. **White Vesuvius** (*Cannell*). Blanc de lait très-légèrement nuancé de rose.
620. **Salmon Vesuvius** (*Cannell*). Saumon parsemé de rouge corail, œil blanc.
621. **Président Grévy** (*Delaun*). Grande fleur rose carmin vif, centre blanc.
622. **Sylphe** (*Lemoine*). Forte ombelle de fleurs d'un blanc pur.

DEUXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1879. — *Pièce* : fr. 1-50.

613. **Californie** (*Delesalle*). Grande fleur rose carminé, nuancé de blanc au centre.
614. **Cerbère** (*Delesalle*). Ombelle compacte de grandes fleurs rouge ponceau nuancé de rouge feu.
615. **Contraste** (*Delesalle*). Très-grande fleur chamois et rouge garance lignés de lilas.
616. **M. Albert Delaux** (*Delesalle*). Grande fleur rouge magenta éclairé de rouge feu.
618. **M. Ed. Avenel** (*Delesalle*). Forte ombelle de fleurs rose violacé carminé, grande macule blanche.



## TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1880.

Pièce : fr. 2-50. — Douze variétés : 25 francs.

623. M. Tagault (*Delesalle*). Grande fleur saumon argenté nuancé de lilas violacé.
624. Madem. Hortense Macarez (*Delesalle*). Ombelle énorme et compacte de fleurs rose aurore saumoné, nuancé de blanc argenté.
625. M. Eugène Penin (*Delesalle*). Fleur bien faite, saumon carminé vif, centre blanc.
626. Apollon (*Delesalle*). Forte ombelle de fleurs très-bien faites, saumon orangé nuancé de carmin.
628. Madem. Marguerite Macarez (*Delesalle*). Forte ombelle de fleurs rouge laque nuancé de rose carminé.
629. Docteur Bagneris (*Delesalle*). Grande fleur saumon orangé, flammé et marginé de blanc.
630. Mrs. Pollett. Fleur bien faite, rouge, centre blanc.
631. M. Lepère (*Lemoine*). Fleur bien faite, laque violacée, pétales supérieurs rouge feu à la base.
632. Fratelli Ferrario (*Boucharlat*). Énormes ombelles de fleurs rouge minium, rayé de blanc au centre des pétales.
633. Mad. Walter (*Crousse*). Pétales arrondis, saumon à bord carminé, nervuré d'orange, centre blanc.
634. Mad. M. L. de la Rue (*Boucharlat*). Violet mauve rosé.
635. Marie Mangin (*Gerbeaux*). Saumon rosé, légèrement nuancé de blanc au bord.
636. Marquis de la Rochethulon (*Boucharlat*). Rouge violacé, pétales supérieurs marqués d'orange, point blanc.
637. Nuée de feu (*Boucharlat*). Rouge cuivre feu, pétales supérieurs marqués de violet.
638. Soleil couchant (*Boucharlat*). Grande fleur aurore feu, centre plus vif, bord marbré.
639. Commander in Chief. Riche écarlate.
640. New Guinea (*Parker*). Jaune orangé vif.
641. Albert Grévy (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs bien faites, violet amarantacé, pétales supérieurs maculés d'orange feu.
642. Ernest Bersot (*Lemoine*). Énorme ombelle sphérique de fleurs du cramoisi velouté le plus riche.
643. Jules Favre (*Lemoine*). Large ombelle sphérique de fleurs de la forme des Nosegay, rouge laque vif refletté de grenadin.

## QUATRIÈME SÉRIE.

## GERANIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

12 variétés à notre choix : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.

- |   | Fr. C. |   | Fr. C. |
|---|--------|---|--------|
| 808. Louis Delesalle ( <i>Delesalle</i> ). Rouge cerisier-<br>flété d'écarlate légèrement carminé | 50     | 842. Mad. Anssens ( <i>Delesalle</i> ). Rose clair car-<br>miné   | 50     |
| 809. Mad. Henri Delesalle ( <i>Delesalle</i> ). Rose<br>carminé                                   | 50     | 843. Fleur de mai ( <i>Delesalle</i> ). Blanc pur   | 50     |
| 813. Mad. Desrozeaux ( <i>Bruant</i> ). Rose tendre.  | 50     | 844. M. Bourgeois ( <i>Delesalle</i> ). Saumon orangé.  | 50     |
| 825. Diego Podda ( <i>Lemoine</i> ). Grande fleur rose<br>laque vif                               | 50     | 845. Sénateur Testelin ( <i>Delesalle</i> ). Orange ver-<br>millonné, le plus éclatant des coloris<br>connus              | 50     |
| 827. Victor Hugo ( <i>Lemoine</i> ). Aurore orangé<br>vif   | 50     | 846. M. César Routier ( <i>Delesalle</i> ). Orange cui-<br>vré nuancé de violet   | 50     |
| 834. L'Herzégovine ( <i>Lemoine</i> ). Grande ombelle<br>aplatie de fleurs rose violacé           | 50     | 847. M. Dibos ( <i>Delesalle</i> ). Fleur en rosace, d'un<br>blanc porcelaine, centre rose glacé.                         | 50     |
| 837. Edouard Lequin ( <i>Crousse</i> ). Amarante<br>violacé, centre nuancé de rouge               | 50     | 849. Député Viox ( <i>Lemoine</i> ). Large ombelle de<br>fleurs rouge fuchsine foncé avec des<br>tons violet et rouge feu | 50     |
| 838. Marquis de Chambon ( <i>Crousse</i> ). Saumon vif<br>strié et flammé de blanc et de rose     | 50     | 852. Député Laflize ( <i>Lemoine</i> ). Large ombelle<br>serrée de fleurs vermillon pourpré                               | 50     |
| 839. Marguerite Bruant ( <i>Bruant</i> ). Rose aurore<br>saumoné, plus pâle sur les bords         | 50     |   |        |

- Fr. C.
853. **Député Brice** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs rose tendre teinté de carmin » 50
855. **Député Ancelon** (*Lemoine*). Très-large ombelle de fleurs rose magenta foncé » 50
860. **Le cygne** (*Bertier-Rendatler*). Blanc très-pur à reflet satiné, un des plus beaux blancs connus . . . » 50
863. **Marie de Saint-Innocent** (*Bertier-Rendatler*). Incarnat rosé largement rubané de blanc . . . » 50
866. **Mad. Lelandais** (*Tessier*). Énorme ombelle de grandes fleurs semi-doubles, rose vif avec deux macules blanches . . » 50
867. **Casimir Périer** (*Lemoine*). Orange vif bordé de rouge saumon . . . » 50
868. **Jean Macé** (*Lemoine*). Très-grande ombelle de fleurs vermillon cramoisi . . » 50
869. **Lafayette** (*Lemoine*). Très-grande ombelle de fleurs rose laque . . . » 50
871. **M. de Marcère** (*Lemoine*). Fleur semi-double, rose violacé . . . » 50
872. **M. Waddington** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs rose vif bordé de vermillon . . . » 50

- Fr. C.
873. **Montesquien** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs blanches légèrement rosées » 50
874. **Delobel** (*Lemoine*). Large ombelle de grandes fleurs écarlate feu. . . » 50
875. **M. Plaisançon** (*Lemoine*). Grande ombelle de fleurs cramoisi pourpre foncé » 50
877. **L'avenir** (*Gerbeaux*). Violet pourpré foncé, nuancé de rouge feu . . . » 50
878. **M. L. Caillot** (*Bruant*). Rouge lie de vin foncé, noirâtre à la défloraison . . » 50
880. **D. Jacoby** (*Lemoine*). Enorme ombelle de fleurs nankin clair saumoné . . » 50
882. **Jules Simon** (*Lemoine*). Rose clair. » 50
884. **Coquet** (*Delesalle*). Rose de Chine nuancé de lilas, grande macule blanche à la base des pétales . . . 1 50
885. **Floribundum nanum** (*Delesalle*). Variété très-naine et très-florifère, bonne pour massifs; fleur rouge ponceau reflété d'orange. . . . . 1 50
886. **Romain** (*Delesalle*). Grande fleur semi-double, d'un beau rose argenté . 1 50

## CINQUIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1880.

Pièce : fr. 2-50. — 12 variétés : 25 francs.

887. **Le pilote** (*Delesalle*). Fleur très-double, pétales lilas clair ligné de blanc verdâtre, entremêlés de pétales blancs lignés de lilas, coloris nouveau.
888. **Mad. Léon D'Halloy** (*Delesalle*). Forte ombelle de grandes fleurs lilas argenté nuancé de blanc, à reflet violacé, coloris très-distigué.
889. **Chambraloué** (*Delesalle*). Enorme ombelle de fleurs rose vif argenté très-frais, très-grande macule blanche au milieu des pétales; variété de grand effet.
890. **M. Laridant** (*Delesalle*). Beau bouquet de fleurs d'un superbe rouge orangé.
891. **M. Martha** (*Delesalle*). Violet clair nuancé d'amarante.
892. **M. Drapier** (*Delesalle*). Saumon orangé bordé de blanc.
893. **Comtesse Horace de Choiseul** (*Lemoine*). Ombelle moyenne de fleurs saumon orangé; variété naine.
894. **Mad. Grandjean** (*Weick*). Cerise clair lilacé.
895. **Ville de Nancy** (*Lemoine*). Ombelle énorme de fleurs d'un rose carné très-tendre; variété naine.
896. **Boule des Hespérides** (*Boucharlat*). Pourpre vineux reflété de bleu ardoisé.
897. **Le Titien** (*Gerbeaux*). Très-grandes ombelles de fleurs saumon vif liseré de blanc rosé.
898. **Madem. Blanche de la Rue** (*Boucharlat*). Fortes ombelles de fleurs à larges pétales d'un blanc pur.
899. **Madem. Perrault** (*Crousse*). Grande fleur orange saumoné nervuré de rose cuivré, bord des pétales blanc carné.
900. **M. Florentin** (*Crousse*). Rouge éclatant, centre écarlate velouté; variété naine.
901. **Paul Charbonnier** (*Gerbeaux*). Écarlate orangé nuancé de rouge minium vif.
902. **Ravissant** (*Boucharlat*). Fleur semi-double, rouge solferino.
903. **M. Passeman**.
904. **Grand Chancelier Faidherbe** (*Lemoine*). Très-grande fleur rouge solferino foncé teinté d'écarlate.
905. **H. Cannell** (*Lemoine*). Grandes ombelles de fleurs violettes devenant l'amarantes, ongles des pétales supérieurs rouge capucine, formant une macule très-apparente.
906. **Henri Regnault** (*Lemoine*). Grandes ombelles de grandes fleurs d'un blanc crème.
907. **Mad. L. Van Houtte** (*L. Van Houtte*). Variété de tout premier ordre, à feuillage ample, fortement zoné, à grandes ombelles de fleurs d'un rose très-tendre bordé de rose plus foncé, avec des reflets blanchâtres du plus bel effet.



## GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES.

## SIXIÈME SÉRIE.

	Fr. C.		Fr. C.
1100. Alma ( <i>Turner</i> ) . . . . .	50	1193. Edith ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	1 50
1102. Silver Queen ( <i>Kinghorn</i> ). . . . .	50	1134. Beautiful Star . . . . .	1 50
1103. Golden Chain ( <i>Fraser</i> ) . . . . .	50	1135. Queen of Spain . . . . .	1 50
1104. Flower of Spring ( <i>Turner</i> ). . . . .	50	1137. Oriental . . . . .	2 "
1106. Silver Nosegay ( <i>Beaton</i> ). . . . .	50	1139. Peter Grieve ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	2 "
1107. Mrs. Pollock ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1146. Parthenope ( <i>Bull</i> ) . . . . .	2 "
1108. Glowworm ( <i>Henderson</i> ). . . . .	50	1152. Alpha . . . . .	2 "
1109. Sunset ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1153. Mac-Mahon . . . . .	2 "
1110. Gold Pheasant ( <i>Henderson</i> ). . . . .	50	1154. Stella albo-marginata . . . . .	2 "
1111. Reine d'or ( <i>Boucharlat</i> ). . . . .	50	1155. Velvet Cushion . . . . .	3 "
1113. Golden Cerise unique ( <i>Henderson</i> ). . . . .	50	1158. Countess of Ashburnham . . . . .	3 "
1115. Italia unita ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1164. Bronze Perfection . . . . .	50
1117. Artemus Ward ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	50	1165. Cristal Palace Gem . . . . .	50
1119. Louisa Smith . . . . .	50	1156. Goliath. . . . .	2 "
1123. Countess of Tyrconnel ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1159. Acquisition . . . . .	2 "
1124. Little Beauty ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1161. Golden Ray . . . . .	2 "
1125. Lady Cullum ( <i>Henderson</i> ) . . . . .	50	1169. Prince of Wales . . . . .	2 "
1126. Star of India ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	50	1170. Countess of Graven . . . . .	2 "
1127. International ( <i>Bull</i> ). . . . .	50	1171. Master Piece . . . . .	2 "
1128. Silver Cord ( <i>Shenton</i> ) . . . . .	50	1172. Gowrie . . . . .	5 "
1129. Happy Thought . . . . .	50	1173. Freak of Nature . . . . .	4 "
1132. Autumn ( <i>Pearson</i> ) . . . . .	1 50	1175. Triomphe de Brichard ( <i>Brichard</i> ). . . . .	2 "

## GERANIUM ZONALE A FEUILLES PANACHÉES, A FLEURS DOUBLES.

## SEPTIÈME SÉRIE.

	Fr. C.		Fr. C.
1148. Magicien ( <i>Lemoine</i> ). Feuilles d'un vert foncé à disque jaune, fleurs semi-doubles, d'un écarlate orangé . . . . .	2 "	1166. M. Strang ( <i>Williams</i> ). Feuilles tricolores dans le genre de celles de <i>Mrs. Pollock</i> , fleurs semi-doubles, écarlates . . . . .	6 "
1149. Sapho ( <i>Lemoine</i> ). Feuilles d'un jaune bronzé, fleurs semi-doubles, d'un jaune orangé vif . . . . .	2 "	1167. Harmonie ( <i>Lemoine</i> ). Feuilles d'un vert clair zoné de bronze et bordé de blanc crème, fleurs doubles, d'un rouge saumon orangé . . . . .	3 "
1150. Soleil levant ( <i>Lemoine</i> ). Feuilles d'un vert clair légèrement zoné de chocolat et largement bordé de blanc paille, ombelles moyennes de fleurs doubles, d'un écarlate feu brillant . . . . .	3 "	1168. Bronze Corinne ( <i>Lemoine</i> ). Feuilles jaunes légèrement bronzées, fleurs semi-doubles, écarlates . . . . .	3 "
1151. Mrs. Carr ( <i>Turner</i> ). Feuilles vertes panachées de blanc, fleurs très-doubles, d'un superbe rose vif; variété très-naine . . . . .	10 "	1174 Golden Jewel. Feuilles vertes fortement bordées de jaune, fleurs très-doubles, d'un cramoiis très-foncé; variété naine et florifère . . . . .	3 "

## PELARGONIUM A GRANDES FLEURS A CINQ MACULES.

Les *Pelargonium* à grandes fleurs sont de premier ordre comme ornement de serre froide ou d'orangerie pendant l'été. Les fleurs sont élégantes de forme, et brillent par la diversité et la beauté de leurs coloris.

## PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés à notre choix : 10 francs. — 25 variétés : 18 francs.

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1. Beauté parfaite ( <i>H. Demay</i> ). | 8. Prince noir ( <i>Boucharlat</i> ). |
| 2. Criterion ( <i>H. Demay</i> ).       | 11. Adonis ( <i>Duval</i> ).          |
| 4. Uranie ( <i>H. Demay</i> ).          | 17. Elvire ( <i>Malet</i> ).          |
| 6. La neige ( <i>Boucharlat</i> ).      | 21. Jeanne Darc ( <i>Malet</i> ).     |

- |   |   |
|---|---|
| 24. Mad. André Dreux ( <i>Duval</i> ).          | 139. Vicomtesse de Belleval.  |
| 27. Marquise de la Ferté ( <i>Malet</i> ).      | 149. Claribel.  |
| 28. Marquis de Toulangeon ( <i>Duval</i> ).     | 157. Heirlom ( <i>Hoyle</i> ).  |
| 32. M. Rendatler ( <i>Duval</i> ).              | 159. Iron Duke.   |
| 33. Prince de la Moskowa ( <i>Duval</i> ).      | 160. Lady of the Lake.  |
| 38. Victorine Pinguard ( <i>Malet</i> ).        | 174. Sultana.   |
| 43. Jean Sisley ( <i>Boucharlat</i> ).          | 179. Lord Derby.  |
| 46. Mad. Thibaut ( <i>Boucharlat</i> ).         | 181. Mad. Lemichez.   |
| 51. Gloire de Paris ( <i>Guillardat</i> ).      | 182. Socrate ( <i>H. Demay</i> ).   |
| 52. Gloire de Crimée ( <i>Duval</i> ).          | 183. Mad. Verviers.   |
| 53. Incomparable ( <i>Boucharlat</i> ).         | 184. William Bull.  |
| 68. Marie Delepouille ( <i>Delesalle</i> ).     | 188. Maréchal Vaillant.   |
| 70. Regrets d'Aldebert ( <i>Aldebert</i> ).     | 189. Admiration ( <i>Duval</i> ).   |
| 72. Grande-Duchesse de Bade ( <i>Wetzel</i> ).  | 202. Beauty of Kingston.  |
| 75. George Sand ( <i>Lemoine</i> ).             | 203. Prince of Pelargoniums ( <i>Henderson</i> ).                           |
| 76. Victor Lemoine ( <i>Malet</i> ).            | 204. Princesse Hortense.  |
| 80. Mad. Méry de Montigny ( <i>Aldebert</i> ).  | 205. Prince Arthur.   |
| 83. Léonidas ( <i>Aldebert</i> ).               | 207. Mad. de Clercq ( <i>Delesalle</i> ).                                   |
| 84. François Wanters ( <i>Aldebert</i> ).       | 210. M. Robinson Woolfield ( <i>Boucharlat</i> ).                           |
| 86. Gloire de Lille ( <i>Aldebert</i> ).        | 212. Marie Huin ( <i>Rendatler</i> ).                                       |
| 87. Stéphanie ( <i>Chaté</i> ).                 | 214. Hilaire ( <i>Baudry et Hamel</i> ).                                    |
| 93. Colonel Foissy.                             | 216. M. Guilmot ( <i>Baudry et Hamel</i> ).                                 |
| 95. Clorinde.                                   | 218. Triomphe de Saint-Mandé ( <i>Chaté</i> ).                              |
| 96. Colette de Marsenia.                        | 220. Bayard ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).                                 |
| 99. Dr Nélaton.                                 | 221. Colbert ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).                                |
| 101. A. Delobel.                                | 222. Désaugiers ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).                             |
| 105. Eugénie Duval ( <i>Duval</i> ).            | 223. Memnon ( <i>Thibaut et Keteleer</i> ).                                 |
| 107. Florian ( <i>Duval</i> ).                  | 232. Le nègre ( <i>Delesalle</i> ).   |
| 108. Gloire du Petit Bicêtre ( <i>Duval</i> ).  | 234. Mad. Rœmpler ( <i>Delesalle</i> ).                                     |
| 109. Impératrice Eugénie ( <i>Boucharlat</i> ). | 237. Henriette Delepouille ( <i>Delesalle</i> ).                            |
| 110. Inimitable ( <i>H. Demay</i> ).            | 266. Malvædorum ( <i>Lemoine</i> ).   |
| 116. Mad. Coursier.                             | 278. Hortense Delobel ( <i>Delesalle</i> ).                                 |
| 117. Mad. de Frileuse.                          | 279. Madame Leclercq ( <i>Delesalle</i> ).                                  |
| 122. M. Rouillard.                              | 281. M. Duhamel ( <i>Delesalle</i> ).                                       |
| 128. Nestor.                                    | 290. Choron ( <i>Evrard</i> ).  |
| 129. Oriflamme ( <i>H. Demay</i> ).             | 292. Charlotte Corday ( <i>Evrard</i> ).                                    |
| 130. Octavie Demay ( <i>H. Demay</i> ).         | 293. Guillaume-le-Conquérant ( <i>Evrard</i> ).                             |
| 131. Pline.                                     | 296. Queen of Stripes ( <i>Ramson</i> ). Fleur écarlate<br>striée de blanc. |
| 132. Pescatore.                                 |   |

## DEUXIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1879, à 3 francs pièce.

- |  |   |
|--|---|
| 297. Mad. Lemoinier ( <i>Delesalle</i> ). Variété naine, remontant parfaitement ; fleur d'un blanc pur, les deux pétales supérieurs ornés d'une petite macule noire.                             | 301. Palais Rameau ( <i>Delesalle</i> ). Variété naine et très-florifère ; fleur grande, pétales inférieurs lie de vin violacé, les supérieurs teintés de noirâtre. |
| 298. Bijou ( <i>Delesalle</i> ). Fleur moyenne, d'un beau rose mauve, pétales supérieurs réticulés de brun acajou, centre blanc.   | 305. Aurora ( <i>Henderson</i> ). Fleur d'un cramoisi écarlate foncé, maculé sur les pétales supérieurs.  |
| 299. Monsieur G. Demoulin ( <i>Delesalle</i> ). Fleur très-grande, bien faite, d'un rouge cerise carminé, pétales supérieurs maculés de brun acajou, gorge et bord des pétales liserés de blanc. | 306. Cicely ( <i>Henderson</i> ). Fleur orange ombrée de rose, maculée de marron sur les pétales supérieurs, centre blanc.  |
| 300. Topaze ( <i>Delesalle</i> ). Grande fleur ondulée, d'un blanc pur, pétales supérieurs maculés de rose amarantacé.   | 308. Duke of Cambridge ( <i>Henderson</i> ). Fleur d'un cramoisi écarlate vif, maculé de noir sur les pétales supérieurs.   |
|  | 312. Dr André ( <i>Henderson</i> ). Fleur rose tendre, bord des pétales élégamment ondulé.  |



313. *Duchess of Bedford (Henderson)*. Fleur blanche maculée de carmin.
314. *Empress (Henderson)*. Fleur blanche maculée de rose violacé.
323. *Albert Telliére (Telliére)*. Fleur petite, laque carminée foncée, pétales supérieurs flammés de noir, centre blanc.
324. *Général Hoche (Foucard)*. Fleur d'un vermillon saumoné teinté de carmin, à cinq macules d'un marron brunâtre, centre liseré de blanc.
325. *J. W. Cléry (Chate)*. Fleur moyenne, d'un rouge groseille, pétales supérieurs maculés de marron.
326. *Mad. Albert Decrais (Houdayer)*. Variété ayant l'aspect d'une *Auricule*; fleur large, très-belle, blanche maculée et bordée de carmin laque.
327. *Mad. Ch. König (Lemoine)*. Variété naine, à port érigé; larges ombelles de fleurs d'un blanc pur.
328. *Ma gloire (Boucharlat)*. Fleur rose reflétée, large centre blanc violacé.
329. *Mécène (Robert)*. Fleur moyenne, très-belle, d'un rose carminé, pétales supérieurs légèrement palmés de marron, centre blanc.
330. *M. Leroyer (Lemoine)*. Fleur rose marbrée de carmin clair, pétales supérieurs maculés de marron.
331. *Plutus (Robert)*. Fleur de bonne forme, d'un rose violacé, à cinq énormes macules d'un cramoisi noirâtre.
332. *Rosita (Malet)*. Fleur grande, carmin ponctué et bordé de blanc, maculé de noir sur les cinq pétales.
333. *Sénateur Krantz (Malet)*. Fleur dont les pétales sont entièrement noirs, bordés d'un liseré rouge feu.
334. *Lucie Lemoine (Lemoine)*. Fleur grande, régulière, érigée, ondulée, d'un blanc pur.
335. *William Potten (Lemoine)*. Grandes ombelles régulières de fleurs érigées, d'un riche mauve, veiné à la base.

### TROISIÈME SÉRIE.

#### PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES A CINQ MACULES.

- |   | Fr. C. |  | Fr. C. |
|---|--------|--|--------|
| 42. <i>Prince of Novelties (Henderson)</i> . . . . .  | 2 "    | 294. <i>Dr Masters (Williams)</i> . . . . .  | 3 "    |
| Carmis foncé, large macule cramoisie au centre.   |        | Pétales supérieurs cramoisis, maculés de noir velouté, les inférieurs légèrement maculés de pourpre velouté.                     |        |
| 54. <i>Ville de Caen (Evrad)</i> . . . . .  | 2 "    | 295. <i>Prince of Wales (Bull)</i> . . . . .   | 3 "    |
| Fleur très-grande, de forme parfaite, cramoisi maculé de noir, centre entouré de violet.  |        | Fleur à 6 pétales, les supérieurs écarlate feu maculé de marron, les inférieurs rouge feu, tous veinés et crispés, centre blanc. |        |
| 231. <i>Queen Victoria (Bull)</i> . . . . .   | 2 "    | 302. <i>Cucullatum flore pleno</i> . . . . .   | 2 "    |
| Vermillon bordé de blanc pur, pétales supérieurs maculés de marron.   |        | Fleur moyenne, d'un rouge groseille violacé, coloris tout à fait distinct.   |        |
| 262. <i>Mad. Evrad (Evrad)</i> . . . . .  | 2 "    | 303. <i>Mad. Gustave Henri (Lemoine)</i> . . . . .   | 5 "    |
| Fleur moyenne, très-bien faite, cramoisi vif maculé de noir et bordé de blanc.  |        | Fleur grande, ronde, d'un rose carminé, grand centre blanc, pétales supérieurs maculés de pourpre lilacé liseré de blanc.        |        |
| 263. <i>M. Ch. Zeller (Spitzer)</i> . . . . .   | 2 "    | 304. <i>Prince of Teck</i> . . . . .   | 3 "    |
| Cramoisi feu bordé de rose, à cinq larges macules noirâtres.  |        | Fleur d'un cramoisi foncé teinté de violet, pétales supérieurs maculés et veinés de marron noirâtre.                             |        |
| 282. <i>Captain Raikes (FLORE, XXII, 11)</i> . . . . .  | 2 "    | 319. <i>Fire King (Henderson)</i> . . . . .  | 3 "    |
| Fleur grande, à pétales supérieurs cramoisi feu foncé maculé de pourpre noirâtre, les inférieurs cramoisi feu.  |        | Fleur d'un écarlate vif nuancé.  |        |
| 289. <i>Beauty of Oxtou (Bull)</i> . . . . .  | 2 "    |  |        |
| Fleur grande, à pétales supérieurs marron tacheté de brun, les inférieurs cramoisi très-foncé ombré de marron, centre clair teinté de rose, tous les pétales frisés et marginés de blanc. |        |  |        |

### QUATRIÈME SÉRIE.

#### PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE (*lateripes, peltatum*).

- |  | Fr. C. |  | Fr. C. |
|--|--------|--|--------|
| 1300. <i>Folliis albo-variegatis</i> . . . . .                 | " 50   | 1306. <i>Hederaefolium variegatum</i> . . . . .  | " 50   |
| 1301. <i>Princess Alexandra Thyra (Bull)</i> . . . . .         | " 50   | 1308. <i>Hastia (Bull)</i> . . . . .   | " 50   |
| 1302. <i>L'élégant</i> . Feuilles marginées de blanc . . . . . | " 50   | 1309. <i>Leda (Bull)</i> . Rose carné, pétales supérieures richement striés de cramoisi violacé foncé, centre incarnat clair . . . . . | " 50   |
| 1303. <i>Duke of Edinburgh</i> . . . . .                       | " 50   | 1310. <i>Nemansa (Bull)</i> . . . . .  | " 50   |
| 1304. <i>Treasure (Bull)</i> . . . . .                         | " 50   |  |        |
| 1305. <i>Emperor (Henderson)</i> . . . . .                     | " 50   |  |        |

	Fr. C.		Fr. C.
1311. Phoea ( <i>Bull</i> ). . . . .	50	1319. Madem. Adrienne Barat. Fleur	
1312. König Albert flore pleno ( <i>Oscar Liebmann</i> ). Fleur double, rose violacée	1 "	très-grande, double, lilas satiné	
1314. La fiancée ( <i>Lemoine</i> ). Fleur bien		chatoyant . . . . .	1 "
double, lilas tendre rayé de		1320. M. Dubus ( <i>Dubus</i> ). Fleur bien dou-	
pourpre. . . . .	1 "	ble, très-distinguée, rose car-	
1315. Lucie Lemoine ( <i>Lemoine</i> ). Fleur		miné vif, base des pétales supé-	
très-double, blanche teintée de		rieurs rose clair veiné de pourpre	1 "
lilas et striée de noirâtre . . .	1 "	1321. Madem. Jeanne Wanters ( <i>Lemoine</i> ).	
1316. Renoncule ( <i>Lemoine</i> ). Fleur très-		Fleur grande, bien double, d'un	
double, lilas pourpré, centre blanc	1 "	rose vif, pétales supérieurs for-	
1317. Mad. E. Gallé. Fleur presque double,		tement veinés de carmin. . . .	2 "
blanc pur légèrement veiné . .	1 "	1322. Mont-Blanc ( <i>Lemoine</i> ). Fleur dou-	
		ble, du blanc le plus pur. . .	2 "

## CINQUIÈME SÉRIE.

## ESPÈCES DIVERSES DE PELARGONIUM.

	Fr. C.		Fr. C.
1350. ardens majus . . . . .	1 "	1351. laciniatum . . . . .	1 "
Fleur d'un cramoisi vif.		1362. quercifolium minus . . . . .	1 "
1361. bicolor . . . . .	1 "	1363. quinquevulnerum . . . . .	1 "
1352. echinatum . . . . .	1 "	Feuilles hispides, à 3 segments divisés en fissures lancéolées,	
Fleur blanche, pétales supérieurs marqués de cramoisi vif.		linéaires, dentées; ombelle de fleurs d'un pourpre brunâtre,	
1359. — Lady Plymouth . . . . .	50	plus pâle sur le bord des pétales.	
1353. — Rosy Morn . . . . .	1 "	1364. ribesifolium foliis variegatis . . .	50
1355. — Spotted Gem . . . . .	1 "	1354. saepiflorens . . . . .	1 "
1356. erectum . . . . .	1 "	Fleur d'un rose carné.	
1357. filicifolium . . . . .	50	1366. ternatum . . . . .	1 "
1358. gibbosum . . . . .	1 "	Feuilles cucullées, scabres, à 3 segments cuculiformes, inci-	
Feuilles incisées-dentées, fleur blanche verdâtre, odorante		sés-dentés au sommet, le moyen bifide, tube de la fleur vert	
le soir.		glauque, pétales supérieurs marqués de lignes sanguines.	

## PENTSTEMON GENTIANOIDES.

Un des genres les plus brillants pour les parterres d'été, à gracieuses fleurs de coloris très-variés.

A mon choix. — *Pièce* : 75 centimes.

111. Mad. Lebrun ( <i>Rendatler</i> ).	193. Union ( <i>Lemoine</i> ).
127. Aug. Paté ( <i>Crousse</i> ).	194. Gumbleton ( <i>Lemoine</i> ).
138. William Bull ( <i>Crousse</i> ).	198. Novelty.
167. Linné ( <i>Rendatler</i> ).	202. Cicéron ( <i>Bruant</i> ).
168. Camille Prieur ( <i>Crousse</i> ).	203. Lina ( <i>Rendatler</i> ).
169. Emile Chaté ( <i>Crousse</i> ).	205. Lustre ( <i>Rendatler</i> ).
177. Bossuet.	224. L'ami Fritz ( <i>Lemoine</i> ).
185. Jules Simon ( <i>Lemoine</i> ).	



## PETUNIA A FLEURS DOUBLES.

Les *Petunia* ont le mérite d'orner, en été, aussi bien la serre froide que les parterres. Leurs fleurs sont charmantes et de nuances tranchées.

### Variétés nouvelles de diverses provenances.

Au choix de l'amateur. — *Pièce* : fr. 1-50. — 12 *variétés* : 15 francs.

A notre choix. — *Pièce* : 1 franc. — 12 *variétés* : 10 francs.

1. **splendens flore pleno.** Fleur bien double, entièrement fimbriée, d'un pourpre très-vif.
2. **Florinde.** Variété naine, trapue, florifère; fleur très-belle, bien double, frisée, blanc sur fond rose tendre, parfois à pétales pointés de pourpre.
3. **Sans pareil.** Fleur très-grande, légèrement dentelée, d'un blanc pur flammé de pourpre.
4. **Favorite.** Fleur moyenne, d'un pourpre foncé bordé de blanc pur.
5. **Mauve Queen.** Fleur grande, très-belle, d'un mauve lilacé réticulé de rose tendre.
6. **Clotilde.** Fleur grande, semi-double, d'un blanc pur maculé de pourpre foncé.
7. **Nec plus ultra.** Fleur très-belle, bien double, frisée sur les bords, mauve clair fortement bordé de blanc de lait.
8. **Admiration.** Fleur bien double, unicolore, d'un pourpre foncé velouté.
9. **Bélisaire.** Fleur moyenne, bien double, d'un rose très-frais.
10. **Multicolore.** Fleur grande, très-belle, semi-double, d'un rose transparent tout réticulé de mauve clair.
11. **Boule de neige.** Fleur grande, très-double, dentelée, d'un blanc pur, excellente pour bouquets.
12. **Merveille.** Fleur grande, très-belle, très-double, d'un lilas très-clair à reflet plus vif, coloris nouveau.
13. **L'élégant.** Fleur bien faite, fortement dentelée, d'un pourpre foncé bordé de blanc.
15. **Tannhäuser.** Fleur bien faite, très-double, violet veiné de pourpre; variété très-florifère.
16. **Le géant.** Fleur très-grande, très-double, fortement dentelée, d'un pourpre foncé strié de blanc.
17. **purpurea plena.** Fleur grande, très-double, d'un pourpre très-foncé.
18. **Flambeau.** Fleur très-double, pourpre fortement bordé et réticulé de blanc.
20. **Arlequin.** Fleur grande, semi-double, à larges pétales amarantes passant au lilas, coloris très-frais.

## SALVIA.

Les *Sauges* ornementales produisent des fleurs fort belles, diversement colorées et qui font aussi bon effet en pleine terre, l'été, qu'en orangerie.

*Pièce* : 50 centimes.

34. **Bethelii.**
4. **cacaliæfolia** (FLORE, XXII, 99).  
Fleur d'un bleu indigo foncé.
6. **gesneriæflora** (FLORE, XX, 129).  
Fleur d'un vermillon sombre.
25. **Grahami purpurata.**
10. **ianthina** (FLORE, IX, 73).  
Fleur violette ombrée de bleuâtre.
26. **involuerata Deschampsiana.**
31. **lantæfolia.**
11. **leucantha** (FLORE, XXII, 39).  
Fleur blanche à calice violet lavande.
32. **nigrescens.**
13. **obtusa** (FLORE, XIV, 47).  
Jolie fleur carmin clair.
22. **patens** (FLORE, V, 503).  
Fleur du plus beau bleu d'outremer.
33. **splendens Bruanti.**
35. — **Hoveyi**, *pièce* : 1 franc.
15. — **Soucheti** (FLORE, XI, 163).  
Fleur d'un rouge minium foncé.
28. — — **flore albo.**
16. **tricolor** (FLORE, XII, 108).  
Fleur blanche, avec une macule carmin violacé au sommet de la lèvre supérieure et une autre plus ample, d'un minium carminé, sur le labelle de l'inférieure.
29. **Verschaffelti.**

## PLANTES POUR MASSIFS, CORBEILLES, BORDURES, ETC.

Cette liste ne contient que les plantes le plus fréquemment employées pour massifs, corbeilles ou bordures; la plupart sont cultivées en pots et livrables en mottes, depuis le 15 avril jusqu'à la fin de mai. Les prix ci-après ne sont pas applicables à des quantités moindres que celles indiquées.

	La douzaine.	Le cent.
<i>Alternanthera amabilis</i> . . . . .	4 francs.	20 francs.
— <i>amoena</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>latifolia</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>paronychioides</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>spathulata</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Achyranthes acuminata</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>Lindenii</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	4 "	20 "
— <i>Wallisi</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Antennaria candida</i> . . . . .	3 "	15 "
<i>Balsamines Camellia</i> , en beau mélange . . . . .	3 "	15 "
<i>Cineraria maritima</i> . . . . .	4 "	20 "
— — <i>candidissima</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Centaurea candidissima</i> , petites plantes de semis . . . . .	8 "	40 "
<i>Canna indica</i> ( <i>Balisiers d'Inde</i> ), en plusieurs variétés . . . . .	5 "	20 "
<i>Coleus Nero</i> , variétés d'un pourpre noirâtre, rustique . . . . .	5 "	30 "
— <i>Verschaffeltii</i> . . . . .	5 "	30 "
— en plusieurs variétés . . . . .	5 "	30 "
<i>Cuphea platycentra</i> . . . . .	8 "	40 "
<i>Dahlia alba nana</i> , blanc pur, pour corbeilles, en boutures . . . . .	9 "	60 "
— <i>Solfatare</i> , jaune vif, pour corbeilles, en boutures . . . . .	9 "	60 "
<i>Fuchsia</i> , en plusieurs variétés simples et doubles . . . . .	6 "	40 "
<i>Gazania splendens</i> . . . . .	5 "	35 "
— — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . . . .	5 "	35 "
<i>Geranium zonale</i> simples, en plusieurs variétés . . . . .	5 "	35 "
— — doubles, en plusieurs variétés . . . . .	5 "	35 "
— — à feuillage panaché, en plusieurs variétés . . . . .	6 "	40 "
<i>Gnaphalium lanatum</i> . . . . .	4 "	20 "
— — <i>foliis sulphureo-marginatis</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Heliotropes</i> , en plusieurs variétés . . . . .	6 "	40 "
<i>Lantana</i> , en plusieurs variétés . . . . .	5 "	35 "
<i>Mesembryanthemum cordifolium variegatum</i> . . . . .	5 "	35 "
<i>Perilla nankinensis</i> , à beau feuillage pourpre noirâtre . . . . .	3 "	15 "
<i>Petunia</i> , variétés de semis en beau mélange . . . . .	3 "	15 "
<i>Phlox Drummondii</i> , variétés de semis en beau mélange . . . . .	3 "	15 "
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> ( <i>Golden Feather</i> ), feuillage jaune d'or, pour bordures . . . . .	3 "	15 "
— — <i>laciniatum</i> , feuillage jaune d'or, lacinié, très-élégant, pour bordures . . . . .	3 "	15 "
<i>Ricinus</i> , en beau mélange . . . . .	5 "	" "
<i>Richardia albo-maculata</i> , feuilles vertes vernissées maculées de blanc . . . . .	3 "	15 "
<i>Reines-Marguerites</i> pyramidales Truffaut, variétés en beau mélange . . . . .	3 "	15 "
— — naines, variétés de Boltze, variétés en beau mélange . . . . .	3 "	15 "
<i>Sempervivum</i> , en plusieurs variétés . . . . .	3 "	20 "
<i>Sedum</i> , en plusieurs variétés . . . . .	3 "	20 "
<i>Teleianthera versicolor</i> . . . . .	4 "	20 "
<i>Verbena hybrida</i> , variétés de semis en mélange, pour corbeilles . . . . .	5 "	35 "
<i>Viola cornuta</i> . . . . .	3 "	15 "
— — <i>alba</i> . . . . .	3 "	15 "
<i>Zinnia elegans</i> , variétés à fleurs doubles . . . . .	3 "	15 "
<i>Zea Mais foliis vittatis</i> , <i>Mais</i> à feuilles nettement rubanées de blanc . . . . .	3 "	15 "



## Plants d'Asperges de premier choix.


Blanche grosse de Gand . . .	plants de 2 ans, le cent.	fr. 2 50
— — — — —	3 ans —	" 3 50
— — d'argenteuil . . .	2 ans —	" 5 "
— — — — —	3 ans —	" 7 50
— — Connover's Colossal —	2 ans —	" 7 50
Violette — . . . . .	2 ans —	" 2 50
— — — — —	3 ans —	" 3 50

## TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un très-grand nombre d'années, ces appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prôtons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 80 centimètres de hauteur sur 50 centimètres de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune garçon de quinze ans, peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.



Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 75 francs, pris à Gand.

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abelia . . . . .	123	Æschynanthus . . . . .	106	Andromeda . . . . .	124
Abutilon . . . . .	87 et 123	Agapanthus . . . . .	123	Anemia . . . . .	107
Acacia . . . . .	123	Agathæa . . . . .	123	Anemidictyon . . . . .	107
Acalypha . . . . .	87	Agave . . . . .	123	Angelonia . . . . .	124
Acanthophoenix . . . . .	115	Ageratum . . . . .	123	Angioperis . . . . .	107
Acanthorrhiza . . . . .	115	Agnostus . . . . .	124	Angræcum . . . . .	110
Acanthus . . . . .	87	Alibertia . . . . .	87 et 120	Anguloa . . . . .	111
Achyranthes . . . . .	87	Allamanda . . . . .	87	Anigosanthus . . . . .	124
Achyrocline . . . . .	123	Alloplectus . . . . .	110	Anæctochilus . . . . .	111
Acineta . . . . .	110	Alocasia . . . . .	100	Anona . . . . .	88 et 120
Acrocomia . . . . .	115	Aloe . . . . .	124	Anoplophyton . . . . .	105
Acropera . . . . .	110	Alpinia . . . . .	88 et 119	Anopterus . . . . .	124
Acrophorus . . . . .	107	Alsophila . . . . .	107	Anthericum . . . . .	124
Acrostichum . . . . .	107	Alternanthera . . . . .	88	Anthurium . . . . .	100
Actinopteris . . . . .	107	<i>Amaryllidées</i> . . . . .	99	Antiaris . . . . .	88 et 120
Ada . . . . .	110	Amaryllis . . . . .	99	Antigonon . . . . .	88
Adelaster . . . . .	87	Amomum . . . . .	88 et 119	Antigramma . . . . .	107
Adenandra . . . . .	123	Amorphophallus . . . . .	100	Antirrhinum . . . . .	124
Adiantopsis . . . . .	107	Ampelopsis . . . . .	124	Aotus . . . . .	124
Adiantum . . . . .	107	Amphicome . . . . .	124	Aphelandra . . . . .	88
Adromistus . . . . .	123	Anamirta . . . . .	88 et 120	Aponogeton . . . . .	124
Æchmea . . . . .	105	Ananassa . . . . .	105	Aralia . . . . .	88, 120 et 124
Aerides . . . . .	110	Anchieta . . . . .	88 et 120	Araucaria . . . . .	124

	Pages.
<i>Arbre à dentelle</i> , v. <i>Lagetta</i>	121
— <i>à pain</i> , voir <i>Artocarpus</i>	88 et 120
— <i>aux parasols</i> , voir <i>Coccoloba</i>	121
— <i>à soie</i> , voir <i>Bombax</i>	89 et 120
— <i>du voyageur</i> , voir <i>Ravenala</i>	120 et 122
<i>Ardisia</i>	88 et 124
<i>Areca</i>	115
<i>Arenga</i>	116 et 120
<i>Argania</i>	88 et 120
<i>Ariopsis</i>	101
<i>Arisæma</i>	101
<i>Aristolochia</i>	83
<i>Aroïdées</i>	100
<i>Arpophyllum</i>	111
<i>Arabiadæa</i>	88
<i>Artanthe</i>	88
<i>Artemisia</i>	124
<i>Arthropodium</i>	124
<i>Arthrotaxis</i>	124
<i>Artocarpus</i>	88 et 120
<i>Arundo</i>	124
<i>Asparagus</i>	124
<i>Asperges</i>	157
<i>Aspidistra</i>	88
<i>Aspidium</i>	107
<i>Asplenium</i>	107
<i>Astelia</i>	124
<i>Astelma</i>	124
<i>Astrapæa</i>	88
<i>Astrocaryum</i>	116
<i>Astrophytum</i>	134
<i>Ataccia</i>	88 et 120
<i>Athyrium</i>	108
<i>Attalea</i>	116
<i>Attrape-mouche</i> , voir <i>Dionæa</i>	92 et 118
<i>Avocatier</i> , voir <i>Persea</i>	97 et 122
<i>Azolla</i>	124
<i>Balanium</i>	103
<i>Balister</i> , voir <i>Canna</i>	136
<i>Bambusa</i>	88 et 124
<i>Banantier</i> , voir <i>Musa</i>	120 et 122
<i>Banisteria</i>	88
<i>Banksia</i>	124
<i>Barbacenia</i>	88
<i>Barkeria</i>	111
<i>Barringtonia</i>	88 et 120
<i>Batemanina</i>	111
<i>Baumier du Pérou</i> , voir <i>Myroxylon</i>	96 et 122
<i>Beaucarnea</i>	124
<i>Begonia herbacée</i>	104
— <i>semi-ligneux</i>	104
— <i>tubéreux</i>	102
<i>Bentlinckia</i>	116
<i>Berberidopsis</i>	124
<i>Berberis</i>	124
<i>Bertolonia</i>	88
<i>Beschorneria</i>	124
<i>Bifrenaria</i>	111
<i>Bignonia</i>	89 et 124
<i>Billbergia</i>	105
<i>Bixa</i>	89 et 120
<i>Blandfordia</i>	125
<i>Blechnum</i>	108

	Pages.
<i>Bletia</i>	111
<i>Blighia</i>	89 et 120
<i>Boehmeria</i>	89 et 120
<i>Bois-foli</i> , voir <i>Daphne</i>	126
<i>Bolbophyllum</i>	111
<i>Bollea</i>	111
<i>Bomarea</i>	89
<i>Bombax</i>	89 et 120
<i>Bonaparteia</i>	125
<i>Boronia</i>	125
<i>Bougainvillea</i>	89
<i>Bouvardia</i>	125
<i>Bowenia</i>	106
<i>Brachysema</i>	125
<i>Brahea</i>	116
<i>Brassavola</i>	111
<i>Brassia</i>	111
<i>Bromelia</i>	105 et 125
<i>Bromeliacées</i>	105
<i>Brosimum</i>	89 et 120
<i>Broughtonia</i>	111
<i>Brownea</i>	89
<i>Brugmansia</i>	125
<i>Brunswigia</i>	99
<i>Buphone</i>	99
<i>Burbridgea</i>	119
<i>Burlingtonia</i>	111
<i>Buxus</i>	125
<i>Cacalia</i>	125
<i>Cacaotier</i> , voir <i>Theobroma</i>	98 et 122
<i>Cactées</i>	134
<i>Caféier</i> , voir <i>Coffea</i>	90 et 121
<i>Caladium</i> , voir <i>Catal n° 191</i>	74
<i>Calamus</i>	116
<i>Calanthe</i>	111
<i>Calceolaria</i>	125
<i>Calebassier</i> , voir <i>Crescentia</i>	90 et 121
<i>Calla</i> , voir <i>Richardia</i>	101 et 132
<i>Calonyction</i>	89
<i>Calophyllum</i>	89 et 120
<i>Calyptrium</i>	89
<i>Calyptrogyne</i>	116
<i>Calyptronoma</i>	116
<i>Camphrier</i> , voir <i>Laurus</i>	122
<i>Camphora</i>	122
<i>Campomanesia</i>	89 et 120
<i>Campsidium</i>	89
<i>Camptopus</i>	89
<i>Camptosema</i>	125
<i>Campylobotrys</i> , voir <i>Higginsia</i>	95
<i>Camploneuron</i>	108
<i>Canna</i>	136
<i>Cannellier</i> , voir <i>Cinnamomum</i>	90 et 121
<i>Cantua</i>	125
<i>Caoutchouc (Arbre à)</i> , voir <i>Ficus elastica</i>	94 et 121
<i>Capucine</i> , voir <i>Tropæolum</i>	133
<i>Caraguata</i>	105
<i>Carapa</i>	89 et 120
<i>Cardwellia</i>	125
<i>Carissa</i>	89 et 121
<i>Carludovica</i>	89, 116 et 121
<i>Carolinea</i>	89
<i>Caryota</i>	116
<i>Cassia</i>	125

	Pages.
<i>Castanospermum</i>	89
<i>Catasetum</i>	111
<i>Cattleya</i>	111
<i>Cavanillea</i>	89 et 121
<i>Centaurea</i>	125
<i>Centradenia</i>	89
<i>Centropogon</i>	89
<i>Centrosolenia</i>	89 et 110
<i>Cephaelis</i>	89 et 121
<i>Cephalotus</i>	90 et 125
<i>Ceratonia</i>	125
<i>Ceratopetalum</i>	125
<i>Cereus</i>	134
<i>Ceropegia</i>	90
<i>Ceroxylon</i>	116
<i>Cestrum</i>	90 et 125
<i>Chamædorea</i>	116
<i>Chamaerops</i>	116
<i>Chavica</i>	90 et 121
<i>Cheilanthes</i>	108
<i>Cheiranthus</i>	125
<i>Chevalliera</i>	105
<i>Chirita</i>	105
<i>Chlorocodon</i>	90 et 121
<i>Choisya</i>	125
<i>Chorizema</i>	126
<i>Chrysophyllum</i>	90 et 121
<i>Chysis</i>	111
<i>Cibotium</i>	108
<i>Cicca</i>	90 et 121
<i>Cinchona</i>	90 et 121
<i>Cineraria</i>	126
<i>Cinnamomum</i>	90, 121 et 126
<i>Cissus</i>	90
<i>Citronnier</i> , voir <i>Citrus</i>	126
<i>Citrus</i>	126
<i>Clematis</i>	126
<i>Clerodendron</i>	90
<i>Clethra</i>	126
<i>Cleyera</i>	126
<i>Clianthus</i>	126
<i>Clidemia</i>	90
<i>Cobæa</i>	126
<i>Coburgia</i>	99
<i>Coca</i> , voir <i>Erythroxy-lon</i>	94 et 121
<i>Coccoloba</i>	90 et 121
<i>Cocculus</i>	90 et 121
<i>Cochliostema</i>	90
<i>Cocos</i>	116
<i>Codæum</i> , voir <i>Croton</i>	90
<i>Cœlia</i>	111
<i>Cœlogyne</i>	111
<i>Coffea</i>	90 et 121
<i>Colax</i>	111
<i>Colea</i>	90
<i>Coleonema</i>	126
<i>Coleus</i>	137
<i>Colletia</i>	126
<i>Colocasia</i>	101 et 121
<i>Columnea</i>	110
<i>Combretum</i>	90
<i>Comparettia</i>	111
<i>Coniza</i>	90 et 121
<i>Conophallus</i>	101
<i>Convolvulus</i>	126
<i>Cookia</i>	90 et 121
<i>Copaifera</i>	90 et 121
<i>Coprosma</i>	126



	Pages.		Pages.		Pages.
Correa . . . . .	126	Dipladenia . . . . .	92	Gardenia . . . . .	94
Coryanthelium . . . . .	90	Diplazium . . . . .	108	Garrya . . . . .	128
Corynocarpus . . . . .	126	Dipterix . . . . .	92 et 121	Gasteria . . . . .	128
Corynostylis . . . . .	90	Disa . . . . .	112	Gaussia . . . . .	116
Corypha . . . . .	116	Dombeya . . . . .	92	Gazania . . . . .	128
Cosbæa . . . . .	126	Donacodes . . . . .	92 et 121	Gelsemium . . . . .	128
Cossignia . . . . .	90	Dorstenia . . . . .	92 et 121	Genethyllis . . . . .	128
Costus . . . . .	119	Dorstanthes . . . . .	92, 99 et 127	Geoffroya . . . . .	94 et 121
Cotyledon . . . . .	126	Doryopteris . . . . .	108	Geonoma . . . . .	116
Crassula . . . . .	126	<i>Dourian</i> , voir <i>Durio</i> . . . . .	93 et 121	Geranium zonale, dits <i>Scar-</i>	
Cratæva . . . . .	92 et 121	Dracæna . . . . .	92 et 127	<i>let</i> . . . . .	146
Crescentia . . . . .	90 et 121	Dracophyllum . . . . .	127	— doubles . . . . .	149
Crinum . . . . .	99	Drimys . . . . .	127	— à feuilles panachées . . . . .	151
Croton . . . . .	90	Drosera . . . . .	118	Gesneria . . . . .	110
Crowea . . . . .	126	Drymonia . . . . .	110	<i>Gesnériacées</i> . . . . .	110
Cryptanthus . . . . .	105	Duranta . . . . .	127	Glaziova . . . . .	116
Cryptophragmium . . . . .	92	<i>Durio</i> . . . . .	93 et 121	Gleichenia . . . . .	108
Cunninghamia . . . . .	126	Dyckia . . . . .	127	Globba . . . . .	119
Cuphea . . . . .	126	Dypsis . . . . .	116	Gloriosa . . . . .	110
Curculigo . . . . .	92	Echeveria . . . . .	127	Gnaphalium . . . . .	128
Curcuma . . . . .	119	Echidnium . . . . .	101	Gnidia . . . . .	128
Curmeria . . . . .	92 et 101	Echinocactus . . . . .	134	Gonatanthus . . . . .	101
Cyanophyllum . . . . .	92	Echinocereus . . . . .	135	Gongora . . . . .	112
Cyathea . . . . .	108	Echinopsis . . . . .	135	Goniophlebium . . . . .	108
<i>Cycadées</i> . . . . .	106	Echinostachys . . . . .	105	Grammatophyllum . . . . .	112
Cycas . . . . .	106	Echites . . . . .	93	Graptophyllum . . . . .	94
Cyclamen . . . . .	126	Echium . . . . .	127	<i>Grenadier</i> , voir <i>Punica</i> . . . . .	132
Cyclanthus . . . . .	92	Elæagnus . . . . .	127	Grevillea . . . . .	128
Cynoches . . . . .	111	Eleis . . . . .	116	Greyia . . . . .	94 et 128
Cymbidium . . . . .	111	Elæodendron . . . . .	127	Griffinia . . . . .	99
Cyperus . . . . .	92	Elettaria . . . . .	93	Griselinia . . . . .	128
Cyphonandra . . . . .	92	Encholirion . . . . .	105	Guaiacum . . . . .	94 et 121
Cypripedium . . . . .	111	Epacris . . . . .	127	Guarea . . . . .	94
Cyrtandra . . . . .	106	Epidendrum . . . . .	112	Gutteria . . . . .	94
<i>Cyrtandracées</i> . . . . .	106	Epiphyllum . . . . .	94	Guilandina . . . . .	94 et 121
Cyrtanthera . . . . .	92	Episcia . . . . .	93 et 110	Gustavia . . . . .	94
Cyrtanthus . . . . .	99	Eranthemum . . . . .	94	<i>Gutta-Percha</i> , voir <i>Iso-</i>	
Cyrtoceras . . . . .	92	Erica du <i>Cap</i> . . . . .	127	<i>nandra</i> . . . . .	95 et 121
Cyrtodeira . . . . .	110	Eriocnema . . . . .	94	Guzmannia . . . . .	106
Cyrtomium . . . . .	108	Eriostemon . . . . .	127	Gymnogramma . . . . .	108
Cyrtopodium . . . . .	112	Erythrina . . . . .	143	Habenaria . . . . .	112
Cyrtosyphonia . . . . .	92 et 121	Erythroxyton . . . . .	94 et 121	Habrothamnus . . . . .	94
Cytisus . . . . .	126	Escallonia . . . . .	128	Hæmadictyon . . . . .	94
Dacrydium . . . . .	126	Eucalyptus . . . . .	128	Hæmanthus . . . . .	99
Dæmonorops . . . . .	116	Eucharis . . . . .	99	Hakea . . . . .	128
Dahlia . . . . .	138	Eugenia . . . . .	94, 121 et 128	Hardenbergia . . . . .	128
Dalechampia . . . . .	92	Eulalia . . . . .	128	Haworthia . . . . .	128
Dammara . . . . .	126	Eupatorium . . . . .	94, 121 et 128	Hebeclinium . . . . .	94
Daphne . . . . .	126	Euphorbia . . . . .	94 et 136	Hechtia . . . . .	105
Darlingtonia . . . . .	118	Eupodium . . . . .	108	Hedychium . . . . .	119
Dasyllirion . . . . .	127	Eurya . . . . .	128	Hedysarum . . . . .	95
Datura . . . . .	92	Eurybia . . . . .	128	Helichrysium . . . . .	128
Davallia . . . . .	108	Eurycles . . . . .	99	Heliconia . . . . .	119
Dendrobium . . . . .	112	Eutaxia . . . . .	128	<i>Heliotropes</i> . . . . .	145
Dendrochilum . . . . .	112	Euterpe . . . . .	116 et 121	Hemerocallis . . . . .	95
Desfontainea . . . . .	127	Fagelia . . . . .	128	Hemidictyum . . . . .	108
Dianella . . . . .	127	Fagræa . . . . .	94	Hemionitis . . . . .	108
Dianthus . . . . .	143	Ferdinandanda . . . . .	94	Heptapleurum . . . . .	95
Dichidea . . . . .	92	Ficus . . . . .	94, 121 et 128	Heritiera . . . . .	95 et 121
Dichorisandra . . . . .	92	Filices . . . . .	107	Herrania . . . . .	95
Dicksonia . . . . .	108	Fittonia . . . . .	94	Hevea . . . . .	95 et 121
Didymocarpus . . . . .	106	Fitz-Roya . . . . .	128	Hexacentris . . . . .	95
Dieffenbachia . . . . .	101	<i>Fougères</i> . . . . .	107	Hibbertia . . . . .	128
Dietes . . . . .	127	Fourcroya . . . . .	94	Hibiscus . . . . .	95
Dillwynia . . . . .	127	Franciscea . . . . .	94	Higginsia . . . . .	95
Dionæa . . . . .	92 et 118	Fuchsia . . . . .	144	Himantophyllum . . . . .	95 et 99
Dioon . . . . .	106	<i>Gaiac</i> , voir <i>Guaiacum</i> . . . . .	94 et 121	Hippobromus . . . . .	95 et 121
Dioscorea . . . . .	92	Galeandra . . . . .	112	Hippomane . . . . .	95 et 121
Diosma . . . . .	127	Garcinia . . . . .	94 et 121	Hohenbergia . . . . .	105

	Pages.		Pages.		Pages.
Hoplophyton . . . . .	105	Livistona . . . . .	117	Nandina . . . . .	130
Houletia . . . . .	112	Lobelia . . . . .	129	Napoleona . . . . .	96
Hoya . . . . .	95	Locheria . . . . .	110	Nepenthes . . . . .	96
Huntleya . . . . .	112	Lomaria . . . . .	108	Nephrodium . . . . .	108
Hymenæa . . . . .	95 et 121	Lomatia . . . . .	130	Nephrolepis . . . . .	108
Hymenocallis . . . . .	100 et 128	Lophospermum . . . . .	130	Nerium . . . . .	130
Hymenodium . . . . .	108	Lucuma . . . . .	96 et 122	Nertera . . . . .	131
Hyophorbe . . . . .	116	Lycaste . . . . .	113	Nidularium . . . . .	105
Hypocyrta . . . . .	95	Lycopodium . . . . .	108	Nierembergia . . . . .	131
Ilex . . . . .	123	Lygodium . . . . .	108	Nipholobus . . . . .	109
Illicium . . . . .	129	Macadamia . . . . .	130	Nothochlæna . . . . .	109
Impatiens . . . . .	95	Machærium . . . . .	96 et 122	Odontoglossum . . . . .	113
Indigofera . . . . .	129	Mackaya . . . . .	96	<i>Ellets</i> . . . . .	143
Iochroma . . . . .	95 et 129	Macrozamia . . . . .	106	Oldfieldia . . . . .	96 et 122
Ionopsis . . . . .	112	Magnolia . . . . .	96 et 130	Oleobachia . . . . .	96
Ipomœa . . . . .	95	Mahonia . . . . .	130	Olfersia . . . . .	109
Iresine . . . . .	129	Malacocarpus . . . . .	135	Oncidium . . . . .	114
Iriarteia . . . . .	117	Malortiea . . . . .	117	Oncosperma . . . . .	117
Ismene . . . . .	100	Mamillaria . . . . .	135	Onychium . . . . .	109
Isonandra . . . . .	95 et 121	Mammea . . . . .	96 et 122	Ophiopogon . . . . .	131
Ixora . . . . .	95	<i>Mancenil</i> , voir Hip-		Opismenus . . . . .	96
Jacaranda . . . . .	96	pomane . . . . .	95 et 121	Opuntia . . . . .	136
Jambosa . . . . .	96 et 121	Mandevillea . . . . .	130	<i>Oranger</i> , voir Citrus . . . . .	126
<i>Jasmin du Chili</i> , voir Man-		Mangifera . . . . .	96 et 122	<i>Orchidées tropicales</i> . . . . .	110
devillea . . . . .	130	<i>Mangostan</i> , voir Gar-		Oreodoxa . . . . .	117
Jasminum . . . . .	96 et 129	cinia . . . . .	94 et 121	Oreopanax . . . . .	131
Jatropha . . . . .	96 et 121	Manihot . . . . .	96 et 122	Otacanthus . . . . .	96
Jovellana . . . . .	129	<i>Manioc</i> , voir Jatropha . . . . .	96 et 121	Ouvirandra . . . . .	96
Jubæa . . . . .	117	Mantisia, voir Globba . . . . .	119	Oxalis . . . . .	131
Kadsura . . . . .	129	Maranta . . . . .	119	Pachira . . . . .	96
Kæmpferia . . . . .	119	Marattia . . . . .	108	Pachyphytum . . . . .	96 et 131
Karatas . . . . .	105	Marcgravia . . . . .	96	Palicourea . . . . .	96
Kennedyia . . . . .	129	Marica . . . . .	130	<i>Palmiers</i> . . . . .	115
Kentia . . . . .	117	Martinezia . . . . .	117	Palumbina . . . . .	114
Kleinia . . . . .	129	Masdevallia . . . . .	113	Pancratium . . . . .	100
Knightia . . . . .	129	Maxillaria . . . . .	113	Pandanus . . . . .	118 et 122
Kopsia . . . . .	96 et 121	Maximiliana . . . . .	117	Panicum . . . . .	96
Korthalsia . . . . .	117	<i>Médecinier</i> , voir Jatro-		Paphinia . . . . .	114
Lachenalia . . . . .	129	pha . . . . .	93 et 121	Parochetus . . . . .	131
Lachnæa . . . . .	129	Medinilla . . . . .	96	Passiflora . . . . .	118, 122 et 131
Lælia . . . . .	112	Melianthus . . . . .	130	<i>Patchouli</i> , voir Pogo-	
Lagetta . . . . .	96 et 121	Melicocca . . . . .	96 et 122	stemon . . . . .	97 et 122
Lalage . . . . .	129	Memeeylon . . . . .	96 et 122	Paullinia . . . . .	96 et 122
Lantana . . . . .	145	Menina . . . . .	96	Pavetta . . . . .	96
Lapageria . . . . .	129	Mesembryanthemum . . . . .	130	Pavonia . . . . .	97
Lasiandra . . . . .	96	Mesospinidium . . . . .	113	Pearcea . . . . .	110
Lasirolepis . . . . .	96 et 121	Methonica, voir Gloriosa . . . . .	110	Pelargonium à grandes	
Lastrea . . . . .	108	Metrosideros . . . . .	130	<i>flours</i> . . . . .	151
Latania . . . . .	117	Meyenia . . . . .	96	— — doubles . . . . .	153
Laurelia . . . . .	129	Miconia . . . . .	96	— à feuille de <i>Lierre</i>	
<i>Laurier-Rose</i> , voir Nerium . . . . .	130	Micrococos . . . . .	117	(lateripes, peltatum) . . . . .	153
Laurus . . . . .	122 et 129	Microlepia . . . . .	108	— <i>espèces</i> . . . . .	154
Ledenbergia . . . . .	96	Mikania . . . . .	96 et 122	Pentstemon . . . . .	154
Leea . . . . .	96	Miltonia . . . . .	113	Peperomia . . . . .	97
Leonotis . . . . .	129	Mimusops . . . . .	122	Pepinia . . . . .	105
Leptotes . . . . .	113	Mitraria . . . . .	130	Peristeria . . . . .	114
Leucopogon . . . . .	129	Monochaetum . . . . .	96 et 130	Persea . . . . .	97 et 122
Libertia . . . . .	129	Monodora . . . . .	96 et 122	Perymenium . . . . .	131
Libocedrus . . . . .	129	Monstera . . . . .	101	Pescatorea . . . . .	114
Libonia . . . . .	129	Morea . . . . .	131	Petræa . . . . .	97
Licuala . . . . .	117	Morenia . . . . .	117	Petunia . . . . .	155
Ligularia . . . . .	129	Morinda . . . . .	96 et 122	Phajus . . . . .	114
Ligustrum . . . . .	129	Mormodes . . . . .	113	Phalænopsis . . . . .	114
<i>Liliacées</i> . . . . .	110	Moussonia . . . . .	110	Pharus . . . . .	97
Limatodes . . . . .	113	Musa . . . . .	120 et 122	Phegopteris . . . . .	109
Lindenia . . . . .	96	<i>Muscadier</i> , v. Myristica . . . . .	96 et 122	Philageria . . . . .	131
Liparis . . . . .	113	Myristica . . . . .	96 et 122	Philesia . . . . .	131
Lithospermum . . . . .	129	Myroxylon . . . . .	96 et 122	Philodendron . . . . .	101
Litobrochia . . . . .	108	Myrtus . . . . .	96, 122 et 130	Phœnicophorium . . . . .	117



	Pages.		Pages.		Pages.
Phoenix . . . . .	117	Pyrethrum . . . . .	132	Sophora . . . . .	98
Pholidophyllum . . . . .	105	Quassia . . . . .	97 et 122	Sophronitis . . . . .	114
Pholidota . . . . .	114	Quercus . . . . .	132	Sparmannia . . . . .	133
Phormium . . . . .	131	Quesnelia, voir Billbergia		Spathiphyllum . . . . .	102
Phycella . . . . .	131	Quesneliana . . . . .	105	Spathodea . . . . .	98
Phygellus . . . . .	131	Quinquina, voir Cin-		<i>Spécialités de serre chaude</i>	
Phylla . . . . .	131	chona . . . . .	90 et 121	<i>et tempérée</i>	
Phyllagathis . . . . .	97	Quivisia . . . . .	97	— — froide . . . . .	134
Phyllocactus . . . . .	136	Raphiolepis . . . . .	132	Sphærogyne . . . . .	93
Phyllotænum, voir Xan-		Ravenala . . . . .	120 et 122	Spigelia . . . . .	98
thosoma . . . . .	99 et 102	Ravena . . . . .	117	Spondias . . . . .	98 et 122
Phymatodes . . . . .	109	Reidia . . . . .	97	Stadmannia . . . . .	98 et 122
Physianthus . . . . .	131	Reineckia . . . . .	132	Stanhopea . . . . .	114
Pilea . . . . .	97	Renanthera . . . . .	114	Stannia . . . . .	98
Pilocarpus . . . . .	97 et 122	Restrepia . . . . .	114	Stapelia . . . . .	133
Pilocereus . . . . .	136	Rhapis . . . . .	117	Statice . . . . .	133
Pilumna . . . . .	114	Rhipidodendron . . . . .	132	Stauntonia . . . . .	133
Pimelea . . . . .	131	Rhopala . . . . .	97	Stenocarpus . . . . .	133
Pinanga . . . . .	117	Rhynchosia . . . . .	97	Stephanotis . . . . .	98
Pincenectitia, voir Beau-		Rhynchospermum . . . . .	132	Steudnera . . . . .	102
carnea . . . . .	124	Rhytidophyllum . . . . .	110	Stevensonia, voir Phœni-	
Pinckneya . . . . .	97 et 122	Richardia . . . . .	101 et 132	cophorium . . . . .	117
Pinus . . . . .	131	Rochea . . . . .	132	Strelitzia . . . . .	120
Piper . . . . .	97 et 122	Rocou, voir Bixa . . . . .	120	Stromanthe . . . . .	120
Pisonia . . . . .	97	Rœzlia . . . . .	132	Stylidium . . . . .	133
Pistia . . . . .	97 et 101	Rogiera . . . . .	97	Styphelia . . . . .	133
Pitcairnia . . . . .	105	Rohdea . . . . .	132	Swainsonia . . . . .	133
Pittosporum . . . . .	131	Rondeletia . . . . .	97 et 132	Swietenia . . . . .	98 et 122
<i>Plantæ carnivores, voir</i>		Rubus . . . . .	97, 122 et 132	Syphocampylus . . . . .	98
<i>Sarracénies, etc.</i> . . . .	118	Rudgea . . . . .	97	Tabernæmontana . . . . .	98
— pour massifs, corbeil-		Ruellia . . . . .	97	Tacsonia . . . . .	133
les, bordures, etc. . . . .	156	Sabal . . . . .	117	Tamarindus . . . . .	98 et 122
— utiles, officinales, etc. .	120	Saccolabium . . . . .	114	Tamus, voir Testudinaria .	133
Platycerium . . . . .	109	Salvadora . . . . .	97 et 122	Tapeinotes . . . . .	110
Plectocomia . . . . .	117	Salvia . . . . .	155	Tecoma . . . . .	133
Plectranthus . . . . .	97 et 122	Sanchezia . . . . .	97	<i>Telegraphe (Plante), voir</i>	
Pleione . . . . .	114	Sansevieria . . . . .	97 et 122	Hedysarum . . . . .	95
Pleroma . . . . .	97 et 131	Sapindus . . . . .	97 et 122	Teleianthera . . . . .	98
Plumbago . . . . .	97	Sapota . . . . .	98 et 122	Templetonia . . . . .	133
Podocarpus . . . . .	131	Sarcocephalus . . . . .	98	Terminalia . . . . .	98
Podolobium . . . . .	131	Sarracenia . . . . .	119	Testudinaria . . . . .	133
Pogostemon . . . . .	97 et 122	<i>Sauces ornementales, voir</i>		Tetrapanax . . . . .	98 et 122
Poinciana . . . . .	131	Salvia . . . . .	155	Teucrium . . . . .	133
Poinsettia . . . . .	97	Saxifraga . . . . .	132	Thalia . . . . .	120
Poirier, voir Piper . . . . .	97 et 122	Scheelia . . . . .	117	Thamnopteris . . . . .	109
Polianthes . . . . .	131	Schomburgkia . . . . .	114	<i>Thé, voir Thea</i> . . . . .	122 et 133
Polygala . . . . .	131	Sciadocalyx . . . . .	110	Thea . . . . .	122 et 133
Polymnia . . . . .	97	<i>Scitaminees</i> . . . . .	119	Theobroma . . . . .	98 et 122
Polypodium . . . . .	109	Scutellaria . . . . .	98 et 132	Theophrasta . . . . .	98
<i>Pommier-Cannelle, voir</i>		Scuticaria . . . . .	114	Thibaudia . . . . .	133
<i>Anona squamosa</i> . . . . .	120	Sesforthis . . . . .	117	<i>Tonka (Fève), voir Dip-</i>	
Pontederia . . . . .	97	Sedum . . . . .	132	terix . . . . .	92 et 121
Porphyrocoma . . . . .	97	Selaginella . . . . .	109	Thrinax . . . . .	117
Portea . . . . .	105	Selenipedium . . . . .	114	Thunbergia . . . . .	98
Portulacaria . . . . .	131	Selliguea . . . . .	109	Thunia . . . . .	115
Posoqueira, voir Stannia .	98	Sempervivum . . . . .	132	Thyrsacanthus . . . . .	98
Pothos . . . . .	101	Senecio . . . . .	132	Tillandsia . . . . .	105
Pourretia . . . . .	105	<i>Serre chaude et tempérée</i>	87	Tolea . . . . .	109
<i>Primevère, voir Primula</i> .	131	— froide . . . . .	123	<i>Tonneau locomobile.</i> . . .	157
Primula . . . . .	131	Sibthorpia . . . . .	132	Torenia . . . . .	98
Pritchardia . . . . .	117	Sideroxylon . . . . .	98 et 122	Tornelia, voir Monstera .	101
Promenæa . . . . .	114	Sigmatostalix . . . . .	114	Torreya . . . . .	133
Pronaya . . . . .	132	Simaruba . . . . .	98 et 122	Toxicophlæa . . . . .	98
Prostanthera . . . . .	132	Simonsia . . . . .	93	Trachycarpus, voir Cha-	
Psychotria . . . . .	97	Sinclairia . . . . .	98	mærops . . . . .	116
Pteridophyllum . . . . .	97	Sinningia . . . . .	110	Tradescantia . . . . .	98
Pteris . . . . .	109	Skimmia . . . . .	132	Tremalia ? . . . . .	133
Ptychosperma . . . . .	117	Sobralia . . . . .	114	Trichinium . . . . .	133
Pultenæa . . . . .	132	Solanum . . . . .	98 et 132	Trichomanes . . . . .	109
Punica . . . . .	132	Sollya . . . . .	133	Trichopilia . . . . .	115
Puya . . . . .	105	Sonerilla . . . . .	98	Tricyrtis . . . . .	133



	Pages.		Pages.		Pages.
Trithrinax . . . . .	118	Vallota . . . . .	100 et 133	Warrea . . . . .	115
Tropæolum . . . . .	133	Vanda . . . . .	115	Warszewiczella . . . . .	115
<i>Tubéreuse</i> , voir Polianthes .	131	Vangueria . . . . .	99	Wigandia . . . . .	99
Tydeæa . . . . .	110	Vanilla . . . . .	99, 115 et 122	Witsenia . . . . .	134
Typhonium . . . . .	102	Veitchia . . . . .	118	Woodwardia . . . . .	109
Uhdea . . . . .	98 et 133	Veronica . . . . .	133	Xanthosoma . . . . .	et 102
<i>Upas</i> , voir Antiaris . . . . .	88 et 120	Verschaffeltia . . . . .	118	Yucca . . . . .	134
Uropedium . . . . .	115	Viburnum . . . . .	134	Zalacca . . . . .	118
Uroskinnera . . . . .	98	Victoria . . . . .	99	Zamia . . . . .	106
Urvillea . . . . .	98 et 122	Vriesea . . . . .	106	Zamioculcas . . . . .	102
Vaccinium . . . . .	133	Wallichia . . . . .	118	Zygopetalum . . . . .	115

## FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX,  
contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau ou leur équivalent, expédiés FRANCO  
par la poste :

Belgique : 36 francs. — Espagne, France, Italie, Suisse : 38 francs.

Hollande : 18 florins. — Tous les autres pays d'Europe : 38 francs.

Angleterre : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post-paid*).

États-Unis : 7 1/2 Dollars (*Post-paid*).

Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et vignettes, et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sous déduction de 5 % d'escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants **habituels** de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.


Les volumes II, III, IV, V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII peuvent s'acquérir *séparément* au prix de 36 francs chacun (*port non compris*).

L'Etablissement se charge de toute espèce de reliures, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume.

Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Le troisième fascicule du XXIII<sup>e</sup> volume paraîtra en septembre.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, en 1874. — Pareil honneur lui est échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, Saint-Nicolas, Vienne, etc.

 Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,  
Propriétaire de l'Etablissement horticole de Gendbrugge,  
GAND (Belgique).

Correspondant de la FLORE pour la France : M. A. GHIO, libraire-éditeur, Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à PARIS.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)